

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ  
BAKİ BİZNES UNİVERSİTETİ**

**Dərs vəsaiti Bakı Biznes Universitetinin  
20 illik yubileyinə bir töhfədir**

**ALİ RİYAZİYYAT**  
**I hissə**  
**(Dərs vəsaiti)**

Dərs vəsaiti Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin 21 noyabr 2012-ci il tarixli 2113 sayılı əmri ilə təsdiq edilmişdir.

**Bakı - 2012**

Dərs vəsaitini pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Q.M.Namazov hazırlamışdır.

**Redaktor:** fizika, riyaziyyat elmləri namizədi  
Dosent **H.S.Axundov**

**Rəyçilər:** AzDPU-nun professoru  
**Ə.M. Məmmədov**  
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru  
dosent **R.B.Aliyev**

**Namazov Q.M.**

**«Ali riyaziyyat» dərs vəsaiti – Bakı, 2012.– s.**

Bakı Biznes Universitetinin tələbələri üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 08.04.2010-ci ildə təsdiq olunmuş “Ali riyaziyyat” proqramı əsasında yazılmış bu dərs vəsaiti I hissəsində Çoxluqlar, çoxluqlar üzərində əməllər, mütləq qiymət haqqında teoremlər, funksional asılılıqlar, funksiyanın limiti və kəsilməzliyi, törəmə, törəmənin tətbiqləri, qeyri –müəyyən və müəyyən inteqrallar, məxsusi inteqrallar, çoxdəyişənli funksiyaların diferensial və inteqral hesabı, diferensial tənliklər və ədədi sıralar və s. bu kimi məsələlər ətraflı şərh edilmişdir.

Dərs vəsaitindən digər ali və orta məktəblərinin professor-müəllim və tələbələri də istifadə edə bilərlər.

© Namazov Q.M., 2012

© Bakı Biznes Universiteti, 2012

## GİRİŞ

Ali təhsil sisteminin yenidən qurulması tələbə kontingentindən dərin və möhkəm riyazi biliyə malik olmağı, riyaziyyatı müasir elmi məsələlərin həllinə tətbiq etmə bacarığı və müstəqil işləmə vərdişi tələb edir.

Gələcək iqtisadi kadrların hazırlandığı ali məktəblərdə öyrənilən fənlər arasında riyaziyyatın xüsusi əhəmiyyəti vardır. İqtisadiyyatın ən müxtəlif sahələrinə riyazi metodlar geniş tətbiq edilir. Tələbələrin riyazi biliyini yüksəltmək, onların yaradıcı təfəkkürünü, şəxsiyyətini, məntiqi və fərdi düşünmə qabiliyyətini və istedadlarını inkişaf etdirmək, müstəqil işləmə və hesablama aparmaq vərdişlərini artırmaq üçün “Ali riyaziyyat” kursu mühüm əhəmiyyətə malikdir.

Bakı Biznes Universitetinin tələbələri üçün Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin 08.04.2010-cu ildə təsdiq olunmuş “Ali riyaziyyat” proqramı əsasında yazılmış bu dərs vəsaiti iki hissədən ibarətdir.

**I hissədə** çoxluq, mütləq qiymət haqqında teoremlər, funksiyalar, funksiyaların limiti, kəsilməzliyi, törəmə, diferensial, qabarıq və çökük əyrilər, Lopital qaydası, qeyri-müəyyən və müəyyən inteqrallar, inteqrallama üsulları, qeyri məxsusi inteqrallar, çoxdəyişənli funksiyaların diferensial hesabı, diferensial tənliklər, ədədi sıralar və s. bu kimi mövzular ardıcılıqla və oxunaqlı şəkildə şərh edilmişdir. Hər bir mövzu və fəslin sonunda nəzəri materialların tələbələr tərəfindən daha yaxşı qavranılması üçün məsələ və misallar həll edilmişdir.

Dərs vəsaitindən digər iqtisad yönümlü Universitetlərin professor-müəllim və tələbələri də istifadə edə bilərlər.

# I FƏSİL. ÇOXLUQLAR NƏZƏRİYYƏSİ

## 1.1. Çoxluq anlayışı. Sonlu və sonsuz çoxluqlar. Çoxluqlar haqqında teoremlər.

Çoxluq ilkin riyazi anlayışlardan biridir. Odur ki, ona məntiqi tərif verilmir. Alman riyaziyyatçısı Kantora görə: çoxluq dedikdə vahid tam halında birləşmiş çox şey başa düşülür. Çoxluq sözünün sinonimi olaraq işlədilən “elementlər yığımı”, “külli”, “toplu” kimi söz və söz birləşmələrini onunla əvəz etmək çətindir. Bu anlayışın özünəməxsus xüsusi məna çalarları vardır.

Çoxluğu təşkil edən üsürlərə onun elementləri deyəcəyik.

Elementlərin sayının sonlu və ya sonsuz olmalarına görə çoxluqlar uyğun olaraq **sonlu və ya sonsuz** adlandırılır.

Çoxluq, elementlərinin təqdim edilməsiylə təsvir olunur - verilir. Bu iş iki üsulla aparılır: fiqurlu  $\{, \}$  mötərizələr içərisində çoxluğun bütün elementlərinin vergül işarəsi ilə ayrılmaqla sadalanması yolu ilə və ya çoxluğun elementlərinin hamısına xas olan xarakterik əlamətlərin formallaşdırılmasıyla.

### **Çoxluqlara aid misallar:**

1. Qaraqoyunlu oğuz-türk obasının kəndləri çoxluğu:  
 $Y = \{ \text{Gölkənd, Cıvıxlı, Çaykənd, Əmirxeyir, Bəryabad, Yanıqpəyə, Qaraqaya, Salah, Polad, Murteyil, Alaçıqqaya, Vurgun} \};$

2. Oyun kartının mastlarının simvolları yığımı çoxluğu:  $\{ \spadesuit, \clubsuit, \heartsuit, \diamondsuit \};$

3. Simvollar cütü:  $\{ \odot, \ominus \};$

4.  $\mathbb{R}$  - tam ədədlər çoxluğu və s.

Çoxluqları böyük, onun elementlərini isə kiçik hərflər ilə işarə edəcəyik.

“a elementi A çoxluğuna aiddir (və ya daxildir)” fikri simvolik olaraq “ $a \in A$ ” və ya “ $A \ni a$ ” kimi yazılır. “ $a \notin A$ ” yazılışı isə “a elementi A çoxluğuna daxil deyil” fikrini ifadə edir.

Əgər A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğuna aiddirsə ( $A=B$  halı da istisna deyil), onda A çoxluğu B çoxluğunun altçoxluğu adlanır və  $A \subset B$  (və ya  $B \supset A$ ) kimi işarə olunur.

$A=B$  yazılışı aşağıdakı münasibətlərin birlikdə ödənilməsi ilə eynigüclüdür:  $A \subset B$  və  $B \supset A$ . İki çoxluğun bərabərliyi ( $A=B$ ) eyniliklə bərabərlik kimi başa düşülür; həmin  $A=B$  yazılışı onu bildirir ki, A çoxluğunun hər bir elementi B –yə daxildir və tərsinə - B çoxluğunun hər bir elementi A –ya daxildir.

Heç bir elementi olmayan çoxluq “ $\emptyset$ ” kimi işarə olunur və o, boş çoxluq adlanır.

Boş çoxluq istənilən çoxluğun altçoxluğudur.

Çoxluğun özündən və boş çoxluqdan başqa digər altçoxluqları onun məxsusi altçoxluqları adlanır.

Əgər  $A \subset B$  və  $A \neq B$  (eyni zamanda, aşkardır ki,

$A \neq \emptyset$ ) isə, onda A-ya B-nin məxsusi altçoxluğu deyirlər.

Məxsusi altçoxluq (“A çoxluğu B-nin məxsusi altçoxluğudur” fikri) simvolik olaraq, aşağıdakı kimi yazılır:

$$A \subset B \text{ və yaxud } B \supset A.$$

Bəzən bu simvollar ( $\subset$  və  $\subseteq$ ) adi altçoxluq və məxsusi altçoxluqların işarələnməsi baxımından tərsinə də işlədilir.

Verilmiş  $A$  çoxluğunun bütün altçoxluqları ailəsini  $P(A)$  ilə işarə edək.  $P(A)$  –ya  $A$  çoxluğunun dərəcəsi deyilir:

$$P(A) = \{B: B \subseteq A\}.$$

Nəzərə alsaq ki,  $\emptyset \subseteq A$  və  $A \subseteq A$ , onda  $\emptyset \in P(A)$  və  $A \in P(A)$ .

Bütün bunlarla yanaşı, çoxluqlar üzərində bir sıra əməllər mövcuddur.

### **Sonlu və sonsuz çoxluqlar**

Sonsuz çoxluqlardan ən sadəsi natural ədədlər ( $N$ ) çoxluğudur.

Bütün natural ədədlər çoxluğu ilə biyektiv yolla elementləri qarşı qoyulan çoxluğa hesabi çoxluq deyəcəyik. Yəni,  $N$  natural ədədlər sırası ilə ekvivalent (eynigüclü, eyni sayda elementə malik) olan çoxluq hesabi adlanır.

Tutaq ki,  $A$  və  $B$  iki ixtiyari çoxluqdur. Əgər  $A$  çoxluğunun hər bir elementinə qarşı  $B$  çoxluğunun ancaq bir elementini və tərsinə -  $B$  çoxluğunun hər bir elementinə  $A$  çoxluğunun ancaq bir elementini qarşı qoyan inikas (funksiya) mövcud olarsa, onda həmin inikas qarşılıqlı birqiyəmətli uyğunluq adlanır. Yəni, həmin inikasa biyeksiya deyirlər.

Başqa sözlə ifadə etsək, hesabi çoxluq dedikdə elementləri sonsuz çoxluğun elementləriylə nömrələnə bilən çoxluq başa düşülür.

### **Çoxluqlar haqqında teoremlər**

Hesabi çoxluq haqqında teoremlər (isbatsız verilir):

1. Hesabi çoxluğun hər hansı altçoxluğu ya sonlu, ya da hesabi çoxluqdur.
2. İstənilən sonsuz çoxluq hesabi altçoxluğa malikdir.
3. İstənilən sonlu sayda hesabi çoxluqların birləşməsi

də hesabi çoxluqdur.

4. Hesabi sayda hesabi çoxluqların birləşməsi də hesabi çoxluqdur.

Üçüncü teorem onu göstərir ki, hesabi çoxluqlar sonsuz çoxluqların sırasında “ən kiçikləridir”.

### **Hesabi çoxluğa aid misallara baxaq**

**1. Bütün tam ədədlər çoxluğu.** Bütün tam ədədlər və bütün natural ədədlər arasındakı uyğunluğu aşağıdakı kimi yaratmaq olar ( $n \in \mathbb{N}$ ):

$$\begin{array}{cccccc} 0 & -1 & 1 & -2 & 2 & \dots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & \dots \end{array}$$

Yəni,  $n \geq 0$  ədədinə ( $2n+1$ ) tək ədədini,  $n < 0$  ədədinə isə  $2|n|$  cüt ədədini aşağıdakı kimi qarşı qoyma ( $\leftrightarrow$ ) olar:

$$n \leftrightarrow 2n+1, n \geq 0 \text{ olduqda,}$$

$$n \leftrightarrow 2|n|, n < 0 \text{ olduqda.}$$

**2. Bütün müsbət cüt ədədlər çoxluğu.** Bu uyğunluğu aşağıdakı kimi yaratmaq olar:  $n \leftrightarrow 2n$ .

**3. Bütün rasiional ədədlər çoxluğu.** Məlum olduğu kimi, rasiional ədədlər çoxluğu  $\frac{p}{q}$  ( $p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$ ) şəklində təsvir edilir. Burada,  $\mathbb{Z}$  – tam ədədlər çoxluğu,  $\mathbb{N}$  – natural ədədlər çoxluğudur.

$\mathbb{R}$  ilə mənfi rasiional ədədlər çoxluğunu,  $\mathbb{R}_+$  ilə müsbət rasiional ədədlər çoxluğunu işarə edək.

Əvvəlcə  $p$  və  $q$ -nün hər ikisinin rasiional ədədlər çoxluğundan olduğu hala baxaq. Bu halda, aşkardır ki, ini-kas biyektivdir; yəni,  $\frac{p}{q}$  şəkilli kəsrlər çoxluğu hesabidir.

Həmin çoxluqdan ixtisar olunan kəsrləri kənarlaşdırdıqdan

sonra alınan  $R_+$  çoxluğu da hesabi çoxluq olacaqdır. Çünki, hesabi çoxluğun sonlu və ya sonsuz çoxluqla fərqi də hesabidir. Digər tərəfdən,

$R \sim R_+$  olduğundan,  $R_-$  çoxluğunun da hesabiliyi aşkarlanır.

Bundan əlavə, rasional ədədlər çoxluğu  $R = R_- \cup \{0\} \cup R_+$  kimi təyin ediləbilənliyindən,  $R$  -hesabi çoxluq olacaqdır.

**2 ədədinin qüvvətləri çoxluğu:  $2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots$ .** Bu uyğunluğu (qarşıqoymanı) aşağıdakı kimi yaratmaq olar:

$$2^n \leftrightarrow n$$

Hesabi olmayan sonsuz çoxluq qeyri-hesabi çoxluq adlanır.

## 1.2. Çoxluqlar üzərində əməllər

Çoxluqlar üzərində aşağıdakı əməlləri şərh edək.

### Çoxluqların birləşməsi

**a) Birləşmə əməli.** Tutaq ki,  $A$  və  $B$  – ixtiyari iki çoxluqdur;  $A$  və  $B$  çoxluqlarından heç olmasa birinə daxil olan elementlərdən ibarət olan  $C = A \cup B$  çoxluğu onların birləşməsi adlanır. (Element birləşməyə bir dəfə daxil olur).

Birləşmə əməlini riyazi simvolikalardan istifadə edərək, belə yazıla bilər:

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \},$$

burada  $\vee$  simvolu “və ya” bağlayıcısının işarəsidir.

Analoji olaraq istənilən sayda çoxluğun cəmi və ya birləşməsi təyin edilir. İstənilən (sonlu və ya sonsuz) sayda çoxluğun cəmi və ya birləşməsi -  $\bigcup_{\alpha} A_{\alpha}$  - elə çoxluğa deyilir ki, ona daxil olan hər bir element verilən çoxluqlardan



heç olmasa, birinə daxil olsun. Bunu simvolik olaraq, aşağıdakı kimi yazmaq münasibdir:

$$\bigcup_{i \in I} A_i = \{ x \mid \text{elə } i_0 \in I \text{ var ki, } x \in A_{i_0} \}.$$

### **b) Kəsişmə əməli**

$A$  və  $B$  çoxluqlarının hər birinə daxil olan elementlərdən ibarət olan  $C = A \cap B$  çoxluğu onların kəsişməsi adlanır.

Kəsişmə əməlini riyazi simvolikadan istifadə edərək, belə yaza bilərik:

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \},$$

burada  $\wedge$  simnolu “və” bağlayıcısının işarəsidir.

Analoji olaraq: istənilən sayda  $A_\alpha$  çoxluqlarının kəsişməsi (hasili) –  $\bigcap_{\alpha} A_\alpha$  - bu çoxluqların hər birinə aid olan elementlərin küllüsündən ibarət olan çoxluğa deyilir. Bunu simvolik olaraq, aşağıdakı kimi yazmaq olar:

$$\bigcap_{i \in I} A_i = \{ x \mid \text{bütün } i_0 \in I \text{ üçün } x \in A_{i_0} \}.$$

Çoxluqların birləşməsi və kəsişməsi kommutativlik (yerdəyişmə qanunu), assosiativlik (birləşmə qanunu), qarşılıqlı distributivlik (paylama qanunu) xassələrinə malikdir:

kommutativlik:  $A \cup B = B \cup A,$

$$A \cap B = B \cap A;$$

assosiativlik:  $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$$

distributivlik:  $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C),$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$$

Bunlardan əlavə, aşağıdakı münasibətlər də doğrudur:

$$A \cup \emptyset = \emptyset \cup A = A;$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset \cap A = \emptyset;$$

$$A \cup A = A;$$

$$A \cap A = A .$$

Çoxluqlar nəzəriyyəsində bu və ya digər düsturların iki isbat metodu var: birincisi – Eyer və ya Venn diaqramları vasitəsilə, ikincisi -məntiqi mühakimə üsulu ilə.

Birinci üsulla isbat zamanı bərabərlik işarəsindən sağda və solda yerləşən ifadələrin təyin etdiyi çoxluqlar üçün ayrı-ayrılıqda Eyer və ya Venn diaqramları qurulur. Həmin diaqramların təyin etdikləri oblastlar eyni olduqda bərabərliyin doğruluğu isbat edilmiş hesab olunur.

İkinci qayda - məntiqi mühakimə üsulu ilə isbat bərabərlik işarəsindən sağda və ya solda yerləşən ifadələrin təyin etdikləri çoxluqlara aid edilən ixtiyari elementin digər tərəfə də aid olduğu nəticəsinə gəlmək yolu ilə aparılır. Daha dəqiq desək, istənilən elementin bir tərəfə (ya sağ, ya da sol) aidliyindən bərabərliyin digər tərəfinə də daxil olması (həm sağ, həm də sol istinadlar üçün) isbat edilə bildikdə həmin bərabərliyin doğruluğu nəticəsinə gətirilir. Proses, aydındır ki, sağ və sol tərəflərin hər biri üçün ayrı-ayrılıqda istinadlar kimi qəbul edilmələri hallarına müvafiq olaraq, iki dəfə yerinə yetirilir.

### c)Çoxluqların fərqi

**Çıxma əməli.** A çoxluğunun B çoxluğuna aid olmayan elementləri küllüsünə A və B çoxluqlarının fərqi deyilir; simvolik olaraq  $C = A \setminus B$  kimi işarə və təyin edilir. Bu zaman, ümumiyyətlə desək,  $A \supset B$  fərz olunmur. Çıxma əməlini (A və B çoxluqlarının fərqi) riyazi simvolikadan istifadə edərək, belə yazıla bilər:

$$A \setminus B = \{ x \mid x \in A \wedge x \notin B \} .$$

Bəzən (məsələn, ölçmə nəzəriyyəsində) çoxluqların simmetrik fərqi istifadə etmək daha əlverişli olur.

**Çoxluqların simmetrik fərqi əməli.** Çoxluqların simmetrik fərqi əməli aşağıdakı kimi işarə və təyin olunur:

$$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$$

Yəni, iki çoxluğun simmetrik fərqi onların bir-birlərindən fərqlərinin birləşməsinə bərabərdir.

Çoxluqların simmetrik fərqi aşağıdakı kimi də hesablamaq olar:

$$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$

Axıncı düsturu sözlə ifadə edək: iki çoxluğun simmetrik fərqi onların birləşmələri ilə kəsişmələrinin fərqinə bərabərdir.

#### **d) Tamamlayıcı çoxluq**

Tutaq ki,  $S$  universal çoxluqdur. Qeyd edək ki, hər bir çoxluq müəyyən  $S$  universal çoxluğunun altçoxluğudur.

Yəni, universal çoxluq baxılan məsələdə iştirak edən çoxluqların hamısının malik olduqları elementlərin hamısını özündə cəmləşdirir.


$A \subset S$  olduqda  $S \setminus A$  fərqinə  $A$  çoxluğunun  $S$  tamamlayıcısı deyilir. Tamamlayıcı çoxluq aşağıdakı kimi işarə və təyin olunur:

$$A' = S \setminus A \quad \text{və yaxud} \quad C_s A = S \setminus A.$$


Çoxluqlar üzərində əməlləri, eləcə də onlar arasındakı münasibətləri, **Eyler-Venn diaqramlarının** köməyi ilə əyani olaraq təsvir etmək əlverişlidir.

Şəkil 1.1. -də  $B \subset A$  (altçoxluq) münasibəti, şəkil 1.2. ÷ 1.6.-nın ştrixlənmiş sahələrində isə uyğun olaraq,  $A \cup B$  (birləşmə),  $A \cap B$  (kəsişmə),  $A \setminus B$  (fərq-cıxma),  $A \Delta B$  (simmetrik fərq) və  $C_s A$  (tamamlayıcı çoxluq) təsvir olunur. Şəkil 1.7-dəki ştrixlənmiş sahə isə  $A \cap (B \cup C)$  münasibəti ilə təyin edilən çoxluğa uyğundur.


İndi həmin diaqramları quraq.




Şəkil 1.1.  $B \subset A$  (altçoxluq) münasibətinin diaqramı




Şəkil 1.2.  $A \cup B$  (birləşmə əməli) münasibətinin diaqramı




Şəkil 1.3.  $A \cap B$  (kəsişmə əməli) münasibətinin diaqramı




Şəkil 1.4.  $A \setminus B$  (cixma əməli) münasibətinin diaqramı



Şəkil 1.5.  $A\Delta B$  (simmetrik fərq) münasibətinin diaqramı



Şəkil 1.6.  $S\setminus A$  (tamamlayıcı çoxluq) münasibətinin diaqramı



Şəkil 1.7.  $A \cap (B \cup C)$  münasibətinin diaqramı

### e) Kəmiyyət və onun ölçüsü

Təbiəti öyrənən hər bir elmin özünəməxsus səciyyəvi kəmiyyətləri vardır. Məsələn, istilik tutumu, müqavimət, təcil və.s. fiziki kəmiyyətlərdir, parçanın uzunluğu, sahə, həcm və.s. isə həndəsi kəmiyyətlərdir.

Bu kəmiyyətlərin hamısı üçün bir səciyyəvi cəhət var-

dır: hər bir kəmiyyət öz cinsindən (növündən) olan ölçü vahidi ilə ölçülə bilir. Hər bir ölçmə prosesinin nəticəsi, baxılan kəmiyyətin ölçü vahidinə nisbətini göstərən adsız bir ədədlə ifadə olunur. Bu ədədə verilmiş kəmiyyətin ədədi qiyməti (və ya sadəcə olaraq qiyməti) deyilir. Deməli hər bir ədədə ölçmə nəticəsi kimi baxmaq olar.

**Kəmiyyətin ifadə olunduğu ölçü vahidinə onun ölçüsü deyilir.** Məsələn, uzunluq santimetr (sm) və ya metr (m) ifadə olunduğu üçün santimetr və ya metr uzunluq kəmiyyətinin ölçüsüdür. Kvadrat santimetr ( $\text{sm}^2$ ) və ya kvadrat metr ( $\text{m}^2$ ) isə sahə ölçüsüdür. Kiloqram kütlə ölçüsüdür.

Ancaq eyni ölçüsü olan kəmiyyətləri toplamaq və çıxmaq olar. Bu halda cəmin (və fərqin) ölçüsü toplananların ölçüsünün eyni olar. Müxtəlif ölçülü kəmiyyətləri isə həmişə vurmaq və bölmək olar. Bu halda qismətin ölçüsü bölünənin ölçüsünün bölənin ölçüsünə nisbətində, hasilin ölçüsü isə vuruqların ölçüləri hasilinə bərabər olar.

Riyaziyyatda əsasən ölçüsüz, adsız kəmiyyətlərə baxılır. Eyni ölçülü iki kəmiyyətin nisbəti ölçüsüz kəmiyyətdir.

Riyaziyyat elminin öyrəndiyi ölçüsüz kəmiyyətlərin **adsız ədədlərin “ölçü vahidi” 1 ədədidir.**

### **1.3.Həqiqi ədədlər çoxluğu**

Həqiqi ədədlər ali riyaziyyatın əsasını təşkil edir; onlar qədimdən insanların həyat tələbatı və ehtiyacı nəticəsində yaranmışdır.

İnsanlar ilk dəfə natural ədədlərdən istifadə etmişlər. Natural ədədlər çoxluğunda toplama və vurma əməlləri həmişə aparıla bilər: istənilən iki natural ədədin cəmi və hasili yenə də natural ədəddir. Lakin natural ədədlər çoxlu-

ğunda çıxma və bölmə əməlləri həmişə aparıla bilmir. İki natural ədədin fərqi və nisbəti natural ədəd olmaya da bilər. Buna görə də natural ədədlər çoxluğuna yeni ədədlər (sıfır, tam mənfi ədədlər, müsbət və mənfi kəsrlər) əlavə edilərək, onu genişləndirmək zərurəti qarşıya çıxmışdır. Beləliklə,  $\mathbf{R}=\{\mathbf{r}\}$  rasiional ədədlər çoxluğu yaranmışdır.  $\mathbf{R}$  çoxluğu mənfi və müsbət işarələri bütün tam ədədlərdən, kəsrlərdən və sıfırdan təşkil olunmuşdur.

Məlumdur ki, hər bir rasiional  $\mathbf{r}$  ədədi  $\mathbf{p}$  və  $\mathbf{q}$  iki ədədin nisbəti  $= \frac{\mathbf{p}}{\mathbf{q}} (\mathbf{q} \neq 0)$  şəklində göstərilir.

**Teorem. Bütün rasiional ədədlər çoxluğu hesabidir.**

**İsbatı.**  $\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{k}}$  ( $\mathbf{p}=1,2,\dots$ ) şəklində olan bütün rasiional kəsrlər çoxluğunu  $\mathbf{E}_k$  ilə işarə edək.  $\mathbf{E}_k$  hesabi çoxluqdur. Aydındır ki, hər bir müsbət rasiional ədəd  $\mathbf{E}_k$  ( $\mathbf{k}=1,2,\dots$ ) çoxluqlarının heç olmasa birisinə daxildir. Hesabi sayda hesabi  $\mathbf{E}_k$  çoxluqlarının birləşməsi

$$\bigcup_{\mathbf{k}=1}^{\infty} \mathbf{E}_k$$

hesabi olduğundan bütün müsbət rasiional ədədlər çoxluğu hesabidir. Buradan mənfi rasiional ədədlər çoxluğunun və bütün rasiional ədədlər çoxluğunun hesabi olması aydındır.

Sonralar riyaziyyatın inkişafı göstərmişdir ki, uzunluğun ölçülməsi, tənliklərin həll edilməsi və.s. kimi çox sadə məsələlərin həlli rasiional ədədlər çoxluğunda mümkün deyildir. Buna görə də rasiional ədədlər çoxluğuna yeni ədədlər əlavə edilərək onu genişləndirmək zərurəti qarşıya çıxmışdır. Beləliklə, rasiional ədədlər ( $\mathbf{R}$  çoxluğu) və yeni daxil edilən (irrasional ədədlər adlanan) ədədlər birlikdə həqiqi ədədlər çoxluğunu əmələ gətirir. Irrasional ədədlər

çoxluğunu  $I$  və həqiqi ədədlər çoxluğunu  $H$  ilə işarə edək, onda:

$$H = R \cup I$$

İrrasional ədədlərin bir-birinə ekvivalent bir çox tərifləri vardır. Bu təriflərin hər birinə əsaslanaraq həqiqi ədədlər nəzəriyyəsi qurulur və bu nəzəriyyə elmi şəkildə əsaslandırılır.

Riyaziyyatda həqiqi ədədlərin Dedikind, Kantor, Ve-yerştras və b. nəzəriyyələri vardır.

Həqiqi ədədlər çoxluğunda çıxma və bölmə əməlləri, toplama və vurma əməllərinin tərsi kimi təyin olunur.

Orta məktəbin riyaziyyat kursundan məlumdur ki, hər bir rasional ədəd sonsuz dövrü onluq kəsr (sonlu onluq kəsri dövrü sıfırlar olan sonsuz dövrü onluq kəsr hesab edirik)şəklində göstərilir. Tərsinə, hər bir sonsuz dövrü onluq kəsr isə rasional ədədi ifadə edir.

Deməli, rasional ədədlər çoxluğu sonsuz dövrü onluq kəsrlər ilə üst-üstə düşür. Dövrü olmayan sonsuz onluq kəsrlər (və ya belə kəsrlərlə ifadə olunan ədədlər) çoxluğu isə irrasional ədədlər çoxluğunu təşkil edir. İrrasional ədədlərə  $\sqrt{2}$ ,  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{5}$ ,  $\pi$  və s. misal ola bilər.

Verilmiş tərifə əsaslanaraq həqiqi ədədlərin bütün xassələrini müəyyən etmək olar.

#### 1.4. Nizamlı çoxluğun xassələri

##### a) Nizamlılıq xassəsi

Boş olmayan  $X = \{x\}$  çoxluğunun istənilən iki  $x_1 \in X$  və  $x_2 \in X$  elementləri arasında üç  $x_1 < x_2, x_1 > x_2$  və  $x_1 = x_2$  münasibətindən ancaq biri ödənilərsə və eyni zaman-



**da,  $x_1 < x_2$  və  $x_2 < x_3$  olmasından  $x_1 < x_3$  çıxırsa, onda həmin çoxluğa nizamlı çoxluq deyilir.**

Həqiqi ədədlərin bərabər, böyük və kiçik ( $=, >, <$ ) olmasına yuxarıda verdiyimiz təriflər həqiqi ədədlər çoxluğunu nizamlamağa imkan verir. Həmin təriflərə əsasən isbat etmək olar ki, həqiqi ədədlər çoxluğu nizamlı çoxluqdur, yəni həqiqi ədədlər üçün aşağıdakı xassə doğrudur.

İstənilən həqiqi  $a$  və  $b$  ədədləri üçün aşağıdakı üç münasibətdən ancaq biri doğru ola bilər:

$$a < b, a = b, a > b.$$

Bu zaman  $a < b$  və  $b < c$  olarsa, onda  $a < c$  olmalıdır.

### **b) Sıxlıq xassəsi**

İstənilən iki müxtəlif həqiqi  $a$  və  $b$  ədədi arasında heç olmasa bir həqiqi  $c$  ədədi vardır. Yəni  $a < b$  (və ya  $a > b$ ) olduqda elə həqiqi  $c$  ədədi var ki,  $a < c < b$  ( $a > c > b$ ) olur. Məsələn,  $a < b$  olduqda  $c = \frac{a+b}{2}$  ədədi  $a < c < b$  bərabərsizliyini ödəyir. Buradan aydındır ki, iki müxtəlif həqiqi ədəd arasında sonsuz sayda həqiqi ədəd vardır.

### **c) Arximed xassəsi**

**İki müxtəlif  $a > 0$  və  $b > 0$  həqiqi ədədi üçün natural  $n$  ədədi var ki,  $na > b$  olar.**

### **d) Qeyri-hesabi olması**

**Bütün həqiqi ədədlər çoxluğu qeyri-hesabidir.**

Bu xassənin doğruluğu yuxarıda isbat edilmiş 3-cü teoremdən və həqiqi ədədlərin tərifindən aydındır.

Həqiqi ədədlər çoxluğu rasional və irrasional ədədlər çoxluğunun birləşməsindən ibarət olduğundan və rasional ədədlər çoxluğunun hesabi olmasından, irrasional ədədlər çoxluğunun qeyri-hesabi olması aydındır.

Həqiqi ədədlər çoxluğunun bundan başqa digər xassələri də vardır.

**Misallar.**

Sonuncu şəkil aşağıdakı düsturun doğruluğunu təsdiqləyir:

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Çoxluqlar nəzəriyyəsində **ikilik prinsipi** mühüm əhəmiyyət kəsb edir. O, aşağıdakılara əsaslanır:

1. Cəmin (birləşmənin) tamamlayıcısı tamamlayıcıların kəsişməsinə (hasilinə) bərabərdir:

$$S \setminus \bigcup_{\alpha} A_{\alpha} = \bigcap_{\alpha} (S \setminus A_{\alpha})$$

2. Kəsişmənin (hasilin) tamamlayıcısı tamamlayıcıların birləşməsinə (cəminə) bərabərdir:

$$S \setminus \bigcap_{\alpha} A_{\alpha} = \bigcup_{\alpha} (S \setminus A_{\alpha})$$

İkilik prinsipinin məğzi ondan ibarətdir ki, qeyd olunmuş  $S$  çoxluğunun altçoxluqları sisteminə aid istənilən bərabərlikdən bütün baxılan çoxluqları onların tamamlayıcıları, çoxluqların birləşmələrini kəsişmələri, çoxluqların kəsişmələrini isə birləşmələriylə əvəz etmək yolu ilə tam avtomatik surətdə başqa (ikilik) bərabərlik alınabilir.

İki sonlu çoxluq öz elementlərinin sayına görə müqayisə oluna bilər. Başqa cür ifadə etsək: iki sonlu çoxluq arasındakı inikas biyeksiyadırsa (yəni, hər iki çoxluğun elementlərinin qarşılıqlı birqiyəmətli uyğuluq münasibəti mövcuddursa), onda onları müqayisə etmək olar.

İndi isə çoxluqlar üzərində əməllərə dair bir sıra tapşırığın həllini nəzərdən keçirək[3].

## 1.5.Çoxluqların Dekart hasili

$n$  elementdən ibarət  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ardıcılığını  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  ilə işarə edək. Burada dairəvi mötərizələr elementlərin yazılma sırasını göstərmək üçün istifadə olunur. Məsələn, əgər  $x_1 \neq x_2$  isə, onda  $(x_2, x_1, \dots, x_n)$  ardıcılığı  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  ilə üst-üstə düşmür. Belə sıranı  $n$  uzunluqlu yığım adlandıraraq; 2 uzunluqlu yığını isə cütlük adlandıraraq.

Tutaq ki,  $A_1, A_2, \dots, A_n$  kimi işarə edilmiş  $n$  dənə çoxluq verilmişdir.  $x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \dots, x_n \in A_n$  şərtini ödəyən bütün  $(x_1, x_2, \dots, x_n)$  yığımları çoxluğuna  $A_1, A_2, \dots, A_n$  çoxluqlarının birbaşa və ya Dekart hasili deyilir və aşağıdakı kimi işarə olunur:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n.$$

Digər işarələmədən istifadə etməklə  $A_1, A_2, \dots, A_n$  çoxluqlarının Dekart hasilini qısa şəkildə aşağıdakı kimi də yazmaq olar:  $\prod_{i=1}^n A_i$ .

**Misal 1.10.** Tutaq ki,  $X = \{0, 1\}$ ,  $Y = \{x, y\}$ .

Onda, alarıq:  $X \times Y = \{(0, x), (0, y), (1, x), (1, y)\}$ ,

$$Y \times X = \{(x, 0), (x, 1), (y, 0), (y, 1)\}.$$

Deməli,  $X \times Y \neq Y \times X$ .

Çox zaman eyni çoxluqların düz hasilindən istifadə edirlər. Bu halda  $A \times A \times \dots \times A$  (vuruqların sayı  $n$  -ə bərabərdir) əvəzinə  $A^n$  işarələməsi götürülür.

## 1.6. İnikas. Siniflərə bölmə. Çoxluqların gücü

Əgər  $M$  çoxluğundan olan hər bir  $a$  elementinə  $N$  çoxluğundan müəyyən  $f$  qaydası ilə bir və ancaq bir  $b$  elementi uyğun olaraq qarşı qoyulursa, onda bu uyğunluq “funksiya” adlanır. Burada  $M$  verilən funksiyanın təyin olunma oblastı,  $N$  isə qiymətlər çoxluğu (dəyişmə oblastı) adlanır.

Başqa sözlə desək, bir çoxluq digərinə inikas olunur. Odur ki, “funksiya” anlayışı “inikas” anlayışıyla əvəz oluna bilər.

$f$  qaydası ilə  $M$ -dən  $N$ -ə inikas (“funksiya”)  $f: M \rightarrow N$  kimi işarə olunur.

$f$  inikası zamanı  $a \in M$ -ə qarşı (uyğun) qoyulan  $b = f(a)$  elementi ( $b \in N$ )  $a$ -nın obrazı (surəti),  $a$  isə  $b$ -nin proobrazı (örnəyi) adlanır və  $a = f^{-1}(b)$  ilə işarə edilir.

Əgər  $f(M) = N$  olarsa, onda  $fM$ -in  $N$ -ə inikası adlanır.  $f(M) \subset N$  olduqda isə,  $f$ -ə  $M$ -in  $N$ -də inikası deyilir.

Əgər ixtiyari  $x_1 \neq x_2 \in M$  üçün onların obrazları  $u_1 = f(x_1)$  və  $u_2 = f(x_2)$  də müxtəlif olarlarsa ( $u_1 \neq u_2$ ), onda  $f$  inikası inyeksiya adlanır.

$f: M \rightarrow N$  inikası eyni zamanda suryeksiya və inyeksiyadırsa onda o, biyeksiya və ya  $M$  və  $N$  arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq (yəni, biyektiv inikas) adlanır.

İnikasın əsas xassələrini şərh edək. Bu xassələri teoremlərlə (isbatsız) verək.

**Teorem 1.** İki çoxluğun cəminin (birləşməsinin) proobrazı onların proobrazlarının cəminə bərabərdir:

$$f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B).$$

**Teorem 2.** İki çoxluğun kəsişməsinin proobrazı onların proobrazlarının kəsişməsinə bərabərdir:

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B).$$

**Teorem 3.** İki çoxluğun birləşməsinin obrazı onların obrazlarının birləşməsinə bərabərdir:

$$f(A \cup B) = f(A) \cup f(B).$$

Lakin, iki çoxluğun kəsişməsinin obrazı isə onların obrazlarının kəsişməsinə bərabər olmaya da bilər.

Məsələn, tutaq ki, baxılan inikas müstəvinin  $x$  oxuna proyeksiyanıdır. Onda aşağıdakı parçalar kəsişmirlər, lakin eyni zamanda, onların obrazları üst-üstə düşür:

$$0 \leq x \leq 1, y=0,$$

$$0 \leq x \leq 1, y=1.$$

İsbat etmək olar ki, tamamlayıcının proobrazı proobrazın tamamlayıcısına bərabərdir.

Çoxluqları elementlərinin müəyyən əlamətlərinə görə siniflərə bölmək olar. Tutaq ki,  $M$  - hər hansı çoxluqdur və onun bir sıra elementləri  $(a,b)$  cütü “nişanlanmışdır”. Əgər  $(a,b)$  cütü “nişanlanmışdırsa”, onda  $a$  elementi  $\varphi$  münasibətlə  $b$  elementi ilə əlaqədardır, deyəcəyik:  $a \varphi b$ . Bu  $\varphi$  münasibəti aşağıdakı xassələri ödədikdə ekvivalentlik münasibəti adlanır:

1. Refleksivlik:  $a \varphi a$  (ixtiyari  $a \in M$  üçün).
2. Simmetriklik: əgər  $a \varphi b$  isə, onda  $b \varphi a$  (ixtiyari  $a, b \in M$  üçün).

3. **Tranzitivlik:** əgər  $a \varphi b$  və  $b \varphi c$  isə, onda  $a \varphi c$  (ixtiyari  $a, b, c \in M$  üçün).

Bu şərtlər  $M$  çoxluğunun  $\varphi$  münasibəti (əlaməti) vasitəsilə siniflərə bölünməsi üçün zəruri və kafidir.

Ekvivalentlik anlayışı daha geniş anlayış olan

$$a \varphi b \in M \times M = M^2$$

binar münasibətinin xüsusi halıdır və o da yuxarıdakı üç xassəni ödəyir.

**Tərif.** İki  $M$  və  $N$  çoxluğu onların elementləri arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq olduqda ekvivalent adlanırlar. ( $M \sim N$  kimi işarə olunur). Odur ki, hesabi çoxluğa natural ədədlər çoxluğuna ekvivalent çoxluq kimi də tərif vermək olar.

**Teorem.**  $[0; 1]$  parçasına daxil olan həqiqi ədədlər çoxluğu qeyri- hesabidir.

Çoxluqların ekvivalentliyinə dair isbatsız olaraq aşağıdakı teoremi verək.

### **Kantor – Bernşteyn teoremi**

Tutaq ki,  $A$  və  $B$  iki ixtiyari çoxluqdur. Əgər  $A$  çoxluğunun  $B$  çoxluğunun  $B_1$  altçoxluğuna qarşılıqlı birqiymətli  $f$  uyğunluğu və  $B$  çoxluğunun  $A$  çoxluğunun  $A_1$  altçoxluğuna qarşılıqlı birqiymətli  $g$  uyğunluğu mövcuddursa, onda  $A$  və  $B$  çoxluqları ekvivalentdir.

$[0; 1]$  parçasındakı həqiqi ədədlər çoxluğuna ekvivalent çoxluğun gücü kontinumdur, deyirlər.

$A$  çoxluğunun gücünü  $m(A)$  ilə işarə edək. İxtiyari  $A$  və  $B$  çoxluqları üçün: ya  $m(A) = m(B)$ , ya

$$m(A) > m(B), \text{ yaxud da } m(A) < m(B).$$

A çoxluğunun elementləri sayını  $n(A)$  kimi işarə edək.

Əgər  $A \cap B = \emptyset$  olarsa, onda  $A \cup B$  çoxluğunun elementlərinin sayı aşağıdakı kimi təyin olunur:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B).$$

Bu qayda istənilən cüt-cüt kəsişməyən sonlu sayda olan sonlu çoxluqların birləşmələrinin elementləri sayının tapılmasına da şamil edilir.

Ekvivalent çoxluqların elementlərinin sayları bərabərdir.

Tutaq ki,  $A$  və  $B$  ixtiyari iki sonlu çoxluqdur. Onda onların birləşməsinin elementləri sayı aşağıdakı düsturla hesablanılır:

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B).$$


## II FƏSİL.QEYRİ-HESABI ÇOXLUQ. HƏQIQİ ƏDƏDLƏRİN HƏNDƏSİ TƏSVİRİ

### 2.1.Qeyri-hesabi çoxluq

**Tərif:** Hesabi olmayan sonsuz çoxluğa **qeyri hesabi (və ya hesabi olmayan)** çoxluq deyilir.Tərifdən aydındır ki, eynigüclü olan iki sonlu çoxluğun elementlərinin sayı bərabərdir.Belə təklif “müəyyən mənada” sonsuz çoxluqlar üçün də doğrudur. Məsələn, eynigüclü olan  $X=\{n^2\}$  və  $Y=\{2n\}$  sonsuz çoxluqlarının elementləri eyni “saydadır”, lakin onların elementlərinin “sayını” ifadə edən natural ədəd yoxdur.

### 2.2.Düz xətt üzərində koordinat sistemi. Həqiqi ədədlərin həndəsi təsviri

Həqiqi ədədlər həndəsi olaraq ədəd və ya koordinat oxunun nöqtələri ilə göstərilir.Verilmiş düz xətt üzərində başlanğıc adlanan  $O$  nöqtəsi,ölçü vahidi və müsbət istiqamət seçildikdə deyirlər ki, həmin düz xətt üzərində koordinat sistemi təyin olunmuşdur. Bu halda düz xətt koordinat oxu,  $O$  nöqtəsinə isə koordinat başlanğıcı deyilir (bax: şəkil 1a,b).



Şəkil 1.



Koordinat oxu üzərində istənilən  $M$  nöqtəsi götürək.  $OM$  parçasını vahid  $OB$  parçası ilə ölçdükdə nəticə bir  $x$  ədədi ilə ifadə olunur.  $OM$  parçasının istiqaməti  $OB$ -nin istiqaməti ilə eyni olduqda həmin  $x$  ədədi müsbət ( $x > 0$ ), müxtəlif olduqda isə mənfi ( $x < 0$ ) hesab edilir.  $M$  nöqtəsi  $O$  ilə üst-üstə düşdükdə  $x = 0$  olur. **Belə təyin olunan  $x$  ədədinə  $OM$  parçasının qiyməti deyilir və  $x = OM$  ilə işarə olunur.**

Hər bir həqiqi  $x$  ədədi üçün  $ox$  üzərində elə yeganə  $M$  nöqtəsi var ki,  $x = OM$  olur.  $x > 0$  olduqda  $M$  nöqtəsi  $O$  nöqtəsinin oxun müsbət istiqaməti tərəfində,  $x < 0$  olduqda isə  $O$  nöqtəsinin oxun müsbət istiqamətinin əks tərəfində yerləşər (şəkil 1).

Beləliklə, hər bir həqiqi ədədə oxun müəyyən bir nöqtəsi və tərsinə, oxun hər bir nöqtəsinə bir həqiqi ədəd uyğun olur. **Bu halda verilmiş oxa ədəd oxu,  $M$  nöqtəsinə uyğun olan həqiqi  $x$  ədədinə həmin nöqtənin koordinatı (latınca co-birlikdə, ordinatus nizamlanmış, müəyyən deməkdir) və  $M$  nöqtəsinə  $x$  ədədinin həndəsi göstərilişi deyilir.  $x$  ədədinin  $M$  nöqtəsinin koordinatı olması  $M(x)$  şəklində yazılır.**

Adətən, ədəd oxu üfüqi düz xətt və onun üzərində müsbət istiqamət soldan sağa tərəf götürülür.

Aydındır ki, həqiqi ədədlər çoxluğu ilə ədəd oxunun nöqtələri çoxluğu arasında qarşılıqlı birqiymətli uyğunluq vardır. Buna görə də çox zaman riyazi analizdə “həqiqi”  $x$  ədədini ədəd oxu üzərində göstərən “nöqtə” əvəzinə “ $x$  nöqtəsi” işlədilir.

Həqiqi ədədləri ədəd oxunun nöqtələri ilə göstərdikdə onların bir sıra xassələri daha aydın görünür. Bu za-

man həqiqi ədədlərin nizamlılıq və başqa xassələri pozulmur.

Qeyd edək ki, bütün həqiqi ədədləri ədəd oxu üzərində göstərən nöqtələr həmin oxu (düz xətti) tamamilə doldurur. Bu, həqiqi ədədlər çoxluğunun kəsilməzlik (və ya tamlıq) xassəsinə həndəsi olaraq ifadə edir.

Həqiqi ədədləri həndəsi göstərmək üçün işlədilən ədəd oxu bərabər hissələrə bölündüyündən, (şəkil 1b) yəni müntəzəm şkala olduğundan ölçülü kəmiyyətləri də həmin ox üzərində həndəsi göstərmək olar. Bu haqda ölçü vahidi olaraq seçilən parçaya həmin kəmiyyətin adına uyğun ad verilir. Məsələn, ox üzərində kütlə həndəsi göstərilirsə, onda O nöqtəsinə  $m=0$  q, A nöqtəsinə  $m=1$  q, N nöqtəsinə  $m=2$  q vəs. uyğun olar.

### 2.3. Düz xətt üzərində ədəd oxu və loqarifmik şkala

Bəzi hallarda müntəzəm olmayan şkaladan, məsələn loqarifmik şkaladan istifadə etmək daha əlverişlidir. Bu halda  $x > 1$  ədədini loqarifmik şkala üzərində seçilmiş müəyyən nöqtədən sağa  $\gamma \cdot \lg x$  məsafədə yerləşən nöqtə ilə,  $0 < x < 1$  ədədini isə həmin nöqtədən solda  $\gamma |\lg x|$  məsafədə yerləşən nöqtə ilə götürürlər. ( **$\gamma$ , seçilmiş mütənasiblik əmsəlidir**). Loqarifmik şkala loqarifmik funksiyanın xassəsinə əsaslanır (ədəd böyüdükcə onun loqarifmi nisbətən az sürətlə artır:

$$\lg 10 = 1, \lg 100 = 2, \lg 1000 = 3, \dots).$$

Biz, riyazi kəmiyyətləri həndəsi göstərmək üçün ədəd oxundan (müntəzəm şkaladan) istifadə edəcəyik.

## 2.4. Müntəzəm şkala. Ölçü vahidi. Müntəzəm olmayan şkala

**Müntəzəm şkalanın** bir xüsusiyyətini qeyd etmək lazımdır. Həndəsi silsilə və ya qüvvət funksiyası şəklində sürətlə dəyişən kəmiyyətin müəyyən intervalda dəyişmə xarakterini həndəsi olaraq əyani görmək üçün müntəzəm şkala çox zaman əlverişli olmur. Çünki ölçü vahidi böyük götürüldükdə koordinat başlanğıcından uzaq nöqtələrdə dəyişən kəmiyyətin qrafiki çertyoja yerləşmir. **Ölçü vahidi** çox kiçik olduqda isə qrafikin koordinat başlanğıcına yaxın hissələrinə əsasən kəmiyyətin dəyişmə xarakterini görmək çətin olur. Buna görə belə hallarda **müntəzəm olmayan şkaladan**, məsələn loqarifmik şkaladan istifadə etməkdə əlverişlidir. Bu halda  $x > 1$  ədədini loqarifmik şkala üzərində seçilmiş müəyyən nöqtədən sağa  $\gamma \cdot \lg x$  məsafədə yerləşən nöqtə ilə,  $0 < x < 1$  ədədini isə həmin nöqtədən solda  $\gamma |\lg x|$  məsafədə yerləşən nöqtə ilə göstərirlər ( $\gamma$  seçilmiş mütənasiblik əmsəlidir).

## 2.5. Ədədi çoxluğun xüsusi növləri. Kantor teoremi

Çoxluğun bütün elementləri həqiqi ədədlər olduqda ona **ədədi çoxluq** deyilir. Natural ədədlər çoxluğu  $N$ , rəşional ədədlər çoxluğu  $R$ , irrəşional ədədlər çoxluğu  $I$  vəs. ədədi çoxluğa misal ola bilər. Ədədi çoxluqların çox işlənən bir sıra xüsusi növlərini qeyd edək. Müxtəlif  $a$  və  $b$  həqiqi ədədlərini götürərək  $a < b$  olduğunu qəbul edək.

**Tərif.**  $a < x < b$  bərabərsizliyini ödəyən bütün həqiqi

$x$  ədədləri çoxluğuna interval deyilir və  $(a,b)$  ilə işarə edilir:  $(a,b) = \{x | a < x < b\}$ .

Çoxluğun özünə daxil olmayan  $a$  və  $b$  ədədlərinə intervalın ucları,  $(b-a)$  fərqinə isə intervalın uzunluğu deyilir.

Həndəsi olaraq,  $(a,b)$  intervalı ədəd oxu üzərində  $a$  və  $b$  nöqtələri arasında yerləşən nöqtələr çoxluğundan ibarətdir.

**Misal 1.**  $-1 < x < 1$  bərabərsizliyini ödəyən  $x$  ədədləri çoxluğu

$$(-1, 1) = \{x | -1 < x < 1\}$$

intervalını təşkil edir.


**Tərif.**  $a \leq x \leq b$  bərabərsizliyini ödəyən  $x$  ədədləri çoxluğuna parça və ya segment deyilir. Parça  $[a, b]$  şəklində göstərilir:

$$[a,b] = \{x | a \leq x \leq b\}.$$


$a$  və  $b$  ədədlərinə parçanın ucları,  $b-a$  fərqinə isə parçanın uzunluğu deyilir.

Aydındır ki,  $(a,b)$  intervalı ilə  $[a,b]$  parçasının uzunluqları bərabərdir (Şəkil 2).

Həndəsi olaraq  $[a,b]$  parçası dedikdə ədəd oxu üzərində  $a$  və  $b$  nöqtələri və onların arasında yerləşən bütün nöqtələr çoxluğu başa düşülür (Şəkil 3).



Şəkil 2.



Şəkil 3.

**Misal 2.**  $-1 \leq x \leq 1$  bərabərsizliyini ödəyən  $x$  ədədləri çoxluğu  $[-1,1]$  parçasını təşkil edir:

$$[-1,1] = \{x | -1 \leq x \leq 1\}.$$

**Tərif.**  $a \leq x < b$  bərabərsizliyini ödəyən  $x$  ədədləri çoxluğuna soldan qapalı yarıminterval,  $a < x \leq b$  bərabərsizliyini ödəyən  $x$  ədədləri çoxluğuna isə sağdan qapalı yarıminterval deyilir. Bunlar uyğun olaraq aşağıdakı kimi işarə edilir:

$$[a,b) = \{x | a \leq x < b\} \quad \text{və} \quad (a,b] = \{x | a < x \leq b\}$$

Aydındır ki, uyğun olaraq soldan və sağdan qapalı  $[a,b)$  və  $(a,b]$  yarımintervallarının uzunluqları bərabərdir,  $b-a$  fərqi onların uzunluğudur. Yeni işarələr də qəbul edək.

Bütün həqiqi ədədlər çoxluğu  $(-\infty, \infty)$  şəklində göstərilir. Buradakı  $\infty$  “sonsuzluq” ədəd deyildir, ancaq simvolik işarədir. Onun ayrılıqda heç bir mənası yoxdur. Ona müəyyən təklif və ifadələrdə məna verilir. Çox zaman bütün həqiqi ədədlər çoxluğunu  $-\infty < x < \infty$  şəklində işarə edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, axırıncı münasibət sonsuzluq işarəsinin həqiqi ədədlərlə bir növ əlaqəsini də müəyyən edir.

Hər hansı həqiqi  $a$  ədədindən böyük olan bütün ədədlər çoxluğu  $(a, +\infty)$  ilə işarə edilir.  $a$  ədədindən kiçik olmayan bütün həqiqi ədədlər çoxluğunu isə  $[a, +\infty)$  ilə işarə edəcəyik ( $a$  ədədi axırıncı çoxluğa daxildir). Eyni qayda ilə  $(-\infty, a)$  və  $(-\infty, a]$  ədədi çoxluqlarını da təyin etmək olar.

**Misal 3.**  $-3 \leq x < \sqrt{2}$  münasibərini ödəyən həqiqi ədədləri çoxluğu soldan qapalı  $[-3, \sqrt{2})$  yarımintervalını təşkil edir.

Ədədi çoxluğun baxdığımız növləri arasında belə bir münasibət vardır: **hər bir interval istənilən parça, yarımox və bütün ədəd oxu ilə ekvivalentdir.**

**Teorem (Kantor teoremi):**

**İstənilən  $[a, b]$  ( $a \neq b$ ) parçasının ( $(a, b)$  intervalının) nöqtələri çoxluğu qeyri-hesabidir.**

Bütün parçaların və intervalların eynigüclü olmasından aydındır ki, Kantorun bu teoremini  $[0, 1]$  parçası üçün söyləmək kifayətdir.

**Tərif.  $[0, 1]$  parçasının bütün nöqtələri çoxluğuna ekvivalent olan hər bir çoxluğa kontinum güclü çoxluq deyilir.**

Buradan alınır ki, istənilən  $[a, b]$  parçası,  $(a, b)$  intervalı və həm də bütün ədəd oxu kontinum güclü çoxluqdur.

**Hər bir parçanın bütün nöqtələri çoxluğuna kontinum deyilir.**

### III FƏSİL. MÜTLƏQ QIYMƏT HAQQINDA TEOREMLƏR

#### 3.1. Həqiqi ədədin mütləq qiyməti.

**Tərif.** Mənfi olmayan və

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{əgər } x \geq 0 \text{ olarsa} \\ -x, & \text{əgər } x < 0 \text{ olarsa} \end{cases}$$

kimi təyin olunan  $|x|$  ədədinə həqiqi  $x$  ədədinin mütləq qiyməti ( və ya modulu) deyilir.

Aşkardır ki, istənilən həqiqi  $x$  ədədi üçün:

$$|x| = |-x|, \quad x \leq |x|, \quad -x \leq |x| \quad (1)$$

**Misal 1.**

$$|-3| = 3, |3| = 3, \left| -\frac{1}{2} \right| = \frac{1}{2}, |-1,2| = 1,2, |0| = 0$$

$x$  ədədi ədəd oxu üzərindəki  $M$  nöqtəsinin koordinatı olduqda  $|x|$  ədədi  $\overline{OM}$  parçasının uzunluğunu göstərir.

#### 3.2. Mütləq qiymət haqqında teoremlər

Mütləq qiymətin bir sıra mühüm xassələrini qeyd edək.

**Teorem 1.**

$$|x| < M \quad (2)$$

bərabərsizliyi

$$-M < x < M \quad (3)$$

bərabərsizlikləri ilə ekvivalentdir (eynigüclüdür).

**İsbatı.** (2) bərabərsizliyi doğru olduqda (1) münasibətlərinə görə

$$x < M \quad \text{və} \quad -x < M.$$

İkinci bərabərsizliyin hər iki tərəfini  $-1$ -ə vursaq:

$$x < M \quad \text{və} \quad x > -M$$

və ya (3) münasibəti alınar:



$$-M < x < M$$

İndi isə (3) bərabərsizliyinin ödənildiyini fərz edək.


$x \geq 0$  olduqda  $|x| = x$  və  $x < M$  əvəzinə  $|x| < M$

bərabərsizliyini yazmaq olar.

$0 < M(x)$



Şəkil 4.



Şəkil 5.

$x < 0$  olduqda  $|x| = -x$  və (3) bərabərsizliklərinin sol tərəfinə görə  $M > -x$  və ya  $M > |x|$  (Şəkil 4).

Bununla da teorem isbat olunur.

Qeyd (2) bərabərsizliyi və ya (3) bərabərsizlikləri göstərir ki,  $x$  ədədi  $(-M, M)$  intervalında yerləşir (şəkil 5).

**Teorem 2.**  $x \leq M$  bərabərsizliyi  $-M \leq x \leq M$  bərabərsizlikləri ilə ekvivalentdir.

Bu teorem 1-ci teorem kimi isbat olunur.

**Teorem 3.**  $|x| > M$  olduqda  $x > M$ ,  $x < -M$  bərabərsizliklərinin biri ödənilməlidir.

Teoremin doğruluğu mütləq qiymətin tərifindən aydındır.

### 3.3.Cəmin, fərqin, hasilin, nisbətin mütləq qiyməti haqqında teoremlər

**Teorem 4.** İki həqiqi ədəd cəminin mütləq qiyməti, həmin ədədlərin mütləq qiymətləri cəmindən böyük



**deyildir:**

$$|x + y| \leq |x| + |y| \quad (4)$$

**İsbatı.** Burada iki hal ola bilər:

1)  $x+y>0$ . Onda mütləq qiymətin tərifinə görə  $|x + y| = x + y$  və (1) bərabərsizliklərinin ikincisinə əsasən:

$$|x + y| = x + y \leq |x| + |y|$$

2)  $x+y<0$ . Bu halda da

$$|x + y| = -(x+y) = (-x)+(-y) \leq |x| + |y|$$

Bununla da teorem isbat olunur.

**Qeyd.** İsbat etdiyimiz 4-cü teorem sonlu sayda ixtiyari həqiqi ədədlərin cəmi üçün də doğrudur.

$$|x_1 + x_2 + \dots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| \quad (5)$$

Bu təklifin riyazi induksiya metodu ilə 4-cü teoremdən istifadə etməklə asanlıqla isbat etmək olar.

**Teorem 5. İki həqiqi ədədin fərqlinin mütləq qiyməti, onların mütləq qiymətləri fərqlindən kiçik deyildir:**

$$|x - y| \geq |x| - |y| \quad (6)$$

**İsbatı.** 4-cü teoremə görə

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y|$$

və buradan

$$|x| - |y| \leq |x - y|.$$

**Teorem 6.**

$$|x - y| \geq |x| - |y| \quad (7)$$

**bərabərsizliyi doğrudur.**

**İsbatı.** Əvvəlki teoremə əsasən

$$|x - y| \geq |x| - |y|$$

və

$$|x - y| = |y - x| \geq |y| - |x|.$$

Buradan da (7) bərabərsizliyi alınır.

**Teorem 7. İki həqiqi ədəd hasilinin mütləq qiyməti həmin ədədlərin mütləq qiymətlərinin hasilinə bərabərdir:**

$$|x \cdot y| = |x| \cdot |y| \quad (8)$$

Doğrudan da,  $x > 0$  və  $y > 0$  olduqda  $xy > 0$  və  $|x \cdot y| = xy = |x| \cdot |y|$   $x > 0$  və  $y < 0$  olduqda isə  $xy < 0$  və yenə də  $|x \cdot y| = -(xy) = x \cdot (-y) = |x| \cdot |y|$ . Ardı aydındır.

**Nəticə.** Sonlu sayda  $x_1, x_2, \dots, x_n$  ədədləri üçün

$$|x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n| = |x_1| \cdot |x_2| \cdot \dots \cdot |x_n|$$

Münasibəti doğrudur. Doğrudan da, (8) münasibətinə görə

$$|x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n| = |x_1| \cdot |x_2 \cdot \dots \cdot x_n| = |x_1| \cdot |x_2| \cdot |x_3 \cdot \dots \cdot x_n|$$

$$= \dots = |x_1| \cdot |x_2| \cdot \dots \cdot |x_n|$$

**Teorem 8. İki həqiqi ədədin nisbətinin mütləq qiyməti həmin ədədlərin mütləq qiymətləri nisbətinə bərabərdir.**

$$\left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}, \quad (y \neq 0). \quad (9)$$

Teoremin isbatı aşkardır.

**Misal 2.** Bərabərsizliyi həll edin:  $|x - 3| < 2$

1-ci teoremə görə

$$-2 < x - 3 < 2$$

Bu bərabərsizliklərin bütün tərəflərinə 3 ədədini əlavə etsək

$$1 < x < 5.$$

**Misal 3.** . Bərabərsizliyi həll edin:

$$|2x - 1| < 3$$

$$-3 < 2x - 1 < 3$$

və ya

$$-2 < 2x < 4$$

$$-1 < x < 2$$

### 3.4. Ətraf anlayışı. Ətrafın daxili və sərhəd nöqtələri. Limit nöqtəsi

#### Ətraf anlayışı

**Tərif.** Verilmiş həqiqi  $x_0$  ədədini (həndəsi olaraq  $x_0$  nöqtəsini) öz daxilinə alan hər bir intervala həmin ədədin **ətrafı deyilir**.

$(\alpha, \beta)$  intervalı  $x_0$  ədədinin ətrafı olduqda

$$\alpha < x_0 < \beta \text{ münasibəti ödənilir. } (-1, 1), (-\frac{1}{2}, 1), (-1, 3)$$

və  $(-1, \frac{1}{2})$  intervalları sıfır ədədinin ətrafıdır.

$(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$   $\varepsilon > 0$  intervalında  $x_0$  ədədinin (nöqtəsinin)  $\varepsilon$ -ətrafı,  $x_0$  ədədinə  $\varepsilon$ -ətrafın mərkəzi,  $\varepsilon$ -ədədinə isə  $\varepsilon$ -**ətrafın radiusu deyilir**.

Aşkardır ki,  $x_0$  nöqtəsinin  $\varepsilon$ -ətrafında yerləşən hər bir  $x$  ədədi üçün  $x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon$  münasibəti ödənilir. Bu bərabərsizliklərin bütün tərəflərinə  $-x_0$  ədədini əlavə etsək:

$$-\varepsilon < x - x_0 < \varepsilon \quad (1)$$

(1) münasibəti isə yuxarıda icbat etdiyimiz 1-ci teoremə görə

$$|x - x_0| < \varepsilon \quad (2)$$

bərabərsizliyi ilə ekvivalentdir.

Deməli,  $x_0$  nöqtəsinin  $\varepsilon$ -ətrafında yerləşən ixtiyari  $x$  ədədi üçün (2) bərabərsizliyi ödənilir.

Qeyd edək ki,  $x_0$  ədədinin ixtiyari  $(\alpha, \beta)$  ətrafı daxilində yerləşən həmişə müəyyən  $\varepsilon$ -ətraf vardır. Buna inanmaq üçün  $\varepsilon$  ədədi olaraq  $\beta - x_0$  və  $x_0 - \alpha$  ədədlərinin hər birindən kiçik müsbət ədədi götürmək kifayətdir.

### **Daxili və sərhəd nöqtəsi**

**Tərif.**  $X = \{x\}$  ədədi çoxluğunu götürək. Verilmiş  $x_0 \in X$  nöqtəsinin  $X$  çoxluğuna tamamilə daxil olan hər hansı ətrafı varsa, onda  $x_0$  nöqtəsinə  $X$  çoxluğunun **daxili nöqtəsi deyilir**.

$x_0$  nöqtəsinin istənilən ətrafında həm  $X$  çoxluğuna daxil olan və həm də daxil olmayan nöqtələr yerləşirsə, onda  $x_0$  nöqtəsinə  $X$  çoxluğunun **sərhəd nöqtəsi deyilir**. Çoxluğun bütün sərhəd nöqtələri çoxluğuna həmin çoxluğun **sərhəddi deyilir**.

**Misal 1.**  $X = [a, b]$  ( $a < b$ ) çoxluğunun  $a < x_0 < b$  bərabərsizliyini ödəyən hər bir nöqtəsi (elementi) həmin çoxluğun daxili nöqtəsidir.  $a$  və  $b$  nöqtələri isə həmin çoxluğun sərhəd nöqtələridir və çoxluğun özünə daxildir.

**Misal 2.**  $X = (a, b)$  çoxluğunun hər bir nöqtəsi həmin çoxluğun daxili nöqtəsidir.  $a$  və  $b$  nöqtələri yenə də çoxluğun sərhəd nöqtələridir, lakin bu halda onlar çoxluğun özünə daxil deyildir.

**Misal 3.**  $X = \{0, 1, 2\}$  çoxluğunun bütün nöqtələri həmin çoxluğun sərhəd nöqtələridir.

### **Limit nöqtəsi**

**Tərif.**  $x_0$  nöqtəsinin istənilən ətrafında  $X$  çoxluğunun

həmin nöqtədən fərqli heç olmazsa bir nöqtəsi varsa, onda  $x_0$  nöqtəsinə  $X$  çoxluğunun **limit nöqtəsi deyilir**.

Aydındır ki, bu tərifini belə də demək olar:  $x_0$  nöqtəsinin istənilən ətrafında  $X$  çoxluğunun sonsuz sayda nöqtəsi yerləşdikdə ona həmin çoxluğun limit nöqtəsi deyilir.

Çoxluğun limit nöqtələrinin sayı sonlu və ya sonsuz ola bilər, yaxud da heç limit nöqtəsi olmaya bilər. Verilmiş çoxluğun limit nöqtələri həmin çoxluğun özünə daxil ola bilər, olmaya da bilər.

### 3.5. Qapalı çoxluq. İzolə edilmiş nöqtə

Bütün limit nöqtələri özünə daxil olan çoxluğa **qapalı çoxluq deyilir**. Qapalı çoxluğa  $[a, b]$  parçası misal ola bilər.

**Tərif:**  $X$  çoxluğuna daxil olan  $x_0$  nöqtəsinin həmin çoxluğun heç bir elementi yerləşməyən ətrafı olduqda,  $x_0$  nöqtəsinə  $X$  çoxluğun **izolə edilmiş nöqtəsi deyilir**.

**Misal 4.**  $X = [a, b]$  çoxluğunun bütün nöqtələri özünün limit nöqtəsidir və həmin çoxluğa daxildir.

**Misal 5.**  $X = (a, b)$  çoxluğunun bütün nöqtələri və  $a, b$  nöqtələri onun limit nöqtələridir. Bu çoxluğun limit nöqtələrinin bir hissəsi, yəni  $(a, b)$  intervalı, həmin çoxluğun özünə daxildir;  $(a, b) \subset X$ ,  $a$  və  $b$  nöqtələri isə həmin çoxluğun özünə daxil deyil.

**Misal 6.** Sonlu  $X = \{0, 1, 2\}$  çoxluğunun heç bir limit nöqtəsi yoxdur.  $0, 1$  və  $2$  nöqtələrinin hər biri  $X$  çoxluğunun izolə edilmiş nöqtəsidir.

## IV FƏSİL. FUNKSIONAL ASILILIQ

### 4.1. Dəyişən kəmiyyətlər. Funksiya. Həqiqi dəyişənli funksiya. Funksiyanın təyin oblastı və qiymətlər çoxluğu

Müxtəlif ədədi qiymətlər ala bilən kəmiyyətlərə **dəyişən kəmiyyətlər** deyilir. Adətən, riyaziyyatda dəyişən kəmiyyətlər  $x, y, z, \dots$  ilə, sabit kəmiyyətlər isə  $a, b, c, \dots$  ilə işarə edilir.

Dəyişmə xarakterinə görə dəyişən kəmiyyətlər əsasən iki qrupa bölünür:

**1.** Sonlu və ya hesabi qiymətlər ala bilən dəyişən kəmiyyətlər. Bunlara **diskret tipli** və ya sadəcə, **diskret dəyişən kəmiyyətlər** deyilir.

Məsələn, dəyişən  $x$  kəmiyyəti ancaq  $2, 4, 6, 8, \dots$  qiymətlərini ala bilirsə, o diskret dəyişən kəmiyyətdir. Diskret dəyişən kəmiyyətə başqa bir misal natural  $1, 2, 3, \dots, n, \dots$  ədədlərini ala bilən dəyişən kəmiyyətdir. Belə dəyişən kəmiyyətə **<<tam qiymətli dəyişən >>** deyilir və **nilə** işarə edilir.

**2.** Öz dəyişmə oblastındakı hər hansı  $x = x_0$  və  $x = x_1$  qiymətləri ilə bərabər, həmin ədədlər arasında yerləşən bütün həqiqi ədədləri, yəni  $x_0 < x < x_1$  qiymətlərini ala bilən dəyişən kəmiyyətlər. Belə dəyişən kəmiyyətlərə **kəsilməz tipli dəyişən kəmiyyətlər** deyilir.

Məsələn,  $(0, 1)$  intervalındakı bütün qiymətləri ala bilən  $x$  kəmiyyəti kəsilməz tipli dəyişən kəmiyyətdir.

Dəyişən  $x$  kəmiyyətinin ala bildiyi bütün qiymətlər çoxluğuna onun **dəyişmə oblastı** deyilir. Məsələn,  $x$  kə-

miyyəti  $[a,b]$  parçasındakı bütün qiymətləri ala bilirsə, onda  $[a,b]$  parçası onun dəyişmə oblastıdır.  $X$  (və ya  $n$ ) diskter dəyişən kəmiyyəti bütün natural ədədləri ala bilirsə, onda  $N=\{1,2,3,\dots,n,\dots\}$  çoxluğu onun dəyişmə oblastıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, kəsilməz tipli  $x$  dəyişən kəmiyyətinin dəyişmə oblastı  $(a,b)$  intervalı,  $[a,b]$  parçası,  $(a,b]$ ,  $[a,b)$ ,  $[a,\infty)$  və  $(-\infty,a]$  yarımintervalları və bütün ədəd oxu  $(-\infty,\infty)$  və s. ola bilər.

### a) Funksiya

Verilmiş  $x$  və  $y$  dəyişən kəmiyyətləri bir-birindən asılı olmayaraq istənilən qiymətləri ala bilirsə, yəni birinin aldığı qiymətlər, o birinin bu və ya başqa qiymətləri alıb-almamasından asılı deyilsə, onlara asılı olmayan və sərbəst dəyişən kəmiyyətlər deyilir. Aydındır ki, belə dəyişən kəmiyyətləri ayrılıqda öyrənməyin heç bir mənası yoxdur. Buna görə də riyaziyyat elmində asılı olan dəyişən kəmiyyətlər öyrənilir.

**Tərif :** Dəyişmə oblastları uyğun olaraq  $X$  və  $Y$  olan iki  $x$  və  $y$  dəyişən kəmiyyətini götürək. Hər hansı  $f$  qayda və ya qanunu vasitəsilə dəyişən  $x$  kəmiyyətinin  $X$  dəyişmə oblastındakı hər bir qiymətinə, dəyişən  $y$  kəmiyyətinin müəyyən bir qiymətini ( $Y$  çoxluqundan) uyğun və ya qarşı qoymaq mümkündürsə, onda  $X$  çoxluqundan  $Y$  çoxluğuna funksiya ( $X$  çoxluğunun  $Y$ -ə inikası) verilmişdir deyilir və  $y=f(x)$  ilə göstərilir.

Funksiya bəzən

$$Y=y(x), y=f(x), y=\varphi(x), y=F(x)$$

və s. şəklində göstərilir. Bu ifadələrdəki  $f, \varphi, F, \dots$  hərfləri hər hansı qanun və ya qaydalar vasitəsilə  $x$  – in verilmiş

qiymətinə  $y$ -in uyğun qiymətinin qarşı qoyulmasını göstərir.

### **b) Həqiqi dəyişənli funksiya**

Riyaziyyat kursunda dəyişən kəmiyyətlər öyrənilir. Dəyişən kəmiyyətlər iki növə bölünür. Bunlardan birincisi sərbəst dəyişən kəmiyyətlər, ikincisi isə sərbəst dəyişənlərdən asılı olaraq dəyişən kəmiyyətlərdir. Asılı olaraq dəyişən kəmiyyətlərə funksiya deyilir.

**Məsələn**, dairənin sahəsində ( $S = \pi R^2$ ) radius sərbəst dəyişən, dairənin sahəsi isə funksiyaadır.

### **c) Əsas elementar funksiyalar**

Analitik üsulla verilmiş aşağıdakı beş növ funksiya əsas elementar funksiyalar deyilir.

1. Qüvvətfunksiyası:  $y = x^\alpha$  ( $\alpha \in R$ ).

2. Üstlü funksiya:  $\alpha^x$  ( $\alpha > 0, \alpha \neq 1$ ).

3. Loqarifmik funksiya:  $y = \log_\alpha x$  ( $\alpha > 0, \alpha \neq 1$ ).

4. Triqonometrik funksiyalar:  $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$ ,  $y = \operatorname{tg} x$ ,  $y = \operatorname{ctg} x$ ,  $y = \operatorname{sec} x$ ,  $y = \operatorname{cosec} x$ .

5. Tərs triqonometrik funksiyalar:  $y = \operatorname{arcsin} x$ ,  $y = \operatorname{arccos} x$ ,  $y = \operatorname{arctg} x$ ,  $y = \operatorname{arcctg} x$ ,  $y = \operatorname{arcsec} x$ ,  $y = \operatorname{arccosec} x$ .

### **d) Funksiyanın təyin oblastı və qiymətlər çoxluğu.**

Yuxarıda funksiyanın tərifində götürülən  $X$  və  $Y$  çoxluqları  $R$  həqiqi ədədlər çoxluğunun alt çoxluqları olarsa, onda  $y = f(x)$  funksiyaasına ədədi (və ya həqiqi dəyişənli) funksiya deyilir.

$X$  çoxluğuna funksiyanın təyin oblastı (və ya varlıq oblastı),  $Y$  çoxluğuna isə funksiyanın dəyişmə oblastı (və ya qiymətlər çoxluğu) deyilir. Bunu aşağıdakı tərif şəklində söyləmək olar.



**Tərif.** Verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasında  $x$  arqumentinə ədədi qiymət verdikdə funksiya müəyyən sonlu qiymət alarsa, arqumentin bütün belə qiymətləri çoxluğuna funksiyanın təyin oblastı deyilir.

**Funksiyanın aldığı qiymətlər çoxluğuna bu funksiyanın dəyişmə oblastı deyilir.**

Bir qayda olaraq funksiyanın təyin oblastı  $D(f)$ , dəyişmə oblastı isə  $E(f)$  ilə işarə olunur. Tərifə əsasən:

$$D(f)=\{x / x \in X\} \text{ və } E(f)=\{y / y \in Y\}$$

**Ümumiyyətlə funksiya təyin olunmuşdur dedikdə aşağıdakılar başa düşülür:**

- 1) funksiyanın təyin oblastı verilmiş olur;
- 2) funksiyanın qiymətlər çoxluğu verilmiş olur;
- 3) təyin oblastının hər bir qiymətinə uyğun qiymətlər çoxluğundan yeganə bir qiyməti qarşı qoyan qayda verilmiş olur.

$x=\alpha$  qiyməti  $y=f(x)$  funksiyanının təyin oblastına daxil deyilsə,  $f(\alpha)$  simvolunun mənası yoxdur.

**Məsələn,**  $y=f(x)=x!$  funksiyanının təyin oblastı mənfi olmayan tam ədədlər çoxluğudur.

Odur ki,  $f(3)=3!=6$  simvolunun mənası olduğu halda,  $f(3,5)$  və  $f(\sqrt{2})$  simvollarının mənası yoxdur.

**Funksiyanın təyin oblastının təyinində əsasən aşağıdakı dörd halı nəzərə almaq lazım gəlir.**

**1. Məxrəcin sifra çevrilməsi.**

Bu halda funksiyanın ifadəsinə kəsir daxil olubsa, məxrəcin sifra çevrildiyi nöqtələrdə funksiya təyin olunmur.

**2. Cüt dərəcədən kökün daxil olması.**

Funksiyanın ifadəsində cüt dərəcədən kök iştirak edərsə, kökaltı ifadənin mənfi olduğu nöqtələrdə funksiya təyin olunmur.

### 3. $\log \alpha x$ ifadəsinin funksiya daxil olması.

**Yalnız  $x > 0$ ,  $0 < \alpha < 1$  və  $\alpha > 1$  olduqda funksiya təyin olunur.**

Əgər funksiya bir neçə ifadə daxil olarsa, onda funksiyanın təyin oblastı bunların hamısının təyin oblastlarının ortaq hissələri götürülür.

**Misallar:** Funksiyaların təyin oblastını tapın.

1.  $f(x) = \sqrt{\lg \frac{5x - x^2}{4}}$  funksiya  $x$ -in elə qiymətlərində təyin olunub ki,  $x$  aşağıdakı şərtləri ödəsin

$$\lg \frac{5x - x^2}{4} \geq 0$$

buradan

$$\frac{5x - x^2}{4} \geq 1 \text{ və ya } x^2 - 5x + 4 \leq 0$$

bərabərsizliyi həll etsək

$$1 \leq x \leq 4$$

alırıq.

Beləliklə funksiyanın təyin oblastı

$$D(f) = [1; 4] \text{ olur.}$$

$$2. f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 7x + 12 + \lg(x-1)}}{x^2 - 4}$$

**Həlli.**  $\sqrt{x^2 - 7x + 12}$  ifadəsi  $]-\infty; 3[$  və  $[4; +\infty[$ ,

$\lg(x-1)$  ifadəsi  $]1; +\infty[$ ,  $\frac{1}{x^2 - 4}$  ifadəsi  $]-\infty; -2[$ ,  $]-2; 2[$

və  $]2; +\infty[$  aralıqlarında təyin olunur. Funksiya bu aralıqların ortaq hissəsində təyin olunduğu üçün

$$D(f) = ]1; 2[ \cup ]4; +\infty[.$$

Qeyd edək ki, funksiyanın dəyişmə oblastını təyin etmək üçün elə bir qayda yoxdur. Bunu yalnız misalın xarakterinə görə xüsusi qaydalarla tapmaq lazım gəlir.

Odur ki, funksiyanın dəyişmə oblastının tapılması bəzən çox çətin olur.

$$3. f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} \text{ funksiyanın dəyişmə oblastını}$$

tapın.

$$\text{Həlli. } y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 4} \text{ götürək və bu bərabərlikdən } x\text{-i}$$

tapaq;

$$x = \pm \sqrt{\frac{4y - 1}{y - 1}}$$

Burada  $x$  dəyişəninin həqiqi qiymət alması üçün

$$\frac{4y - 1}{y - 1} > 0 \text{ olmalıdır. Bu isə } y \leq \frac{1}{4} \text{ və } y > 1 \text{ olduqda}$$

ödənilir.

$$\text{Deməli, } E(f) = \left] -\infty; \frac{1}{4} \right] \cup ]1; +\infty[.$$

## 4.2. Sərbəst və asılı dəyişənlər. Funksiyanın qrafiki və nöqtələrin həndəsi yeri

Funksiyaya tərif verilərkən qeyd olunmuşdu ki,  $y=f(x)$  funksiyanında  $x$ ,  $X$  çoxluğundan götürülmüş ixtiyari kəmiyyət,  $y$  isə  $f$  uyğunluğu vasitəsilə  $Y$ -dən götürülmüş müəyyən bir kəmiyyətdir. Göründüyü kimi  $x$  üzərinə heç bir şərt qoyulmamışdır, yəni sərbəst dəyişəndir.  $Y$  isə  $x$ -dən asılı olaraq dəyişən kəmiyyətdir.

Bu halda  $x$ -ə sərbəst dəyişən və ya argument,  $y$ -ə isə funksiyanın asılı dəyişəni və ya qiyməti deyilir.  $X$  çoxluğuna funksiyanın təyin oblastı,  $Y$  çoxluğuna isə onun qiymətləri çoxluğu deyilir.

$F(x)$  ilə  $Y$  çoxluğunun elə elementləri çoxluğunu işarə edək ki, onların hər biri  $y=f(x)$  funksiyanın heç olmazsa bir  $x \in X$  nöqtəsində aldığı qiymət olsun. Aydındır ki,  $f(x) \subset Y_1$  və  $f(x)$ ,  $Y$  çoxluqları bərabər olmaya da bilər.

Xüsusi halda,  $f(x)=Y$  olarsa, onda deyirlər ki,  $y=f(x)$  funksiyanı  $X$  çoxluğunu  $Y$  çoxluğu üzərində inikas etdirir. Bu halda istənilən  $x_1 \neq x_2$  ( $x_1 \in X$ ,  $x_2 \in X$ ) üçün  $f(x_1) \neq f(x_2)$  olarsa, onda  $X$  çoxluğunun  $Y$  çoxluğuna  $y=f(x)$  inikasına **qarşılıqlı birqiymətli inikas deyilir**.

$X$  çoxluğu ədədi çoxluq olduqda  $f(x)$  funksiyanı həqiqi dəyişənli funksiya deyilir.

Təbiətdə asılı dəyişən kəmiyyətlər istənilən qədər çoxdur.

**Misal 1.**  $R$  radiuslu dairənin sahəsi

$$S = \pi R^2$$

Düsturu ilə hesablanır.

Aydındır ki,  $R$  radiusu dəyişdikdə ona uyğun olaraq dairənin sahəsi də dəyişəcəkdir, yəni  $R$ -in bir qiymətinə  $S$ -in müəyyən bir qiyməti uyğundur. Bu uyğunluqla bir  $S=f(R)$  funksiyanı təyin olunur.

Bu funksiyanın uyğunluq qanunu ( $f$ ) göstərir ki,  $R$ -in verilmiş qiymətinə  $S$ -in uyğun olan qiymətini tapmaq üçün onu kvadrata yüksəldib nəticəni  $\pi$  ədədinə vurmaq lazımdır.

**Qeyd 1.** Tərifdən aydındır ki, funksiya verildikdə  $x$ -in hər bir qiymətinə onun müəyyən bir  $y$  qiyməti uyğun olmalıdır. Bu uyğunluğun hansı qanun-qayda və ya

vasitələrlə yaradılmasının prinsipial heç bir mənası yoxdur. Tərifdə bu uyğunluğun xarakteri haqqında heç bir tələb qoyulmur.

**Qeyd 2.** Tərifdə arqumentin müxtəlif qiymətlərinə funksiyanın da hökmən müxtəlif qiymətlərinin uyğun olması tələb edilmir. Arqumentin bütün qiymətlərinə funksiyanın ancaq bir qiyməti uyğun ola bilər. Buna görə də arqumentin bütün qiymətlərinə eyni sabit  $C$  qiyməti alan funksiya da baxılır.

Verilmiş  $y=f(x)$  funksiyanın  $x_0 \in X$  nöqtəsində aldığı qiymətə onun həmin nöqtədəki xüsusi qiyməti deyilir və

$$Y_0=f(x_0)=y$$

**Misal 3.**  $F(x)=x^2+\lg x$  funksiyanın  $x=1$  və  $x=10$  nöqtələrindəki qiymətləri

$$F(1)=1 \text{ və } F(10)=101 \text{ olacaqdır.}$$

### **Funksiyanın qrafiki və nöqtələrin həndəsi yeri**


Fərz edək ki,  $y=f(x)$  funksiyanın  $[a,b]$  parçasında təyin olunmuşdur. Müstəvi üzərində düzbucaqlı  $Oxy$  koordinat sistemi götürək və absis oxu üzərində  $[a,b]$  parçasını qeyd edək.  $[a,b]$  parçasının hər hansı nöqtəsi  $x=x_0$  və ya  $N(x_0)$  olsun. Bu nöqtədə  $y=f(x)$  funksiyanın  $y_0=f(x_0)$  qiymətini alır,  $N(x_0)$  nöqtəsindən absis oxuna perpendikulyar çəkək. Bu perpendikulyar üzərində elə  $M$  nöqtəsi var ki,  $NM=f(x_0)$  olur.

Bundan sonra  $NM$  düz xətt parçasının  $M$  nöqtəsini  $f(x)$  funksiyanın  $x=x_0$  nöqtəsindəki qiymətinin həndəsi göstərilişi hesab edəcəyik. Bu qayda ilə  $f(x)$  funksiyanın  $[a,b]$  parçasının hər bir nöqtəsindəki qiymətini həndəsi olaraq göstərən nöqtəni tapa bilərik.  $y=f(x)$  funksiyanın  $[a,b]$  parçasındakı qiymətlərini həndəsi göstərən bütün


nöqtələrin həndəsi yeri həmin funksiyanın həndəsi göstəriləsi və ya  $[a,b]$  parçasında qrafiki adlanır. Başqa sözlə, absisləri arqumentin qiymətləri, ordinatları isə funksiyanın arqumentin həmin qiymətinə uyğun qiymətləri olan  $M(x,y)$  nöqtələrinin həndəsi yerinə  $y=f(x)$  funksiyanının qrafiki deyilir(şəkil 1,2).

Təyin oblastı  $[a,b]$  parçası (və ya hər hansı sonsuz çoxluq) olan funksiyanın qrafikini praktiki olaraq qurmaq üçün onun bütün qiymətlərini həndəsi göstərən nöqtələri tapmaq mümkün olmur.

Buna görə də verilmiş funksiyanın qrafiki, ya onun müəyyən xassələrinə əsasən və ya da, qrafik üzərində yerləşən sonlu sayda  $M_k(x_k,y_k)$  ( $k=\overline{1,n}$ ) nöqtələrini tapıb onları bütöv xətlə birləşdirərək təqribi qurulur.



Şəkil 1.



Şəkil 2.

Aydındır ki, verilmiş funksiyanın qrafiki onun təyin oblastından asılı olaraq bütöv bir xətt, hissə-hissə xətlər çoxluğu, izolə edilmiş nöqtələr çoxluğu və s. şəkildə ola bilər. Bunu aşağıdakı misallardan da aydın görmək olur.

**Misal 1.**  $N=\{1,2,3,\dots\}$  çoxluğunda təyin olunmuş

$$f(x)=\frac{3}{x}$$

Funksiyanın qrafiki sonsuz sayda izolə edilmiş nöqtələr çoxluğundan ibarətdir.

**Misal 2.**  $y=x+5$  funksiyanının qrafiki düz xətdir. Bu düz xətti qurmaq üçün  $x$  arqumentinə  $x=0$  və  $x=-5$  qiymətlərini verərək funksiyanın uyğun qiymətlərini hesablayaq :  
 $y=5$  və  $y=0$ .

Deməli,  $M_1(0,5)$  və  $M_2(-5,0)$  nöqtələrindən keçən düz xətt verilmiş funksiyanın qrafikidir.


Verilmiş funksiyanın təyin oblastı bütün həqiqi ədədlər çoxluğu, yəni  $(-\infty, \infty)$  çoxluğudur.

**Misal 3.** Aşağıdakı kimi iki düsturla təyin olunan


$$f(x)=\begin{cases} x^2, & x \leq 0 \text{ olduqda,} \\ x+5, & x > 0 \text{ olduqda} \end{cases}$$

Funksiyanının qrafiki iki hissədən ibarət xətdir: Oy oxundan sol tərəfdə (sol yarımmüstəvidə) parabola hissəsi, sağ tərəfdə isə düz xəttin bir hissəsidir (şəkil 4).

Baxdığımız funksiyanın təyin oblastı bütün ədəd oxu və ya  $(-\infty, \infty)$  çoxluğudur:



Şəkil 3.



Şəkil 4.

**Misal 4.**

$$f(x)=\begin{cases} -1, & x < 0 \text{ olduqda,} \\ 1, & x > 0 \text{ olduqda,} \\ 0, & x = 0 \text{ olduqda} \end{cases}$$

kimi təyin olunan  $f(x)=\text{sign } x$  (belə oxunur: <<ef iks bərabərdir siqnum x>>) funksiyanının qrafiki iki şüadan ibarətdir (şəkil 5).


Bu funksiyanın təyin oblastı  $(-\infty, \infty)$  çoxluğudur.

**Misal 5.** Təyin oblastı  $(-\infty, \infty)$  çoxluğu olan


$$Y=|x|$$

və ya

$$Y=\begin{cases} x, & x \geq 0 \text{ olduqda,} \\ -x, & x < 0 \text{ olduqda} \end{cases}$$



**Şəkil 5.**



**Şəkil 6.**

Funksiyasının qrafiki 1-ci və 2-ci koordinat bucaqlarının tən bözlərindən ibarət olan sınıq xətdir (şəkil 6).

**Tərif.** Müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sistemində koordinatları  $(x, f(x))$ ,  $x \in D(f)$  olan nöqtələrin həndəsi yerinə  $y=f(x)$  funksiyasının qrafiki deyilir.

Funksiyasının qrafiki onun təyin oblastından asılı olaraq bütöv bir xətt, hissə-hissə xətlər və nöqtələr çoxluğu ola bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, koordinatları verilmiş tənliyi ödəyən nöqtələr çoxluğuna həmişə bir funksiyanın qrafiki kimi baxmaq olmaz. Məsələn,

$$x^2+y^2=1 \tag{1}$$

tənliyini vahid çevrə üzərində olan bütün nöqtələrin koordinatları ödəyir. Lakin bu çevrəni funksiyanın qrafiki kimi qəbul etmək olmaz. Çünki burada arqumentin bir qiymətinə qarşı iki qiymət qarşı qoyulur.




Buna, verilən  $x \left( x \in [-1; +1] \right)$  absisinə nəzərən ordinatı (1) tənliyindən təyin olunan nöqtələrin həndəsi yeri kimi baxmaq lazımdır. Bu çevrənin yuxarı yarım hissəsi  $y = +\sqrt{1-x^2}$  funksiyasının qrafiki, aşağı yarım çevrəsi isə  $y = -\sqrt{1-x^2}$  funksiyasının qrafikidir.

**Teorem.** Müstəvi üzərində düzbucaqlı koordinat sisteminə nəzərən götürülmüş əyri müəyyən bir funksiyasının qrafiki olması üçün, ordinat oxuna paralel olan hər bir düz xəttin əyrini ən çoxu bir nöqtədə kəsməsi zəruri və kafi şərtidir.


#### 4.3. Polyar koordinat sistemi. Polyar koordinat sisteminə funksiya qrafikinə qurulması

Koordinat metodunun ideyası ondan ibarətdir ki, nöqtənin vəziyyəti iki ədədin köməyi ilə birqiyəmli təyin edilir. Bu ədədlərin həndəsi mənası ondan ibarətdir ki, bunlar müəyyən bir koordinat sistemini verir. Düzbucaqlı koordinat sistemindən az vacib olmayan polyar koordinat sistemi vardır. Bu koordinat sistemini quraq.

Müstəvi üzərində **polyus** adlanan  $O$  nöqtəsini götürək.  $O$  nöqtəsindən **polyar** ox adlanan istiqamətlənmiş  $OP$  yarımoxunu çəkək (Şəkil 7).



Şəkil 7.



Şəkil 8.

Tutaq ki, M müstəvi üzərində götürülmüş ixtiyari nöqtədir. OM parçası vasitəsilə O polyusu ilə M nöqtəsini birləşdirək.  $OM = \rho$  məsafəsi **polyar radius** və

$\varphi = \angle XOM$  **polyar bucaq** adlanır. ( $\varphi$ ) polyar ox polyar radius arasındakı saat əqrəbi istiqamətində yönəlmiş bucaqdır (şəkil 8).

M nöqtəsinin polyar koordinat sistemində koordinatları  $\rho$  və  $\varphi$ -dir və bu aşağıdakı kimi yazılır:  $M(\rho, \varphi)$ , belə ki, birinci yerdə polyar radius -  $\rho$ , ikinci yerdə polyar bucaq -  $\varphi$  yazılır.

Aydındır ki, polyar koordinatlar aşağıdakı qiymətləri ala bilərlər:

$$0 \leq \rho < +\infty; 0 \leq \varphi < 2\pi$$

Nöqtənin düzbucaqlı dekart koordinatları ilə polyar koordinatları arasında

$$x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi \quad (1)$$

şəkilndə əlaqə düsturları vardır. Bu bərabərliklərdən

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \varphi = \arctg \frac{y}{x} \quad (2)$$

düsturlarını alırıq. Beləliklə,  $\rho$  və  $\varphi$  polyar koordinatları məlum olduqda (1) düsturundan nöqtənin düzbucaqlı koordinat sistemində koordinatlarını və tərsinə x və y dekart koordinatları məlum olduqda isə (2) düsturunun köməyi ilə  $\rho$  və  $\varphi$  polyar koordinatlarını tapmaq olar.

Polyar koordinatlarla verilmiş A ( $\rho_1, \varphi_1$ ) və B ( $\rho_2, \varphi_2$ ) nöqtələri arasındakı məsafə

$$d = |AB| = \sqrt{\rho_1^2 + \rho_2^2 - 2\rho_1 \rho_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \quad (3)$$

düsturu ilə hesablanır.

## Polyar koordinat sistemində funksiya qrafikinə qurulması

Fərz edək ki,  $\rho=f(\varphi)$  funksiyası polyar koordinatlarla verilmişdir.  $\varphi$  arqumentinin funksiyanın varlıq oblastına daxil olan hər bir qiymətinə  $\rho$ -nün bir qiyməti uyğun olar.  $\rho$  və  $\varphi$ -nin hər bir belə qiymətləri üçün polyar koordinat sistemində bir M nöqtəsinin koordinatlarıdır:  $M=(\rho, \varphi)$  nöqtələrinin həndəsi yeri bir xətt verir. Bu xəttə verilmiş funksiyanın polyar koordinat sistemində qrafiki deyilir.

Verilmiş  $\rho=f(\varphi)$  funksiyanın polyar koordinat sistemində qrafikini qurmaq üçün  $\varphi$  arqumentinə funksiyanın varlıq oblastına daxil olan  $\varphi=\varphi_k(k=1,2,\dots,n)$  qiymətini verərək, funksiyanın uyğun  $\rho_k=f(\varphi_k)$  ( $k=1,2,\dots,n$ ) qiymətləri hesablanır. Bu  $\rho_k$  və  $\varphi_k$  ədədləri polyar koordinat sistemində  $M_k(\rho_k, \varphi_k)$  ( $k=1,2,\dots, n$ ) nöqtələrini təyin edir. Həmin nöqtələri tapıb, onları bütöv xətlə birləşdirsək bir əyri alarıq. Bu əyri verilmiş funksiyanın polyarkoordinat sistemində təqribi qrafiki olar.

**Misal 1.**  $\rho = a\varphi$  funksiyanın qrafikini qurmalı, (burada  $a$  sabit ədəddir). Bu məqsədlə  $\varphi$  arqumentinə

$$\varphi=0; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{4}; \pi; \frac{3\pi}{2}; 2\pi, \dots$$

Qiymətlərini verərək,  $\rho$ -nün uyğun qiymətləri təqribi olaraq hesablanır:

$$\rho=0; 0,78 a; 1,57 a; 2,36 a; 3,14 a; 4,71 a; 6,28 a; \dots$$

Burada bir qanunauyğunluğu qeyd edək: əgər  $0,75 \cdot a = b$  qəbul etsək onda :

$$1,57a \approx 2b; 2,36 a \approx 3b;$$

$$3,14a \approx 4b; 4,71a \approx 6b;$$

$$6,28a \approx 8b; \dots$$

İndi müstəvi üzərində

$$O(0,0); M_1\left(b, \frac{\pi}{4}\right); M_2\left(2b, \frac{\pi}{2}\right); M_3\left(3b, \frac{3\pi}{4}\right); M_4(4b, \pi);$$

$$M_5\left(6b, \frac{3\pi}{2}\right); M_6(8b, 2\pi); \dots \text{ nöqtələrini quraq və hə-}$$

min nöqtələri bütöv xətlə birləşdirək (şəkil 9). Alınan əyri verilmiş funksiyanın qrafikidir. Bu əyriyə Arximed spirali deyilir. Arximed spiralinə, öz başlanğıcı ətrafına müntəzəm fırlanan şüa üzərində müntəzəm hərəkət edən nöqtənin cızdığı əyri kimi də baxmaq olar.


**Misal 2.**  $\rho = \frac{\alpha}{\varphi}$  ( $\alpha = \text{const}$ ) funksiyanın qrafikini qurmali.

Bu funksiyanın qrafiki də əvvəlki misalda verilən funksiyanın qrafiki kimi qurulur (şəkil 10). Alınan əyri hiperbolik spiral adlanır.


**Misal 3.**  $\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi$  funksiyanın qrafiki Lemniskat adlanan xətdir (şəkil 11).

Funksiyanın ifadəsindən aydındır ki,  $\varphi = 0$  olduqda  $\rho = a$  olur.  $\varphi$  arqumenti 0-dan  $\frac{\pi}{4}$ -ə qədər dəyişdikdə  $a$ -dan sıfıra qədər azalır.


$\varphi$ -nin  $-\frac{\pi}{4} < \varphi < \frac{\pi}{4}$  qiymətlərinə  $\rho$ -nun xəyali qiymətləri uyğundur. Yəni arqumentin həmin qiymətlərinə Lemniskat üzərində heç bir nöqtə uyğun deyildir.



Şəkil 9.



Şəkil 10.



Şəkil 11.


#### 4.4. Qrafiklərin deformasiyası. Funksiyanın verilmə üsulları

Verilmiş  $y=f(x)$  funksiyanın qrafiki məlum olduqda onunla “qohum” olan

$$y=mf(px+q)+l \quad (m \neq 0, p \neq 0) \quad (1)$$

funksiyanın qrafikini qurmaq mümkündürmü?

Mümkündür.  $y=f(x)$  funksiyanın qrafikindən (1) funksiyanın qrafikini almaq üçün onun üzərində aşağıda göstəriləyi kimi deformasiya aparmaq lazımdır:



Şəkil 1.

1. Verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasının qrafikində  $y=f(x)+l$  (2) funksiyasının qrafikini almaq üçün Oy oxu üzrə onun yerini  $|l|$  məsafəsi qədər dəyişmək lazımdır:  $l > 0$  olduqda  $y=f(x)$  funksiyasının qrafiki Oy oxu üzrə  $|l|$  məsafəsi qədər yuxarıya,  $l < 0$  olduqda isə  $|l|$  məsafəsi qədər aşağıya köçürülməlidir (şəkil 1). Bu o deməkdir ki, verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasının qrafiki üzərində olan hər bir  $M(x,y)$  nöqtəsini  $M_0(x,y+l)$  ilə əvəz etmək lazımdır.

2. Verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasının qrafikindən

$$Y=f(x+q) \quad (2)$$

funksiyasının qrafikini almaq üçün onu Ox oxu istiqamətində  $q$  məsafəsi qədər hərəkət etdirmək lazımdır:  $q > 0$  olduqda qrafik  $q$  məsafəsi qədər sola,  $q < 0$  olduqda isə  $q$  məsafəsi qədər sağa köçürməlidir. Bu o deməkdir ki, verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasının qrafiki üzərində olan hər bir  $M(x,y)$  nöqtəsini  $M_0(x-q,y)$  nöqtəsi ilə əvəz etmək lazımdır (şəkil 2).

3. Verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasının qrafikindən

$$Y=mf(x) \quad (3)$$


Funksiyasının qrafikini almaq üçün Oy oxu istiqamətində qrafik " $m$  dəfə dartılmalıdır":  $|m| > 1$  olduqda qrafik  $m$  dəfə dartılır (uzanır),  $|m| < 1$  olduqda isə  $m$  dəfə

sıxılmalıdır (qısaldılmalıdır). Bu məqsədlə verilmiş qrafik üzərində olan hər bir  $M(x,y)$  nöqtəsini  $M_0(x,my)$  nöqtəsi ilə əvəz etmək lazımdır (şəkil 3)


4. Verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasının qrafikindən

$$y=f(px) \quad (4)$$

funksiyasının qrafikini almaq üçün verilmiş qrafiki Ox oxu istiqamətində "p dəfə dartmaq" lazımdır. Bu işə verilmiş




Şəkil 2.



Şəkil 3.

qrafik üzərində olan hər bir  $M(x,y)$  nöqtəsini  $M_0(x/p,y)$  nöqtəsi ilə əvəz etmək deməkdir (şəkil 4).



Şəkil 4.

Aşkıdır ki, verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasının qrafikindən (1) funksiyasının qrafikini almaq üçün onun üzərində 1-4-cü bənddə göstərilən deformasiyaların lazımi ardıcılıqla aparmaq lazımdır.

Oxşar qayda ilə verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasının qrafikindən  $y=|f(x)|$ ,  $y=\frac{1}{f(x)}$ ,  $y=\frac{1}{|f(x)|}$  və s. funksiyaların qrafiklərini də almaq olar.

### **Funksiyanın verilmə üsulları**

$y=f(x)$  funksiyası o zaman verilmiş, məlum və təyin olunmuş hesab edilir ki:

1) funksiyanın təyin oblastı, yəni  $x$  arqumentinin ala bildiyi qiymətlər çoxluğu göstərilsin ;

2)  $x$ -in hər bir qiymətinə  $y$ -in müəyyən bir qiymətini uyğun qoyma qanunu, yəni  $x$  və  $y$  arasındakı uyğunluq qanunu göstərilsin;

3) Funksiya əsasən analitik üsulla, cədvəl şəklində, qrafiki üsulla və proqram vasitəsilə verilir.

### **Funksiyanın analitik üsulla verilməsi**

Funksiya, arqumentin verilmiş qiyməti üzərində hansı əməlləri hansı ardıcılıqla apararaq funksiyanın uyğun qiymətini almağı göstərən düstur ilə verildikdə deyir ki, funksiya analitik üsulla verilmisdir.

Funksiya  $y=f(x)$  düsturu ilə verildikdə bərabərliyin sağ tərəfinə  $(f(x)-ə)$  funksiyanın analitik ifadəsi deyilir. Funksiya analitik üsulla verildikdə onun təyin oblastı bəzən göstərilmir. Bunu funksiyanın analitik ifadəsinə əsasən tapmaq mümkündür.

Verilmiş  $y=f(x)$  funksiyasının analitik ifadəsinin mənası olduğu və funksiyanın sonlu həqiqi qiymətlər aldığı nöqtələr çoxluğuna həmin funksiyanın varlıq oblastı deyilir.



**Misal 1.** Analitik üsulla verilmis  $y = x^2 + \lg x$  funksiyanın varlıq oblastını tapmalı.

Funksiyanın  $x^2 + \lg x$  analitik ifadəsinin birinci həddi olan  $x^2$ , arqumentin istənilən qiymətində sonlu həqiqi qiymətlər alır. İkinci həddi  $\lg x$  isə arqumentin ancaq musbət qiymətlərində təyin olunmuşdur. Deməli, verilmiş funksiyanın varlıq oblastı arqumentin musbət qiymətlər çoxluğu, yəni  $(0, \infty)$  intervalındadır.

Hər hansı çoxluqda təyin olunmuş funksiyanı onun analitik ifadəsi ilə qarışdırmaq olmaz. Funksiya təyin oblastının muxtəlif hissələrində muxtəlif analitik ifadələrlə verilə bilər.

$$\begin{cases} x^2, & x \leq 0 \text{ olduqda} \\ x + 5, & x > 0 \text{ olduqda} \end{cases}$$

funksiyası iki bərabərliklə bütün ədəd oxu üzərində təyin olunmuşdur. Lakin ədəd oxunun (yəni təyin oblastının) bir hissəsində onun analitik ifadəsi  $x^2$  ( $x \leq 0$  olduqda), o biri hissəsində ( $x > 0$  olduqda) isə  $(x+5)$ -dir. Buradan aydındır ki, funksiya bir və ya bir neçə bərabərlik vasitəsilə verilə bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün funksiyalar heç də analitik üsulla verilmir. Müəyyən çoxluqda təyin olunmuş funksiyanın analitik ifadəsi məlum olmaya da bilər. Funksiyanın analitik üsulla verilməsi sadə, yığcam və üzərində riyazi əməllər aparmaq üçün munasib olsa da, funksiya belə verildikdə funksional asılılığın xarakteri, funksiya qiymətlərinin arqumentin qiymətlərindən asılı olaraq necə dəyişməsi əyani görünür.

### **Funksiyanın cədvəl şəklində verilməsi**

Funksiyanın analitik üsulla verilməsinin riyazi tədqiqatlarda böyük üstünlüyü vardır. Lakin bu üsulla verilmiş çox işlədilən bəzi funksiyaların qiymətlərini tapmaq

üçün bəzən bir çox mürəkkəb hesablamalar aparmaq lazım gəlir. Praktiki iş zamanı bu üsulla funksiyaların qiymətini tapmaq əlverişli deyildir. Buna görə də çox islədilən bəzi  $y=f(x)$  funksiyalarının arqumentin müəyyən qiymətlərinə uyğun olan qiymətləri qabaqcadan hesablanıb, aşağıdakı şəkildə göstərilir:

$x$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	...	$x_n$
$y$	$y_1=f(x_1)$	$y_2=f(x_2)$	$y_3=f(x_3)$	...	$y_n=f(x_n)$

Arqumentin verilmiş qiymətinə (əlbəttə, arqumentin bu qiyməti cədvəldəki  $x_1, x_2, \dots, x_n$  qiymətləri arasında varsa) funksiyanın hansı qiyməti uyğun olduğu cədvəldən asanlıqla tapılır. Bu halda deyirlər ki, funksiya cədvəl vasitəsilə verilmişdir.

Cədvəldəki  $x_i$  ( $i=1, n$ ) ədədlərindən düzəlmiş  $x_2-x_1, x_3-x_2, \dots$  fərqləri həmin cədvəlin addımları adlanır. Bu addımlar eyni, yəni  $x_{i+1}-x_i=h$  ( $i=1, 2, \dots, n-1$ ) olduqda ona sabit addımlı cədvəl deyilir. Bu halda arqument ancaq  $x_1, x_1+h, x_2+2h, \dots$  qiymətlərini ala bilər. Praktiki işlərdə belə cədvəllərdən istifadə etmək daha əlverişlidir. Bir sıra hadisələri təcrübi olaraq öyrənərkən, dəyişən kəmiyyətlər arasındakı asılılıq bəzən cədvəl şəkildə yaradılır. Triqonometrik və loqarifmik funksiyaların cədvəl vasitəsilə verilməsi orta məktəbdən məlumdur.


### **Funksiyanın qrafik üsulla verilməsi**

Tutaq ki, müstəvi üzərində hər hansı AB əyrisi verilmişdir (şəkil 1). Fərz edək ki, absis oxuna perpendikulyar qaldırılmış düz xətlər bu əyrini ancaq bir nöqtədə kəsir. A nöqtəsinin absisi  $a$ , B nöqtəsinin absisi isə  $b$  olsun.  $x$ -in  $[a, b]$  parçasındakı hər bir qiymətinə uyğun olan M nöqtəsindən absis oxuna perpendikulyar keçirək. Bu perpendi-

kulyar AB əyrisini bir N nöqtəsində kəsər. MN parçasının qiyməti  $y_0$  olsun. Bu  $y_0$  ədədini arqumentin  $x_0$  qiymətinə uyğun qoyar:

$$x_0 \rightarrow y_0$$

Beləliklə, yuxarıdakı qurma vasitəsilə  $x$ -in  $[a, b]$  parçasındakı hər bir qiymətinə bir  $y$  ədədi qarşı (uyğun) qoyulur. Deməli, verilmiş əyrinin ordinatı ( $y$ ) absisi( $x$ ) funksiyasıdır və bu funksional asılılıq ( $y=y(x)$ ) **AB** əyrisinin verilməsi ilə tamamilə təyin olunub. Bu halda deyirlər ki,  $y=y(x)$  funksiyası qrafik üsulla verilmişdir.



**Şəkil 1.**

Funksiyanın qrafiki üsulla verilməsinin bir cəhəti ondan ibarətdir ki, həmin funksiyanın dəyişmə xarakterini əyani olaraq görmək mümkün olur. Bundan başqa, bir sıra məsələlərin həllində dəyişən kəmiyyətlər arasındakı funksional asılılığı bəzən ancaq qrafiki olaraq almaq mümkün olur. Məsələn, baroqraf adlanan cihaz atmosfer təzyiqinin zamandan asılı olaraq dəyişməsinə qrafiki olaraq cızır. Bu qrafik işə ucan təyyarənin yerdən olan yüksəlişini zamandan asılı olaraq təyin etməyə imkan verir.

### **Funksiyanın program vasitəsilə verilməsi**

Bu üsulla arqumentin verilmiş qiymətinə funksiyanın uyğun qiymətini tapmaq üçün muasir hesablama maşınlarından istifadə olunur. Arqumentin verilmiş qiymətlərinə uyğun funksiya qiymətlərini tapmaq qanunu (məsələn, ri-

yazı düstur) proqram şəklində yazılır və hesablama maşınına daxil edilir. Maşın göstərilən proqram əsasında funksiyanın qiymətlərini hesablayır.

**Qeyd.** Biz funksiyanın əsas verilmə üsullarını (analitik, cədvəl, qrafik, proqram) göstərdik. Funksiya bunlardan fərqli başqa üsulla da verilə bilər. Məsələn, funksiyanın verilmə qaydasını sözlərlə də təsvir etmək olar.

**Misal 3.** Dirixle funksiyası aşağıdakı şəkildə təyin olunur:


$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ rasiional ədəd olduqda} \\ 0, & x \text{ irrasional ədəd olduqda} \end{cases} \quad (1)$$

Bu funksiyanın verilmə qaydası sözlərlə təsvir olunmuşdur.

**Misal 4.**  $[x]$  ilə  $x$  ədədini aşmayan ən böyük tam ədədi işarə etməklə

$$y = [x] \quad (2)$$

funksiyasını təyin edə bilərik. Buna  $x$ -in tam hissəsi və ya antye  $x$  funksiyası deyilir. (2) funksiyasının təyin oblastı bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur.  $[2] = 2$ ,  $[1,3] = 1$ ,  $[-0,5] = -1$  və s. Onun qrafiki 2-ci şəkildə göstərilən "Pilləvari" xətdir. Bu funksiya sözlərlə verilmişdir.



Şəkil 2.

**Misallar.**

- 1)  $y = x^2 - 1$  ; 2)  $y = x + \sin x$  ;

$$3) y=2^x ; \quad 4) y=|x|;$$

$$5) y=\text{sign}x = \begin{cases} -1, x < 0 \text{ olduqda} \\ 0, x = 0 \text{ olduqda} \\ +1, x > 0 \text{ olduqda} \end{cases}$$

#### 4.5. Qeyri – aşkar funksiya

Funksiya analitik üsulla verildikdə iki hal ola bilər:  $x$  (argument) və  $y$  (funksiya) arasındakı asılılığı ifadə edən riyazi düstur  $y$ -ə nəzərən həll olunmuş şəkildə, yəni  $y=f(x)$  şəkildə verilə bilər. **Bu halda funksiya aşkar şəkildə verilmişdir deyilir.**

**Misal 1.**  $y=2x+1$ ,  $y=2x^3$ ,  $y=x^3+3x+1$  və s. funksiyaları aşkar şəkildə verilmişdir.

Aşkar şəkildə verilmiş  $y=f(x)$  funksiyanı **aşkar funksiya** deyilir.

$x$  və  $y$  arasındakı asılılığı ifadə edən riyazi düstur  $y$ -ə nəzərən həll olunmamış şəkildə, yəni

$$f(x, y)=0 \tag{1}$$

şəkildə verildikdə, deyirlər ki,  $y=y(x)$  və ya  $y=f(x)$  funk-

siyası qeyri-aşkar şəkildə verilmişdir. Bu halda təyin olunan  $y=y(x)$  funksiyanı **qeyri-aşkar funksiya** deyilir.

(1) tənliyi ilə verilmiş qeyri-aşkar funksiyanı bəzən  $y$ -ə nəzərən həll edərək, aşkar şəkllə gətirmək mümkün olur. Bir çox hallarda isə (1) tənliyini  $y$ -ə nəzərən həll etmək çox çətin olur və ya mümkün olmur. Tərsinə, funksiya  $y=f(x)$  aşkar şəkildə verildikdə onu  $y-f(x)=0$  şəkildə yazmaqla qeyri-aşkar şəkildə verilmiş funksiya alırıq.

**Misal 2.**  $3x-y+2=0$  tənliyi ilə  $y$  dəyişəni  $x$ -in qeyri-aşkar funksiyası kimi verilmişdir. Həmin tənliyi  $y$ -ə nəzərən həll edərək funksiyanı

$$y = 3x + 2$$

kimi aşkar şəkllə gətirmək olur.

(1) şəkllində verilmiş hər bir tənlik bir funksiyanı təyin edir demək səhvdir. Belə tənlik ola bilər ki, heç bir funksiyanı təyin etməsin və ya bir neçə funksiyanı təyin etsin.

**Misal 3.**  $x^2+y^2+5=0$  tənliyi heç bir funksiya təyin etmir.  $x$ -in həqiqi qiymətlərində  $y$ -in bu tənliyi ödəyən heç bir həqiqi qiyməti yoxdur.

**Misal 4.**  $x^2+y^2-5=0$  tənliyi  $y = +\sqrt{5-x^2}$  və  $y = -\sqrt{5-x^2}$  kimi iki funksiyanı təyin edir.

(1) tənliyi ilə verilmiş qeyri-aşkar  $y=y(x)$  funksiyasının təyin oblastından götürülmüş  $x_0$  nöqtəsində qiymətini hesablamaq üçün həmin tənlikdə  $x$  əvəzinə  $x_0$  yazaraq, alınan

$$f(x_0, y) = 0$$

tənliyini  $y$ -ə nəzərən “həll etmək lazımdır”.

Beləliklə, hər hansı çoxluqdan götürülmüş hər bir  $x$ -ə qarşı  $y$ -in

$$f(x, y) = 0$$

tənliyini ödəyən qiymətini uyğun qoysaq, (1) tənliyi ilə həmin çoxluqda təyin olunmuş qeyri-aşkar  $y=y(x)$  funksiyasını almış olarıq.

## V FƏSİL. MƏHDUD FUNKSİYA. MONOTON FUNKSİYA

### 5.1.Funksiyanın parametrik şəkildə verilməsi

Funksiyanın analitik üsulla verilməsinin bir yolunu da göstərək.

Tutaq ki,  $x$ (arqument) və  $y$ (funksiya) dəyişənləri başqa bir  $t$  dəyişəninin aşkar funksiyası şəklində verilmişdir:

$$\left. \begin{array}{l} x = \varphi(t) \\ y = t \end{array} \right\} t \in T \quad (1)$$

$t$ -nin  $T$  çoxluğundakı hər bir  $t_0$  qiymətinə (1) münasibəti vasitəsilə  $x$  və  $y$ -in  $x_0 = \varphi(t_0)$  və  $y_0 = \psi(t_0)$  qiymətləri uyğun qoyulur. Bu ədədlərin ikincisini birincisinə qarşı qoysaq

$$x_0 \rightarrow y_0 \quad (2)$$

onda,  $y$ dəyişəni  $x$ -in funksiyası kimi təyin olunur. Aydınır ki, (1)münasibəti bir və ya bir neçə funksiyanı təyin edə bilər.

Funksiyanın belə üsulla verilməsinə onun parametrik şəkildə verilməsi,  $t$ -yə isə parametr deyilir.

#### Misal 1.

$$\left. \begin{array}{l} x = t - 2 \\ y = 3t + 1 \end{array} \right\} [t \in (-\infty, \infty)] \quad (3)$$

parametrik şəkildə verilmiş funksiya  $y=f_0(x)$  olsun. (3) münasibətinin təyin etdiyi yeganə funksiyanın aşkar ifadəsini almaq üçün həmin münasibətdən  $t$ -ni yox etmək lazımdır:

$$y=3x+7$$

Deməli,  $f_0(x)=3x+7$ .

Ümumiyyətlə, (1) bərabərliklərinin birincisindən  $t$  parametrini tapıb ikincisində yerinə yazsaq, onda funksiyanın  $y=f(x)$  şəklində ifadəsini alarıq.

**Misal 2.**

$$\begin{cases} x=\cos t+1(0\leq t\leq 2\pi) \\ y=\sin t+3 \end{cases} \quad (4)$$

münasibəti iki funksiya təyin edir.

Doğrudan da, (4) münasibətindən  $t$ -ni yox etsək

$$(x-1)^2 + (y-3)^2 - 1 = 0$$

bərabərliyini alarıq. Axırıncı bərabərlik isə

$$y=3+\sqrt{1-(x-1)^2}$$

və

$$y=3-\sqrt{1-(x-1)^2}$$

kimi iki funksiyanı təyin edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, verilmiş hər bir  $y=f(x)$  funksiyanı parametrik şəkildə göstərmək olar. Bu məqsədlə  $x$  arqumentini parametrik hesab etmək kifayətdir.

## 5.2.Məhdud və qeyri-məhdud funksiya. Çoxdəyişənli funksiya. Artan və azalan funksiyalar

**Tərif.** Tutaq ki,  $y=f(x)$  funksiyanın  $X$  ( $X \subset D(f)$ ) çoxluğunda verilmişdir.  $x$ -in  $X$  çoxluğundan götürülmüş bütün qiymətlərində

$$|f(x)| \leq M \quad (1)$$

bərabərsizliyini ödəyən sabit və müsbət  $M$  ədədi varsa,



onda  $f(x)$  funksiyasına  $X$  çoxluğunda məhdud funksiya deyilir.

$f$  funksiyası  $]-\infty; +\infty[$  intervalında məhdud olduqda bu funksiya məhdud funksiya deyilir.

$x$ -in  $X$  çoxluğundan götürülmüş bütün qiymətləri üçün (1) bərabərsizliyini ödəyən  $M$  ədədi tapmaq mümkün olmazsa, ondan funksiyasına  $X$  çoxluğunda qeyri-məhdud funksiya deyilir. Başqa sözlə,  $M$  ədədi necə seçilərsə seçilsin  $X$  çoxluğundan elə bir  $x_1$  ədədi tapılsa ki,  $f(x_1) > M$  bərabərsizliyi ödənilir, onda  $f$  funksiyasına  $X$  çoxluğunda qeyri-məhdud funksiya deyilir.

**Məhdud funksiyanın qiymətləri çoxluğu (dəyişmə oblastı) sonsuz interval ola bilməz.**

**Qeyri-məhdud funksiyanın qiymətlər çoxluğu isə sonlu interval və ya parça ola bilməz.**

**Misallar.** Aşağıdakı funksiyaların qiymətlər çoxluğunun sonsuz interval olmadığını göstərək.

1.  $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$ ,  $f(x)$  məhdud funksiya.

burada  $|x| < \frac{x^2+1}{2}$  olduğu üçün

$$\left| \frac{x}{1+x^2} \right| = \frac{|x|}{1+x^2} < \frac{1}{2}, E(f) = \left] -\frac{1}{2}; +\frac{1}{2} \right[$$

2.  $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ ,  $f(x)$  məhdud funksiya. Burada  $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-x^2} \leq 2, D(f) = [-2; 2], E(f) = [0; 2]$

3.  $f(x) = 2^x$ ,  $D(f) = \mathbb{R}$  qeyri-məhdud funksiyanın qiymətlər çoxluğunun sonlu interval olmadığı aşkarlanır.

Yəni,  $E(f) = ]0; +\infty[$ .

### **Çoxdəyişənli funksiya**

Baxdığımız funksiyalarda bir sərbəst dəyişən iştirak edir. Elə asılılıqlar var ki, orada bir yox, bir neçə sərbəst dəyişən iştirak edir:

#### **Məsələn:**

1. Üçbucağın sahəsi:

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h, \quad (S - \text{üçbucağın sahəsi } a - \text{oturacaq, } h - \text{hündürlük})$$

iki sərbəst dəyişəndən asılı olaraq dəyişir.

2. Konusun həcmi:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H \quad (V - \text{konusun həcmi, } R - \text{oturacağının radiusu, } H - \text{hündürlüyüdür})$$

iki sərbəst dəyişəndən asılı olaraq dəyişir.

**Tərif:**  $x$  və  $y$  dəyişənlərinin  $D$  çoxluğundan olan hər hansı bir cüt  $(x, y)$  qiymətinə qarşı  $z$  dəyişəninin  $E$  çoxluğundan müəyyən bir qiymətini qarşı qoyma qanunu verilərsə, onda  $D$  çoxluğunda ikidəyişənli funksiya verilmişdir deyilir və  $z = f(x, y)$  şəklində işarə olunur.

$D$  çoxluğu funksiyanın təyin oblastı,  $E$  çoxluğu isə qiymətlər çoxluğu adlanır.

#### **Artan və azalan funksiyalar**

Funksiyaların öyrənilməsində funksiyanın artan və azalan olması xassəsi mühüm rol oynayır.

#### **Artan və azalan funksiyaların tərifləri** (törəmənin tətbiqi olmadan)

Tutaq ki,  $y = f(x)$  funksiyası  $X$  çoxluğunda təyin olunmuşdur.

**Tərif 1.**  $x$  arqumentinin  $X$  çoxluğundan götürülmüş ixtiyari iki  $x_1$  və  $x_2$  qiymətləri arasında  $x_1 < x_2$  bərabərsizliyi ödənildikdə  $y=f(x)$  funksiyasının uyğun qiymətləri arasında  $f(x_1) < f(x_2)$  bərabərsizliyi ödənilərsə,  $f$  funksiyasına  $X$  çoxluğunda artan (və ya ciddi artan) funksiya deyilir.

**Tərif 2.**  $x$  arqumentinin  $X$  çoxluğundan götürülmüş ixtiyari iki  $x_1$  və  $x_2$  qiymətləri arasında  $x_1 < x_2$  bərabərsizliyi ödənildikdə  $y=f(x)$  funksiyasının uyğun qiymətləri arasında  $f(x_1) \leq f(x_2)$  bərabərsizliyi ödənilərsə,  $f$  funksiyasına  $X$  çoxluğunda azalmayan funksiya deyilir.

**Artan funksiya həm də azalmayan funksiyaadır. Azalmayan funksiya artan olmaya da bilər.**

**Tərif 3.**  $x$  arqumentinin  $X$  çoxluğundan götürülmüş ixtiyari iki  $x_1$  və  $x_2$  qiymətləri arasında  $x_1 < x_2$  bərabərsizliyi ödənildikdə  $y=f(x)$  funksiyasının uyğun qiymətləri arasında  $f(x_1) > f(x_2)$  bərabərsizliyi ödənilərsə,  $f$  funksiyasına  $X$  çoxluğunda azalan (və ya ciddi azalan) funksiya deyilir.

**Tərif 4.**  $x$  arqumentinin  $X$  çoxluğundan götürülmüş ixtiyari iki  $x_1$  və  $x_2$  qiymətləri arasında  $x_1 < x_2$  bərabərsizliyi ödənildikdə  $y=f(x)$  funksiyasının uyğun qiymətləri arasında  $f(x_1) \geq f(x_2)$  bərabərsizliyi ödənilərsə,  $f$  funksiyasına  $X$  çoxluğunda artmayan funksiya deyilir.

### **5.3. Monoton funksiyalar. Cüt və tək funksiyalar. Dövrü funksiya**

**Tərif.** Verilmiş çoxluqda artan, azalmayan, azalan və artmayan funksiyalara monoton funksiyalar deyilir.

Elə funksiyalar vardır ki, bütün təyin oblastında monoton deyil. Belə ki, bunlar təyin oblastının bir hissəsində monoton artan, o biri hissəsində monoton azalan olur. Belə funksiyalara hissə-hissə monoton funksiyalar deyilir.

Bütün təyin oblastında nə artan və nə də azalan olmayan funksiyalar da vardır ki, bunlar da monoton funksiyalar deyil.

### **Hissə-hissə monoton funksiya**

**Tərif.** Funksiya təyin olduğu oblastda monoton deyilsə, lakin bu oblastı elə hissələrə ayırmaq olsa ki, hissələrin hər birində funksiya monoton olur, onda belə funksiya hissə-hissə monoton funksiya deyilir.

$f(x)=\sin x$ ,  $f(x)=\cos x$ ,  $f(x)=x^2$  funksiyaları hissə-hissə monoton funksiyalardır.

### **Cüt və tək funksiyalar.**

Cüt və tək funksiya anlayışı riyaziyyatın bir sıra sahələrində tətbiq olunur. Xüsusilə funksiyaların araşdırılmasında cüt və tək funksiyaların xassələrindən geniş istifadə olunur.

### **Cüt və tək funksiyaların tərifi**

**Tərif 1.**  $y=f(x)$  funksiyasının təyin oblastından olan istənilən  $x$  ədədi ilə birlikdə “ $-x$ ” ədədi də həmin oblasta daxil olarsa və

$$f(-x) = f(x)$$

bərabərliyi ödənilərsə, onda  $f$  funksiyasına cüt funksiya deyilir.

**Tərif 2.**  $y=f(x)$  funksiyasının təyin oblastından olan istənilən  $x$  ədədi ilə birlikdə “ $-x$ ” ədədi də həmin oblasta daxil olarsa və  $f(-x) = -f(x)$  bərabərliyi ödənilərsə, onda  $f$  funksiyasına tək funksiya deyilir.

### **Funksiyanın cüt və ya tək olması əlaməti**

**Teorem 1.**  $y=f(x)$  funksiyanın təyin oblastından olan bütün  $x$  ədədləri üçün  $|f(-x)|=|f(x)|$  bərabərliyi ödənilərsə, onda funksiya ya cüt, ya da tək funksiya-dır,  $x$  - in heç olmazsa bir qiymətində  $|f(-x)| \neq |f(x)|$  olduqda isə  $f$  funksiya nə cüt və nə də tək funksiya deyil.

**Teorem 2.**  $f(x)=0$  funksiya eyni zamanda həm cüt, həm də tək olan yeganə funksiya-dır.

### **Cüt və tək funksiyanın qrafiki**

**Teorem 3.** Cüt funksiyanın qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrikdir.

**Teorem 4.** Tək funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir.

### **Bu teoremlərin tərsi də doğrudur.**

**Teorem 5.** Qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrik olan funksiya cüt funksiya-dır.

**Teorem 6.** Qrafiki koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrik olan funksiya tək funksiya-dır.

### **Cüt və tək funksiyanın üzərində əməllər**

Cüt və tək funksiyanın cəmi, fərqi, hasil və nisbətinin nə zaman cüt və ya tək olması barədə aşağıdakı teoremlər vardır.

**Teorem 7.** Təyin oblastları eyni olan iki cüt funksiyanın cəmi, fərqi, hasil və nisbəti cüt funksiya-dır.

**Teorem 8.** Təyin oblastları eyni olan iki tək funksiyanın cəmi və fərqi tək, hasil və nisbəti isə cüt funksiya-dır.

**Təyin oblastları eyni olan cüt sayda təkfunksiyaların hasili cüt, tək sayda tək funksiyaların hasili tək funksiyadır.**

**Teorem 9.** Təyin oblastları eyni olan cüt funksiya ilə tək funksiyanın hasili və nisbəti tək funksiyadır.

Təyin oblastları eyni olan cüt funksiya ilə funksiyanın nisbəti tək funksiya olur. Lakin bu tək funksiyanın təyin oblastı əvvəlki funksiyaların təyin oblastı ilə eyni olmaya da bilər.

### **Dövrü funksiya**

Period yunan sözü olub, peridos-dövretmə sözündən götürülmüşdür.

Riyaziyyatda sonsuz təkrarlanan proseslərin qanunauyğunluqları öyrənilir. Bunun üçün periodik funksiya anlayışından istifadə edilir. Bu anlayışdan riyaziyyatın bir çox sahələrində funksiyaların araşdırılmasında; qrafiklərin qurulmasında; sıralar nəzəriyyəsinə və s. geniş istifadə olunur.

### **Periodik funksiya**

**Tərif.**  $y=f(x)$  funksiyası üçün elə  $T (T \neq 0)$  ədədi varsa ki, bu funksiyanın təyin oblastından olan istənilən  $x$  ədədi ilə birlikdə  $|x - T|$  və  $|x + T|$  ədədləri də həmin oblasta daxil olur və

$$f(x+T)=f(x) \quad (1)$$

bərabərliyi ödənilir, onda  $f$  funksiyanın periodik funksiyası,  $T$  ədədinə isə onun periodu deyilir.

Bu təriflə əlaqədar olaraq aşağıdakı teoremlər vardır:

**Teorem 1.**  $T (T \neq 0)$  ədədi  $f$  funksiyanın periodudursa  $|-T|$  ədədi də bu funksiyanın periodudur.

Periodik funksiyanın təyin oblastı

**Teorem 2.**  $y=f(x)$  periodik funksiyadirsə, onda onun təyin oblastı sıfır ədədinə nəzərən simmetrik və qeyri-məhdud çoxluqdur.

Təyin oblastı müsbət ədədlər və ya mənfi ədədlər çoxluğu olan funksiya periodik funksiya deyil.

Təyin oblastı sonlu aralığa daxil olan funksiya periodik funksiya deyil.

**Periodik funksiyanın qiymətlər çoxluğu**

**Teorem 3.** Periodik funksiya özünün hər bir qiymətini argumentin sonsuz sayda qiymətlərində alır.

Qiymətlər çoxluğundan olan bir qiyməti argumentin sonlu sayda qiymətlərində alan funksiya periodik funksiya deyil.

Periodik funksiyanın sonlu sayda ekstremum nöqtəsi ola bilməz.

**Funksiyanın ən kiçik müsbət periodu**

**Tərif.**  $y=f(x)$  periodik funksiyanın periodları içərisində ən kiçik müsbət ədəd varsa, bu ədəd funksiyanın ən kiçik müsbət periodu deyilir.

**Misallar.**

1.  $f(x)=\sin x$  funksiyanın ən kiçik müsbət periodu  $2\pi$ -dir.

2.  $f(x)=\operatorname{tg} x$  funksiyanın ən kiçik müsbət periodu  $\pi$ -dir.

3.  $f(x)=\{x\}$  funksiyanın ən kiçik müsbət periodu 1 ədədidir.

Qeyd edək ki, periodik funksiyanın ən kiçik müsbət periodu olmaya da bilər. Məsələn, sabit funksiya periodik funksiya və bütün həqiqi ədədlər bunun periodudur. Dirixle funksiya periodik funksiya və

bütün rasiyal ədədlər bunun periodudur. Aydındır ki, bunların periodları içərisində ən kiçik müsbət ədəd yoxdur.

Funksiyaların ən kiçik müsbət periodunun varlığı üçün kafi şərtə aid aşağıdakı teorem vardır.

**Teorem 4.** Sabit funksiya başqa, bütün kəsilməyən periodik funksiyların ən kiçik müsbət periodu vardır.

**Arqumentin miqyası dəyişdikdə periodik funksiyanın ən kiçik müsbət periodunun dəyişməsi.**

**Teorem 5.**  $y=f(x)$  funksiya ən kiçik müsbət periodu  $T$  olan periodik funksiya əfsə,  $y=f(ax+b)$ , ( $a>0$ ) funksiya ən kiçik müsbət periodu  $\frac{T}{a}$  olan periodik funksiya əfsə.

**Misallar.**

1.  $f(x)=\sin \pi x$  funksiya, ən kiçik müsbət periodu  $T_1=\frac{2\pi}{\pi}=2$  olan periodik funksiya əfsə.

2.  $f(x)=\cos^2(3x+5)$  funksiyanın ən kiçik müsbət periodunu tapmalı.

$y=\cos^2 x$  funksiya ən kiçik müsbət periodu  $\pi$  olan periodik funksiya olduđu məlum əfsə. Odur ki, verilən funksiya ən kiçik müsbət periodu  $T_1=\frac{\pi}{3}$  olan periodik funksiya əfsə.

**Ən kiçik müsbət periodun təyini üçün bəzi xüsusi üsullar.**

Periodik funksiyların ən kiçik müsbət periodunu tapmaq üçün müəyyən üsullar yox əfsə. Bunu ancaq mi-



salların xarakterinə görə xüsusi üsullarla təyin etmək olur. Bunlardan bəzilərini göstərək.

**a) T-yə nəzərən tənliyi həll etməklə.**

Ən kiçik müsbət periodu tapmaq üçün verilən funksiyanın

$$f(x+T)=f(x)$$

bərabərliyini ödəməsini qəbul edib,  $x$ -ə funksiyanın təyin oblastından olan bir qiymət verib həmin bərabərliyi  $T$ -yə nəzərən tənlik kimi həll etməli,  $T$  üçün tapılan qiymətlərdən ən kiçik müsbət ədəd olanını seçməli. Tapılan bu qiymət verilən funksiyanın ən kiçik müsbət periodu olacaq.

**Misal.**  $f(x)=\cos \frac{3x}{2} + \sin \frac{x}{2}$  funksiyanın ən kiçik müsbət periodunu tapmalı.

$$\cos \frac{3}{2}(x+T) + \sin \frac{1}{2}(x+T) = \cos \frac{3}{2}x + \sin \frac{x}{2}$$

bərabərliyində  $x=0$  yazsaq,

$$\cos \frac{3}{2}T - \sin \frac{1}{2}T = 1$$

tənliyi alınır. Buradan  $T=12\pi$  ədədi funksiyanın ən kiçik müsbət periodu olduğu məlum olur.

**b) Eyni çevirmələr aparmaqla.**

Ən kiçik müsbət periodu tapmaq üçün verilən funksiya üzərində eyni çevirmələr aparıb, bunu ən kiçik müsbət periodu məlum olan funksiya gətirməli.

Misal.  $f(x)=\sin^4x+\cos^4x$  funksiya verilmişdir. Eyni çevirmələr aparsaq

$$\sin^4x+\cos^4x=(\sin^2x+\cos^2x)^2-2\sin^2x\cos^2x=$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x = 1 - \frac{1}{4} (1 - \cos 4x) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \sin\left(4x + \frac{\pi}{2}\right)$$

bərabərliyi alınır. Sağ tərəfdəki funksiyanın ən kiçik müsbət periodu  $T = \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$  olduğu üçün, verilən funk-

siyanın ən kiçik müsbət periodu  $\frac{\pi}{2}$  ədədi olur.

**v) Verilən funksiyanın xarakterinə görə ən kiçik müsbət periodun təyini.**

**Misal.**  $f(x) = \cos^2 x$  funksiyası verilmişdir.

İstənilən  $x$  üçün

$$\cos^2(x + \pi) = (-\cos x)^2 = \cos^2 x$$

bərabərliyinin doğru olması göstərir ki, funksiya periodik funksiya və  $\pi$  ədədi bunun periodudur.  $\cos^2(0 + \pi) = \cos^2 0 = 1$  bərabərliyi və  $x \in [0, \pi]$  qiymətlərində  $\cos^2 x < 1$  bərabərsizliyinin ödənilməsi göstərir ki,  $\pi$  ədədi verilən funksiyanın ən kiçik müsbət periodudur.

**Funksiyanın ən kiçik müsbət perioduna görə bütün periodlarının təyini.**

**Teorem 6.**  $y = f(x)$  funksiyası ən kiçik müsbət periodu  $T$  olan periodik funksiya varsa, onda  $nT$  ( $n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$ ) ədədləri bu funksiyanın periodlarıdır və bunlardan başqa periodu yoxdur.

**Antiperiodik funksiya**

**Tərif.**  $T$  periodlu  $y = f(x)$  periodik funksiya

$f\left(x + \frac{T}{2}\right) = -f(x)$  şərtini ödəyərsə, bu funksiya anti-periodik funksiya deyilir.

**Misal.**  $f(x)=\cos x$  funksiyası  $2\pi$  periodlu periodik funksiyadır. Burada  $\cos\left(x + \frac{2\pi}{2}\right) = \cos(x+\pi) = -\cos x$  şərti ödə-nildiği üçün, bu funksiya antiperiodik funksiyadır.

**Teorem 7.**  $y=f(x)$  funksiyası  $T$  periodlu funksiyadırsa, bu funksiyanı antiperiodik funksiya ilə  $\frac{T}{2}$  periodlu funksiyanın cəmi şəklində göstərmək olur.

### 5.4.1. Mürəkkəb funksiya

Tutaq ki,  $x=\varphi(t)$  funksiyası  $T$  çoxluğunda təyin olunmuşdur və onun qiymətləri çoxluğu  $y=f(x)$  funksiyasının  $X$  təyin oblastına daxildir. Bu halda,  $t$ -nin  $T$  çoxluğundakı hər bir qiymətinə  $y$ -in müəyyən bir qiyməti uyğun olur, yəni  $y$  dəyişəni ( $x$  vasitəsilə)  $t$ -nin funksiyasıdır:

$$y=f[\varphi(t)] \quad (1)$$

Bu halda alınan  $f[\varphi(t)]$  funksiyasına mürəkkəb funksiya və ya funksiyanın funksiyası deyilir.

**Misal 1.**  $x=t^3$  və  $y=2^x$  olduqda  $y=2^{t^3}$  funksiyasının mürəkkəb funksiyasıdır.

$y$  dəyişəni  $x$  vasitəsilə  $t$ -nin mürəkkəb funksiyası olduqda  $x$ -ə ara dəyişəni və ya ara arqumenti deyilir.

$x=\varphi(t)$  və  $y=f(x)$  funksiyalarından düzəldilmiş (1) mürəkkəb funksiyasına bəzən həmin  $x=\varphi(t)$  (daxili) və  $y=f(x)$  (xarici) funksiyalarının superpozisiyası da deyilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, mürəkkəb funksiyanın ara arqumentinin sayı bir deyil, iki vəçox ola bilər. Məsələn,

$$y=f(u), u=\psi(x), x=\varphi(t)$$

olduqda

$$y=f\{\psi[\varphi(t)]\}$$

mürəkkəb funksiyanın iki ara arqumenti (x və u) vardır.

**Misal 2.**  $y=\sin x$  və  $x=t^4$  olduqda bir ara arqumenti olan

$$y=\sin t^4$$

mürəkkəb funksiyası alınır.

**Misal 3.**  $y=\sin u$ ,  $u=\lg x$  və  $x=t^4$  olduqda

$$y=\sin \lg t^4$$

mürəkkəb funksiyanın iki ara arqumenti (u və x) vardır.

### 5.4.2. Tərs funksiya

Təbiətdə müxtəlif qarşılıqlı tərs olan münasibətlər vardır. Riyaziyyatda belə qarşılıqlı tərs münasibətlər düz və tərs funksiya anlayışı ilə öyrənilir.

Tərs funksiya anlayışının geniş tətbiq sahələri vardır. Məsələn, kəsilməyən funksiyaların öyrənilməsi, qrafiklərin qurulması, sahələrin hesablanması və s.

#### Tərs funksiyanın tərif

Tutaq ki,  $y=f(x)$  funksiyanın təyin oblastı X çoxluğu, qiymətlər çoxluğu isə Y çoxluğudur. Funksiyanın tərifinə görə x arqumentinin X çoxluğundan olan hər bir  $x_0$  qiymətinə qarşı y funksiyanın Y çoxluğun-

dan yeganəbir  $y_0$  qiyməti uyğun olur. Lakin tərifdən belə çıxmır ki, tərsinə baxsaq  $Y$  çoxluğundan olan ixtiyari  $y_0$  ədədi üçün  $X$  çoxluğundan  $x$  arqumentinin

$$y_0 = f(x_0) \quad (1)$$

bərabərliyini ödəyən ancaq bir  $x_0$  qiyməti vardır.

Ola bilər ki,  $y$ -in bir qiymətinə qarşı  $x$ -in (1) bərabərliyini ödəyən bir neçə və hətta sonsuz sayda qiyməti olsun.

Tərs funksiya anlayışı yalnız birqiymətli funksiyalara aiddir.

**Tərif.**  $X$  çoxluğunda təyin olunmuş  $y = f(x)$  funksiyasının,  $Y$  qiymətləri çoxluğundan olan hər bir  $y_0$  ədədinə  $x$  arqumentinin  $f(x) = y_0$  bərabərliyini ödəyən ancaq bir  $x_0$  ( $x_0 \in X$ ) qiyməti uyğun olarsa, bu uyğunluqla təyin olunan  $x = \varphi(y)$  funksiyasına  $y = f(x)$  funksiyasının tərs funksiyası deyilir.

Bu tərifdən aşağıdakı mülahizələr alınır.

1.  $y = f(x)$  funksiyası verildikdə, onun tərsi olan  $x = \varphi(y)$  funksiyası  $y - f(x) = 0$  tənliyini  $x$ -ə nəzərən həll etməklə alınır.

2. Düz funksiyasının təyin oblastı tərs funksiyanın dəyişmə oblastı, dəyişmə oblastı isə tərs funksiyasının təyin oblastı olur.

Yəni:  $D(f) = E(\varphi)$  və  $D(\varphi) = E(f)$ .

3.  $y = f(x)$  funksiyasını da  $x = \varphi(y)$  funksiyasının tərs funksiyası hesab etmək olar. Elə buna görə də  $y = f(x)$  və  $x = \varphi(y)$  funksiyalarına qarşılıqlı tərs funksiyalar da deyilir.

$f$  funksiyasının tərs funksiyası  $f^{-1}$  və ya  $f^{-1}$  şəkillərdə işarə edilir. Hesab və cəbrdə  $\alpha$  və  $\frac{1}{\alpha}$  kəmiyyətlərinə qarşılıqlı tərs kəmiyyətlər deyilir. Bu işarələməni nəzərə alsaq  $\frac{1}{f}$  funksiyasına  $f$  funksiyasının cəbri mənada tərs funksiyası deyilir və bu  $(f)^{-1}$  kimi yazılır.

**4.**  $y=f(x)$  funksiyasının təyin oblastından olan  $x$ -lər üçün  $\varphi[f(x)]=x$  bərabərliyi,  $x=\varphi(y)$  funksiyasının təyin oblastından olan  $y$ -lər üçün isə  $f[\varphi(y)]=y$  bərabərliyi doğrudur.

**5.** Funksiya artan (azalan) olduqda, onun tərsi də artan (azalan) funksiya olur.

### **Tərs funksiyanın qrafiki**

Verilmiş  $y=f(x)$  funksiyası ilə onun  $x=\varphi(y)$  tərs funksiyası xarakter etibarı ilə müxtəlif asılılıqları ifadə etmələrinə baxmayaraq, bunların qrafikləri eyni bir xəttidir. Belə ki,  $y=f(x)$  funksiyasının arqumenti absis oxu üzərində,  $x=\varphi(y)$  funksiyasının arqumenti isə ordinat oxu üzərində götürülür. Bir qayda olaraq arqument  $x$  və funksiya  $y$  ilə işarə olunduğu üçün  $y=f(x)$  funksiyasının tərsi  $y=\varphi(x)$  şəklində yazılır. Onda tərs funksiyanın da arqumenti absis oxu üzərinə düşür.

**Teorem 1.**  $y=f(x)$  və  $y=\varphi(x)$  qarşılıqlı tərs funksiyalar olduqda, bunların qrafikləri  $y=x$  düz xəttinə nəzərən simmetrik olur.

Qarşılıqlı tərs funksiyalardan birinin qrafiki məlum olarsa, o birisinin qrafikini qurmaq üçün məlum

qrafiki  $y=x$  düz xəttinə nəzərən simmetrik olaraq köçürmək lazımdır.

**Misal.**  $y=e^x$  funksiyasını tərsi  $y=\ln x$  funksiyasıdır.

### 5.4.3. Tərs funksiyanın varlığı üçün vacib şərtlər

Fərz edək ki,  $y=f(x)$  funksiyanın təyin oblastı  $X$  çoxluğu dəyişmə oblastı isə  $Y$  çoxluğudur. Tərs funksiyanın varlığı üçün aşağıdakı teoremlər vardır.

**Teorem 1.**  $X$  oblastında təyin olunmuş  $y=f(x)$  funksiyası həmin oblastda artan (və ya azalan) olduqda, bu funksiyanın tərs funksiyası vardır.

Verilən funksiyanın tərs funksiyanı yazmaq üçün onun artan və azalan olduğu aralıqlara baxmaq lazımdır.

**Funksiya azalmayan və ya artmayan olduqda funksiyanın sabitlik aralığı varsa, onda bu funksiyanın tərs funksiyası yoxdur.**

**Teorem 2.**  $X$  oblastında təyin olunmuş  $y=f(x)$  funksiyası oblastın daxilində diferensiallanan və törəməsi müsbət (və ya mənfi) olduqda, bu funksiyanın tərs funksiyası vardır.

### 5.5. Düz funksiya ilə tərs funksiya arasında əlaqə

Tutaq ki, hər hansı

$$y=f(x) \quad (1)$$

funksiyası verilmişdir. Fərz edək ki, (1) münasibətindən  $x$ -in  $y$  vasitəsi ilə ifadə etmək, yəni

$$x=\varphi(y) \quad (2)$$

kimi yazmaq mümkündür. Onda  $\varphi(y)$  funksiyasına  $f(x)$  funksiyasının tərs funksiyası deyilir. Bu halda  $y=f(x)$ -ə düz funksiya deyirlər.

**Misallar.**

$y=3x+1$  xətti funksiyasının tərsi  $x = \frac{y-1}{3}$  (yaxud  $x = \frac{1}{3}y - \frac{1}{3}$ ) xətti funksiyası olar.


$y=4x^2$  funksiyası üçün  $x = \pm \frac{1}{2}\sqrt{y}$  kimi iki funksiya alırıq. Bu funksiyalardan hər birinin  $y = 4x^2$  funksiyasının  $x \geq 0$  olduqda  $x = \frac{1}{2}\sqrt{y}$ ,  $x < 0$  olduqda  $x = -\frac{1}{2}\sqrt{y}$  tərs funksiyası hesab etmək olar. Burada tərs funksiyanın birqiymətliyini təmin etmək üçün verilmiş funksiyada argument üzərinə əlavə şərt qoymaq lazımdır.

Yuxarıda deyilənlərdən aydındır ki,  $x=\varphi(y)$  funksiyası  $y=f(x)$ -funksiyasının tərs funksiyasıdırsa, onda  $y=f(x)$  də  $x=\varphi(y)$  funksiyasının tərs funksiyası olar. Yəni  $y=f(x)$  və  $x=\varphi(y)$  qarşılıqlı tərs funksiyalardır.

**Düz və tərs funksiyların qrafikləri  $y=x$  düz xəttinə nəzərən simmetrikdirlər.**


$y=3x+1$ (düz funksiya) və  $y = \frac{1}{3}x - \frac{1}{3}$ (tərs funksiya) funksiylarının qrafikləri 5-ci şəkildə verilmişdir.





**Şəkil 5.**

$y=4x^2$  (düz funksiya,  $x \geq 0$ )  $y = \frac{1}{2}\sqrt{x}$  (tərs funksiya,  $y \geq 0$ ) funksiyalarının qrafikləri isə 6-cı şəkildə verilmişdir.



**Şəkil 6.**

Ümumiyyətlə, əgər arqumentin müxtəlif qiymətlərinə funksiyanın da müxtəlif qiymətləri uyğundursa (məsələn, funksiya artırsa və ya azalırsa), onda onun tərs funksiyası var və birqiymətlidir.

## VI FƏSİL. XƏTTİ FUNKSIYA. ELEMENTAR FUNKSIYA

### 6.1.1. Xətti funksiya. Xətti funksiyanın tərifı və qrafiki

**Tərif.**  $y=kx+b$  (1) şəklində verilmiş funksiya xətti funksiya deyilir. Burada  $k$  və  $b$  sabit kəmiyyətlərdir. Xətti funksiyanın təyin oblastı  $(-\infty, +\infty)$  intervalıdır.

**Teorem.** Koordinatları  $y=kx+b$  tənliyini ödəyən bütün nöqtələr bir düz xətt üzərində yerləşir (yəni,  $y=kx+b$  funksiyanın qrafiki düz xətdir).

Düz xəttin absis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağın tangensinə ( $k=\operatorname{tg} \varphi$ ) düz xəttin bucaq əmsalı, ordinat oxundan ayırdığı  $b$  parçasına onun başlanğıc ordinatı deyilir. (1) tənliyi ilə yanaşı

$$y=kx+c(c \neq b) \quad (2)$$

tənliyinə baxaq. (1) və (2) tənliklərinin ifadə etdiyi düz xətlərin hər ikisinin bucaq əmsalı, yəni absis oxu ilə əmələ gətirdiyi bucaqlar eynidir. Deməli, bu düz xətlər paraleldir. Tərsinə, verilmiş iki düz xətt paraleldirsə onda onların bucaq əmsalları bərabər olur. Tənliyi verilən düz xətti qurmaq üçün :


1) düz xəttin koordinat oxları ilə kəsişmə nöqtələri ( $x=0$ ) qiymətində  $y$ ,  $y=0$  qiymətində  $x$ ) tapılır,

2) yaxud da düz xəttin ixtiyari iki nöqtəsi ( $x$ -in ixtiyari iki qiymətinə  $y$ -in uyğun qiymətləri) tapılır. Hər iki halda həmin nöqtələrindən keçən düz xətt axtarılan düz xətdir.


**Tərif.**  $x$  vəykimi dəyişən iki kəmiyyət bir-biri ilə  $y=kx$  ( $b=0$ ) münasibəti ilə bağlı olduqda deyirlər ki, həmin kəmiyyətlər arasında düz mütənəsb asılılıq vardır.

### 6.1.2. Qüvvət funksiyası. Qüvvət funksiyasının tərifi və qrafiki

**Tərif.**  $y=x^\alpha$  şəklində funksiya qüvvət funk-siyası deyilir ( $\alpha$ -həqiqi ədəddir). Bundan əvvəlki paraq-raflarda qüvvət funksiyasının  $\alpha =1$  (düz xətt),  $\alpha =2$  (parabola),  $\alpha = -1$  (hiperbola) olan halları nəzərdən keçirilmişdir.  $\alpha=3$  olduqda alınan  $y=x^3$  funksiyasının qrafikinə üç dərəcəli parabola,  $\alpha=4$  olduqda isə ( $y=x^4$ ) dörd dərəcəli parabola deyilir. Bu funksiyaların qrafiki 1 və 2-ci şəkillərdə verilmişdir.



Şəkil 1.



Şəkil 2.

### 6.1.3. Üstlü funksiya, onun xassələri və qrafiki. Üstlü funksiyanın tərifi

**Tərif.**  $a$  vahiddən fərqli müsbət sabit ədəd olduqda  $y = a^x$  şəklində funksiya üstlü funksiya deyilir.

$$y = 2^x, y = 3^x, y = \left(\frac{1}{2}\right)^x, y = \left(\frac{1}{3}\right)^x \text{ üstlü funksiya}$$

aid sadə misallardır. Burada uyğun olaraq  $a = 2, a = 3, a = \frac{1}{2}, a = \frac{1}{3}$  götürülmüşdür.  $a = 1$  olduqda  $y = 1^x = 1$  alınır ki, bunu da xətti funksiyanı öyrənərkən nəzərdən keçirmişik.  $a < 0$  olduqda  $a^x$  ifadəsi həqiqi ədədlər çoxluğunda ümumiyyətlə, mənasız olur. Buna görə də, tərifdə  $a \neq 1$  və  $a > 0$  şərtləri xüsusi qeyd edilmişdir.

#### Üstlü funksiyanın xassələri

Üstlü funksiyanın aşağıdakı xassələri var:

1. Üstlü funksiya bütün ədəd oxunda təyin olunmuşdur.

2.  $y = a^x$  funksiyası həmişə müsbətdir.

3.  $x = 0$  olduqda  $y = a^0 = 1$  olur, yəni funksiyanın qrafiki ordinat oxunu  $(0, 1)$  nöqtəsində kəsir.


4.  $a > 1$  olarsa  $x$ -in müsbət qiymətlərində  $a^x > 1$ , mənfi qiymətlərində isə  $0 < a^x < 1$  olar.

5. Əsas ( $a$ ) vahiddən böyük olduqda, üstlü funksiya artandır.

6. Əsas ( $a$ )  $0 < a < 1$  olarsa,  $x > 0$  olduqda  $a^x < 1$  və  $x < 0$  olduqda  $a^x > 1$  olar. Bu halda funksiya azalandır.

7.  $a < b$  olarsa,  $x > 0$  olduqda  $a^x < b^x$ ,  $x < 0$  olduqda  $a^x > b^x$ ,  $x = 0$  olduqda isə  $a^x = b^x$  olar.

$y=2^x$  və  $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$  funksiyalarının qiymətlər cədvəlini tərtib edib, qrafikini qursaq, 3-cü şəkildə göstərilən ayrıləri alırıq.



Şəkil 3.

**Loqarifmik funksiya və onun xassələri. Loqarifmik funksiyanın tərifi**


#### 6.1.4. Loqarifmik funksiya

**Tərif.**  $y=\log_a x$  şəklində olan funksiya **loqarifmik funksiya** deyilir ( $a>0$ ,  $a \neq 1$ ).


$a \neq 1$  müsbət ədəd olduqda  $y=a^x$  üslü funksiyanın tərs funksiyası  $y=\log_a x$  ( $x=\log_a y$  funksiyasında  $x$  ilə  $y$ -in yerini dəyişməklə alınır) olar.

$y=\log_a x$  funksiyanın qrafikini qurmaq üçün

$y=a^x$  üslü funksiyanın qrafikini 1-ci və 3-cü rüblərin tən böləninə görə simmetrik çevirmək lazımdır.



**Şəkil 4.**



**Şəkil 5.**

### **Loqarifmik funksiyanın xassələri**

Loqarifmik funksiyanın qrafikinə əsasən aşağıdakı xassələri söyləmək olar:

1. Loqarifmik funksiyanın təyin oblastı bütün müsbət ədədlər çoxluğu, yəni  $(0; \infty)$  intervalıdır. Deməli, funksiyanın qrafiki ordinat oxunun sol tərəfindədir.

2.  $a > 1$  olduqda  $x > 1$  olarsa  $y = \log_a x > 0$ ,  
 $x < 1$  olarsa  $y = \log_a x < 0$  olar.

3.  $a > 1$  olduqda loqarifmik funksiya artandır.

4.  $0 < a < 1$  olduqda  $x < 1$  olarsa loqarifmik funksiya müsbət,  $x > 1$  olarsa mənfi qiymətlər alır.

5.  $0 < a < 1$  olduqda loqarifmik funksiya azalandır.

6.  $a > 1$  olduqda loqarifmik funksiyanın qrafiki qabarıq,  $0 < a < 1$  olduqda isə çökükdür.

### **6.2.1. Triqonometrik funksiyalar**

#### **Triqonometrik funksiyaların tərfi**

**Tərif 1.** Absis oxu ilə  $\alpha$  bucağı əmələ gətirən radiusvektorun ordinatının həmin vektorun uzunluğuna

nisbətinə  $\alpha$  bucağının sinusu deyilir və

$$\sin \alpha = \frac{y}{R} \quad (1)$$

kimi yazılır.

**Tərif 2.** Absis oxu ilə  $\alpha$  bucağı əmələ gətirən radius vektorun absisinin həmin vektorun uzunluğuna nisbətində  $\alpha$  bucağının cosinusunu deyilir və

$$\cos \alpha = \frac{x}{R} \quad (2)$$

kimi yazılır.

**Tərif 3.** Absis oxu ilə  $\alpha$  bucağı əmələ gətirən radius vektorun ordinatının absisinə olan nisbətində, həmin bucağın tangensi deyilir və

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{y}{x} \quad (3)$$

kimi yazılır.

**Tərif 4.** Absis oxu ilə  $\alpha$  bucağı əmələ gətirən radius vektorun absisinin ordinatına olan nisbətində, həmin bucağın kotangensi deyilir və

$$\operatorname{ctg} \alpha = \frac{x}{y} \quad (4)$$

kimi yazılır.

### **Triqonometrik funksiyaların tək və cütlüyü**

Triqonometrik funksiyaların tərifindən aydındır ki,  $y = \sin \alpha$  və  $y = \cos \alpha$  funksiyaları  $(-\infty; +\infty)$  intervalında təyin olunmuşdur və onların qiymətlər çoxluğu  $[-1; +1]$  parçasını təşkil edir.  $\operatorname{tg} \alpha$  funksiyası  $\alpha$ -nın  $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ,  $y = \operatorname{ctg} \alpha$  funksiyası isə  $k\pi$ -dən ( $k=0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$ )

fərqli bütün qiymətlərində təyin olunmuşdur və onların qiymətlər çoxluğu  $(-\infty, +\infty)$  intervalıdır.

**Teorem.**  $y=\cos x$  funksiyası cüt,  $y=\sin x$ ,  $y=\operatorname{tg} x$ ,  $y=\operatorname{ctg} x$  funksiyaları isə tək funksiyalardır

### **Triqonometrik funksiyaların qrafiki**

Triqonometrik funksiyaların qrafikini qurmaq üçün onların dövrü olmasına əsaslanıb, uzunluğu dövrə bərabər olan parçada (və ya intervalda) onların qrafikini qurmaq, kənarında isə dövrü olaraq təkrar etmək lazımdır. Tutaq ki,  $x$  radianla ölçülür.

a)  $y=\sin x$  funksiyasının qrafiki.  $y=\sin x$  funksiyası  $x$ -in bütün qiymətlərində, yəni  $(-\infty; +\infty)$  intervalında təyin olunmuş və dövrü  $2\pi$ -dir. Onun qrafikini  $[-\pi; \pi]$  parçasında qurmaq üçün  $y=\sin x$  funksiyasının tək funksiya olmasını nəzərə alaraq  $[-\pi; 0]$  parçasına davam etdirmək lazımdır.


### **Qurma üçün aşağıdakı iki üsulu göstərmək olar:**

**I üsul.**  $\sin x$ -in bölgü nöqtələrindəki qiymətlərini cədvəlin köməyi ilə tapmaq və koordinat müstəvisində  $(x, \sin x)$  nöqtələrini qurmaqla onları ardıcıl birləşdirmək lazımdır.

**II üsul.** (həndəsi üsul). Yuxarı yarım-müstəvidə mərkəzi  $(-1; 0)$  nöqtəsində olan vahid radiuslu yarım-çevrə götürüb, səkkiz bərabər  $(0; \frac{\pi}{8}; \frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{8}; \frac{\pi}{2}; \frac{5\pi}{8}; \frac{3\pi}{4}; \frac{7\pi}{8}; \pi)$  hissəyə bölək. Əvvəlcə  $[0, \pi]$  parçasının yuxarıda qeyd etdiyimiz bölgü nöqtələrindən  $Ox$  oxuna perpendikulyarlar qaldırırıq, sonra isə çevrə üzərindəki hər bir bölgü nöqtəsindən ona uyğun nöqtədən qaldırılan perpendikulyarla kəsişənə qədər  $Ox$  oxuna paralellər çəkirik.



Aydındır ki, kəsişmə nöqtələrinin ordinatı  $\sin x$ -in bölgü nöqtələrindəki qiymətləri olacaq (şəkil 6).



Şəkil 6.

### Funksiyaların təsnifatı

Funksiyalar xarakterinə, formalarına və aldıkları qiymətlərinə görə müəyyən siniflərə bölünür.

### Əsas elementar funksiyalar

Analitik üsulla verilmiş aşağıdakı beş növ funksiyaya əsas elementar funksiyalar deyilir.

1. Qüvvət funksiyası:  $y = x^\alpha$  ( $\alpha \in R$ ).

2. Üstlü funksiya:  $\alpha^x$  ( $\alpha > 0$ ,  $\alpha \neq 1$ ).

3. Loqarifmik funksiya:  $y = \log_\alpha x$  ( $\alpha > 0$ ,  $\alpha \neq 1$ ).


4. Triqonometrik funksiyalar:  $y = \sin x$ ,  $y = \cos x$ ,  $y = \operatorname{tg} x$ ,  $y = \operatorname{ctg} x$ ,  $y = \operatorname{sec} x$ ,  $y = \operatorname{cosec} x$ .

5. Tərs triqonometrik funksiyalar:  $y = \arcsin x$ ,  $y = \arccos x$ ,  $y = \operatorname{arctg} x$ ,  $y = \operatorname{arcsec} x$ ,  $y = \operatorname{arccosec} x$ ,  $y = \operatorname{arctg} x$

Alınmış nöqtələri ardıcıl olaraq səlis xətlə birləşdirsək  $[0; \pi]$  parçasında  $y = \sin x$  funksiyasının qrafikini alarıq. Sonra isə aldığımız əyrini  $[-\pi; 0]$  parçasına elə

davam etdiririk ki, qrafik koordinat başlanğıcına nəzərə-n simmetrik olsun.


Sonradan qrafiki sağa  $[\pi;3\pi], [3\pi;5\pi]$  və s., sola  $[-3\pi,-\pi], [-5\pi,-3\pi]$  və s. parçalarına köçürməklə bütün oxda  $y=\sin x$  funksiyasının qrafikini alırıq (şəkil 7). Alınan əyriyə **sinusoid** deyilir.



**Şəkil 7.**

**b)  $y=\cos x$  funksiyasının qrafiki.**  $y=\sin x$  funksiyasının qrafikinə oxşar olaraq qurulur (şəkil 8).

Alınan əyriyə **kosinusoid** deyilir.



**Şəkil 8.**

**c)  $y=\operatorname{tg} x$  funksiyasının qrafiki.**  $y=\operatorname{tg} x$  funksiyası  $x$ -in  $\frac{\pi}{2}(2k+1)$ - dən ( $k=0;\pm 1;\pm 2;\pm 3;\dots$ ) fərqli bütün qiymətlərində təyin olunmuş, dəyişmə oblastı bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur və dövrü  $\pi$  -dir. Funksiyanın təkliyi nəzərə alıb  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right)$  yarımintervalında onun qrafikini quraraq koordinat


başlanğıcına nəzərən simmetrik olmaqla  $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$

yarımintervalına köçürək.

Qurma üçün aşağıdakı iki üsulu göstərmək olar.

**I üsul.** Cədvəlin köməyi ilə bölgü nöqtələrində  $\left(x \neq \frac{\pi}{2} \text{ olmaqla}\right)$ , funksiyanın qiymətləri müəyyən dəqiqliklə tapılır, alınan  $(x; y)$  nöqtələri koordinat müstəvisində qurulur və bu nöqtələr ardıcıl olaraq səlis xətlə birləşdirilir


**II üsul.** Mərkəzi  $O_1\left(-1 - \frac{\pi}{2}; 0\right)$  nöqtəsində olan vahid radiuslu çevrənin I rübünü və  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$  parçasını dörd bərabər hissəyə bölək və tangenslər oxu üzərində qiyməti uyğun bucaqların tangensinə bərabər parçalar quraq. Sonra parçanın bölgü nöqtələrindən absis oxuna perpendikulyarlar qaldırıraq, daha sonra isə tangenslər xətti üzərində aldığımız hər bir nöqtədən ona uyğun olan bölgü nöqtəsindən qaldırılmış perpendikulyarı kəsənə qədər Ox oxuna paralellər çəkirik. Alınmış nöqtələri ardıcıl olaraq səlis xətlə birləşdirsək  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$  yarımintervalında  $y = \text{tg } x$  funksiyanının grafikini alarıq (şəkil 9).




**Şəkil 9.**

Sonradan qrafiki koordinat başlanğıcına simmetrik olmaqla,  $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right]$  yarımintervalına köçürüb  $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$  intervalında  $\text{tg}x$ -in qrafikini alarıq. Alınan qrafiki sağa  $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ ,  $\left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}\right)$  və s. intervallarına, sola  $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$ ,  $\left(-\frac{5\pi}{2}; -\frac{3\pi}{2}\right)$  və s. intervallarına köçürməklə  $y=\text{tg}x$  funksiyasının bütün təyin oblastında qrafikini alırıq (şəkil 10). Bu əyriyə **tangensoid** deyilir.

**d)  $y=\text{ctg}x$  funksiyasının qrafiki  $y=\text{tg}x$  funksiyasının qrafikinə analogi qayda ilə qurulur.** Lakin burada nəzərə almaq lazımdır ki,  $y=\text{ctg}x$  funksiyası  $x$ -in  $\pi$ -dən fərqli ( $n=0;\pm 1;\pm 2;\dots$ ) bütün qiymətlərində təyin olunmuşdur. Odur ki, qrafiki  $(0;\pi)$  intervalında qurulan əyriyə **kotangensoid** deyilir (şəkil 11).



Şəkil 10.




Şəkil 11.

### 6.2.1.1. Triqonometrik funksiyaların qrafikinə sürüşmə və deformasiya üsulu ilə qurulması

İndi  $y=\sin x$ ,  $y=\cos x$ ,  $y=\text{tg}x$  və  $y=\text{ctg}x$  funksiyalarının məlum qrafiklərinə əsaslanaraq aşağıdakı funksiyaların qrafiklərini quraq.

**a)  $y = -\cos x$  funksiyasının qrafikinin qurulması.**


Aydındır ki,  $y = \cos x$  və  $y = -\cos x$  funksiyalarının qrafiki absis oxuna nəzərən bir-birilə simmetrikdir. Deməli,  $y = -\cos x$  funksiyasının qrafikini almaq üçün  $y = \cos x$  funksiyasının qrafikini absis oxu ətrafında  $180^\circ$  döndərmək lazımdır (şəkil 12).



**Şəkil 12.**

**b)  $y = a \cos x$  funksiyasının qrafikinin qurulması.**

Bu funksiyanın qrafikini qurmaq üçün absisi dəyişmədən  $y = \cos x$  funksiyası qrafikinin bütün ordinatlarını  $a$  ədədinə vurmaq lazımdır;  $a > 1$  olduqda qrafik ordinat oxu boyunca uzanır (dartılır),  $a < -1$  olduqda həm dartılır, həm də absis oxu ətrafında  $180^\circ$  dönür,  $0 < a < 1$  olduqda sıxılır,  $-1 < a < 0$  olduqda isə həm sıxılır, həm də absis oxu ətrafında  $180^\circ$  dönür. 13-cü şəkildə  $y = 2 \cos x$  funksiyasının qrafiki göstərilmişdir.




**Şəkil 13.**

**c)  $y = \cos \omega x$  funksiyasının qrafikinin qurulması.**

Bu funksiyanın qrafikini qurmaq üçün ordinatı dəyişmədən  $y = \cos x$  funksiyası qrafikinin absisini  $\omega$  ədədinə vurmaq lazımdır.  $\omega > 1$  olduqda qrafik absis oxu boyunca sıxılır ( $\omega$  dəfə),  $0 < \omega < 1$  olduqda isə dartılır. ( $1/\omega$  dəfə)


$y=\cos x$  funksiyasının çütlüyünə əsasən dəyə bilərik ki,  $\omega$  ədədi mənfi olduqda qrafik  $y=\cos|\omega|x$  funksiyası qrafikinin eyni olacaqdır.  $\omega=2$  olduqda qurulan qrafik 14-cü şəkildə göstərilmişdir.



**Şəkil 14.**

**d)  $y=\cos(x+\alpha)$  funksiyasının qrafikinin qurulması.**

Bu funksiyanın qrafikini qurmaq üçün  $y=\cos x$  funksiyasının qrafikini bütünlüklə absis oxu boyunca  $|\alpha|$  qədər ( $\alpha > 0$  olduqda sola,  $\alpha < 0$  olduqda isə sağa) sürüşdürmək lazımdır.  $\alpha = \frac{\pi}{4}$  olduqda qurulmuş qrafik 15-ci şəkildə göstərilmişdir.



**Şəkil 15.**

**e)  $y=-\alpha \cos(\omega x+\alpha)$  funksiyasının qrafikinin qurulması**


Funksiyanın qrafikini qurmaq üçün yuxarıda deyilənləri nəzərə almaqla aşağıdakı funksiyaların qrafikini ardıcıl olaraq yerinə yetirmək lazımdır:

- 1)  $y=\cos x$ ,
- 2)  $y=\alpha \cos x$ ,
- 3)  $y=\alpha \cos \omega x$ ,

$$4) y = -\alpha \cos(\omega x + \alpha)$$

### f) $y = |\cos x|$ funksiyasının qrafikinə qurulması

Mütləq qiymətin tərifindən alınır ki,  $\cos x \geq 0$  olduqda bu funksiyanın qrafiki  $y = \cos x$  funksiyanın qrafiki ilə,  $\cos x < 0$  olduqda isə  $y = -\cos x$  funksiyanın qrafiki ilə üst-üstə düşür. Odur ki, həmin funksiyanın qrafikini qurmaq üçün əvvəlcə  $y = \cos x$  funksiyanın qrafiki qurulur, sonra isə qrafikin absis oxundan yuxarı hissəsi saxlanmaqla, aşağı hissəsi absis oxu ətrafında  $180^\circ$  döndərilir. Nəticədə, absis oxundan yuxarıda alınmış əyri  $y = |\cos x|$  funksiyanın qrafiki olar (şəkil 16).



**Şəkil 16.**

$y = |\sin x|$ ,  $y = |\operatorname{tg} x|$ ,  $y = |\operatorname{ctg} x|$  funksiyalarının qrafikləri də bu qayda ilə qurulur.

### 6.2.1.2. Tərs triqonometrik funksiyaların xassələri və qrafikləri

#### 1) Tərs triqonometrik funksiyaların tərifi.

**Tərif 1.**  $a$  ədədinin arksinusu  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$  parçasından götürülmüş elədədə deyilir ki, onun sinusu  $a$ -ya bərabərdir.

**Tərif 2.**  $[0; \pi]$  parçasından götürülən və kosinusu  $a$ -ya bərabər olan ədədə  $a$  ədədinin arkkosinusu deyilir.

**Tərif 3 .**  $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$  intervalındangötürülən və tangensi  $a$ -ya bərabər olan ədədə  $a$  ədədinin arktangensi deyilir.

**Tərif 4.**  $(0; \pi)$  intervalından götürülən və kotangensi  $a$ -ya bərabər olan ədədə  $a$  ədədinin arkkotangensi deyilir.

**2)  $y=\arcsin x$  funksiyasının xassələri və qrafiki.**


a) Bu funksiyanın təyin oblastı  $[-1; 1]$  parçasıdır.

b)  $y=\arcsin x$  funksiyası  $[-1; 1]$  parçasında monoton artandır və onun qiymətləri  $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$  parçasını təşkil edir.

c)  $y=\arcsin x$  funksiyası tək funksiyadır:

$$\arcsin(-x) = -\arcsin x.$$

$y=\arcsin x$  funksiyasının qrafikini qurmaq üçün  $y=\sin x$  funksiyasının qrafikini birinci koordinat bucağının tən-böləni ətrafında çevirmək lazımdır (şəkil 17a,b).



**Şəkil 17.**

**3)  $y=\arccos x$  funksiyasının xassələri və qrafiki.**




a).  $y = \arccos x$  funksiyasının təyin oblastı  $[-1; 1]$  parçasıdır.

b).  $y = \arccos x$  funksiyası  $[-1; 1]$  parçasında monoton azalandır və onun qiymətləri  $[0; \pi]$  parçasını təşkil edir.


c).  $y = \arccos x$  funksiyası üçün:

$$\arccos(-x) = \pi - \arccos x$$

bərabərliyi doğrudur. Bu bərabərlik göstərir ki,  $y = \arccos x$  funksiyası  $y = \cos x$  funksiyasından fərqli olaraq cütü olmayan funksiyadır.  $y = \arccos x$  funksiyasının qrafikini qurmaq üçün  $y = \cos x$  funksiyasının qrafikini birinci koordinat bucağının tən bölməni ətrafında çevirmək lazımdır (şəkil 18 a, b).



a)



b)

**Şəkil 18.**

#### 4) $y = \arctg x$ funksiyasının xassələri və qrafiki.

a)  $y = \arctg x$  funksiyasının təyin oblastı bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur:  $(-\infty; \infty)$ .

b)  $y = \arctg x$  funksiyası  $(-\infty; \infty)$  intervalında monoton artandır və onun qiymətləri  $(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2})$  intervalını təşkil edir.

c)  $y = \arctg x$  tək funksiyadır:  $\arctg(-x) = -\arctg x$ .

$y = \arctg x$  funksiyasının qrafiki 19-cu şəkildə verilmişdir.

**5)  $y = \arctg x$  funksiyasının xassələri və qrafiki.**


a)  $y = \arctg x$  funksiyasının təyin oblastı  $(-\infty; \infty)$  intervalıdır.

b)  $y = \arctg x$  funksiyası  $(-\infty; \infty)$  intervalında  $\pi$ -dən 0-a qədər monoton azalır və qiymətləri  $(0; \pi)$  intervalını təşkil edir.


c)  $y = \arctg x$  funksiyası üçün:

$$\arctg(-x) = \pi - \arctg x$$

bərabərliyi ödənilir. Bu, cütlüyü olmayan funksiyadır.  $y = \arctg x$  funksiyasının qrafiki 20-ci şəkildə göstərilmişdir.



**Şəkil 19.**



**Şəkil 20.**

### 6.2.2. Elementar funksiyalar

**Tərif.** Əsas elementar funksiyalar və sabitlər üzərində sonlu sayda dörd hesab əməli (toplama, çıxma, vurma, bölmə) və superpozisiyalar tətbiq etməklə alı-

nan və  $y=fx$ ) şəklində düsturla ifadə olunan funksiyalara elementar funksiyalar deyilir.

**Məsələn,**

$$1) y = \frac{10^x - 1}{4x + 1}$$

$$2) y = \lg^3(x + \sqrt{1 + x^2});$$

$$3) y = \sqrt{3 + x \sin x};$$

$$4) y = \arcsin(2 + x^2);$$

funksiyaları elementar funksiyalardır.

Elementar funksiyalar cəbri və transcendent funksiyalar adlanan iki sinfə bölünür.

Elementar funksiyaların şərtlərini ödəməyən funksiyalara elementar olmayan funksiyalar deyilir.

### **6.3.Cəbri və transcendent funksiyalar.Hiperbolikfunksiyalar**

#### **6.3.1. Cəbri funksiyalar**

**Tərif.** Qiymətləri argument üzərində sonlu sayda toplama, çıxma, vurma, bölmə və rasiyal üstə nəzərən qüvvətə yüksəltmə kimi cəbri əməllər aparmaqla alınabilən funksiyalara cəbri funksiyalar deyilir.

**Məsələn,**

$$1) y = 5x^2 - 3x + 2;$$

$$2) y = \frac{2x - 3}{1 - x};$$

$$3) y = \sqrt{2x - \pi};$$

$$4) y = \frac{1 - \sqrt{x}}{x + \sqrt[3]{x + 1}};$$

funksiyaları cəbri funksiyalardır.

Cəbri funksiyalar rasiional və irrasional olan iki növə bölünür.

### **Rasiional funksiyalar**

**Tərif.** Arqumenti üzərində kökalma əməlindən başqa qalan bütün əməllər aparıla bilən cəbri funksiyalara rasiional funksiyalar deyilir.

Rasiional funksiyalar **tam** rasiional və **kəsr** rasiional funksiyalara bölünür

#### **a) Tam rasiional funksiyalar**

Aşağıdakı düsturla verilən funksiyaya tam rasiional funksiya deyilir.

$$y = a_0 x^{n-1} + a_1 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n$$

burada: n-mənfi olmayan tam ədəd (yaxud n=0)  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$  verilmiş ədədlər və  $a_0 \neq 0$  ;

#### **b) Kəsr rasiional funksiyalar**

İki tam rasiional funksiyanın nisbəti:

$$y = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_{m-1} x + b_m}, \quad m \neq 0$$

şəklində verilən cəbri funksiyalara kəsr rasiional funksiyalar deyilir.

### **İrrasiional funksiyalar**

**Tərif.** Arqumenti üzərində toplama, çıxma, vurma, bölmə və həm də kökalma əməlləri aparıla bilən cəbri funksiyalara irrasional funksiyalar deyilir.

### **6.3.2. Transendent funksiyalar**

**Tərif.** Cəbri olmayan funksiyalara transendent funksiyalar deyilir.

Üstlü, loqarifmik, triqonometrik, tərs triqonometrik və üstü irrasional ədəd olan qüvvət funksiyaları transendent funksiyalardır.

### 6.3.3. Hiperbolik funksiyalar

Hiperbolik funksiyalar sadə elementar funksiyalar kimi çox geniş tətbiq olunan funksiyalardır.

$$1) \text{ hiperbolik sinus: } \operatorname{sh}x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x});$$

$$2) \text{ hiperbolik kosinus: } \operatorname{ch}x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x});$$

$$3) \text{ hiperbolik tangens: } \operatorname{th}x = \frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}};$$

$$4) \text{ hiperbolik kotangens: } \operatorname{cth}x = \frac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

$$5) \text{ hiperbolik sekans: } \operatorname{sch}x = \frac{1}{\operatorname{ch}x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$$

$$6) \text{ hiperbolik kosekans: } \operatorname{csch}x = \frac{1}{\operatorname{sh}x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$$

Triqonometrik funksiyalar arasında olan bir sıra münasibətlər uyğun olaraq hiperbolik funksiyalar üçün də vardır.

**Məsələn,**

$$1) \operatorname{ch}^2x - \operatorname{sh}^2x = 1$$

$$2) \operatorname{sh}2x = 2\operatorname{ch}x \cdot \operatorname{sh}x$$

$$3) \operatorname{ch}2x = \operatorname{sh}^2x + \operatorname{ch}^2x$$

$$4) \operatorname{sh}(x \pm y) = \operatorname{sh}x \cdot \operatorname{ch}y \pm \operatorname{ch}x \cdot \operatorname{sh}y$$

$$5) \operatorname{ch}(x \pm y) = \operatorname{ch}x \cdot \operatorname{ch}y \pm \operatorname{sh}x \cdot \operatorname{sh}y$$

$$6) \operatorname{ch}(-x) = \operatorname{ch}x$$

$$7) \operatorname{sh}(-x) = -\operatorname{sh}x$$

$$8) \operatorname{th}(-x) = -\operatorname{th}x$$

$$9) \operatorname{cth}(-x) = -\operatorname{cth}x$$

## VII FƏSİL. FUNKSIYANIN LİMİTİ

Funksiyanın limiti riyazi analizin əsas anlayışlarından biridir. Riyaziyyatın diferensial, inteqral və s. kimi çox mühüm anlayışları limit vasitəsilə təyin olunur.

### 7.1.1. Ardıcılığın limiti

Ardıcılıq, tam qiymətlər alan  $n$  arqumentinin funksiyasıdır. Tutaq ki,  $n$  arqumenti ardıcıl olaraq


$$1, 2, 3, \dots \quad (1)$$

qiymətlərini alır. Bu prosesi zamanla əlaqədar təsəvvür etsək (əlbəttə,  $n$ -nin dəyişməsinin zamanla heç bir əlaqəsi yoxdur), vaxt keçdikcə  $n$  dəyişəni istənilən böyük qiymətlər alaraq qeyri-məhdud artmaqda davam edəcəkdir. Qabaqcadan götürülmüş istənilən böyük hər bir  $N$  ədədi üçün elə bir an gələcəkdir ki, bu andan başlayaraq  $n$  dəyişəninin aldığı qiymətlər  $N$  ədədindən böyük olacaqdır.  $n$ -nin belə sonsuz artmasını qısa olaraq “ $n$  sonsuzluğa yaxınlaşır” və ya “ $n \rightarrow \infty$ ” kimi ifadə edirlər. Bizim burada məqsədimiz  $y_n = f(n)$  funksiyasının  $n \rightarrow \infty$  -da dəyişmə xarakterini öyrənməkdir. Bu məqsədlə,  $n \rightarrow \infty$  da  $y_n = 1 + \frac{1}{n}$  funksiyasını və yaxud

$$1 + 1, 1 + \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{3}, \dots, 1 + \frac{1}{n} \quad (2)$$

ardıcılığının dəyişmə xarakterini izləyək. Bu ardıcılığın bütün hədləri vahiddən fərqlidir, lakin  $n$  dəyişəni (1)

qiymətlərini alaraq artdıqda  $y_n = 1 + \frac{1}{n}$  funksiyasının aldığı qiymətlər vahidəçox yaxın olur. Bu yaxınlığın xarakteristikası həndəsi olaraq belədir:



**Şəkil 1.**

1-in istənilən  $\varepsilon$ -ətrafı üçün elə  $N=N(\varepsilon)$  ədədi (nömrəsi) var ki, (2) ardıcılığının, nömrəsi  $N$ -dən kiçik olmayan bütün hədləri 1-in həmin  $\varepsilon$ -ətrafında yerləşir (şəkil 1).

$$1 - \varepsilon < y_n < 1 + \varepsilon \quad (n \geq N) \quad (3)$$

**Məsələn,**  $\varepsilon = \frac{1}{10}$  olduqda  $N=11$ ,  $\varepsilon = \frac{1}{100}$  olduqda

$N=101$ ,  $\varepsilon = \frac{1}{1000}$  olduqda  $N=1001$  götürmək olar. (2)

ardıcılığının bu xassəsini belə ifadə edirlər: 1 ədədi  $n$  sonsuzluğa yaxınlaşdıqda (2) ardıcılığının limitidir.

Tutaq ki,  $A$  ədədi və  $\{y_n\}$  ardıcılığı verilmişdir.

**Tərif.** Tutaq ki, istənilən (kiçik) müsbət  $\varepsilon$  ədədi verildikdə elə müsbət  $N$  ədədi götürmək olur ki,  $n$ -in  $N$ -dən kiçik olmayan bütün qiymətlərində

$$|y_n - A| < \varepsilon \quad (n \geq N) \quad (4)$$

bərabərsizliyi ödənilir. Onda  $A$  ədədinə  $n \rightarrow \infty$ -da  $\{y_n\}$  ardıcılığının limiti deyilir və

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A \quad (5)$$

və ya



$$y_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty) \quad (6)$$


şəklində yazılır. (Burada lim işarəsi, mənası qayə (sərhəd) olan latın sözündən götürülmüşdür).

Qeyd edək ki,  $A$  ədədi və  $\{y_n\}$  ardıcılığı verildikdə tərifdə göstərilən  $N$  ədədinin seçilməsi  $\varepsilon$ -dan asılıdır:

$N=N(\varepsilon)$ .  $\varepsilon$  ədədi azaldıqca seçilən  $N$  ədədi, ümumiyyətlə, artır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, verilən  $\varepsilon$ -na qarşı seçilən  $N(\varepsilon)$  ədədi yeganə deyil. Tərifdə  $N(\varepsilon)$  ədədinin ancaq varlığı tələb olunur, yeganəliyi isə tələb olunmur. (4) bərabərsizliyi

$$-\varepsilon < y_n - A < \varepsilon \quad \text{və ya} \quad A - \varepsilon < y_n < A + \varepsilon \quad (n \geq N) \quad (7)$$

bərabərsizlikləri ilə eynigüclüdür. Buradan aydındır ki,  $A$  ədədi  $n \rightarrow \infty$  da  $\{y_n\}$  ardıcılığının limitidirsə, onda həmin ardıcılığın  $y_n$ -dən sonra gələn bütün hədləri  $A$  ədədinin  $\varepsilon$ -ətrafında yerləşir. Bu halda  $\{y_n\}$  ardıcılığının ancaq sonlu sayda həddi  $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$  intervalında yerləşməyə bilər. (şəkil 2)



**Şəkil 2.**

$f(n)$  funksiyası hər hansı  $Q$  xassəsini  $n$ -nin müəyyən  $N$ -dən kiçik olmayan bütün qiymətlərində ( $n \geq N$ ) ödədikdə, deyirlər ki,  $f(n)$  funksiyası  $Q$  xassəsini  $n$ -nin kifayət qədər böyük qiymətlərində ödəyir.

Deməli,  $a$  ədədi  $y_n = f(n)$  ardıcılığının  $n \rightarrow \infty$ -da limitidirsə, onda  $n$ -nin kifayət qədər böyük qiymətlərində (4) bərabərsizliyi ödənilir.

Ardıcılığın öz limitinə yaxınlaşma xarakteri müxtəlif ola bilər: ardıcılıq artaraq, azalaraq və ya limit ətrafında rəqs edərək ona (öz limitinə) yaxınlaşa bilər.

**Misal 1.**  $\left\{\frac{1}{n}\right\}$  ardıcılığının limiti sıfır bərabərdir.

Doğrudan da, istənilən kiçik ədədi verildikdə

$$\left|\frac{1}{n} - 0\right| = \frac{1}{n} < \varepsilon \text{ olmas\i uc\un n} > \frac{1}{\varepsilon} \text{ olması v\ea buna g\ora}$$

d\ea  $N = \left[\frac{1}{\varepsilon}\right] + 1$  g\ot\urm\ek kifay\etdir. Bu ardıcılıq azalaraq limit\ea yaxınlaşır.

**Misal 2.**  $\left\{2 - \frac{1}{n^2}\right\}$  ardıcılığının limiti 2 d\adedir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{1}{n^2}\right) = 2$$

Ardıcılıq artaraq limit\ea yaxınlaşır.

**Misal 3.**  $\left\{(-1)^n \cdot \frac{1}{n}\right\}$  ardıcılığ\ı sıfır \eatrafında r\eqs ed\er\ek ona yaxınlaşır:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[(-1)^n \cdot \frac{1}{n}\right] = 0$$

Bel\ea bir sual qarş\ıya çıxır: bir ardıcılığın ne\ea limiti ola bilər?

**Teorem 1. Ardıcılığın ancaq bir limiti ola bilər.**

İsbatı. \u00dcsin\ea f\erz ed\ek ki,  $\{y_n\}$  ardıcılığının m\uxt\elif iki  $A_1$  v\ea  $A_2$  ( $A_1 \neq A_2$ ) limiti var. Onda limitin t\erifin\ea g\ora, verilmiř ixtiyari  $\varepsilon = \frac{|A_1 - A_2|}{2}$  \ea d\adedi \u00e7\un

$$|y_n - A_1| < \varepsilon \quad (n \geq N_1) \quad (8)$$

$$\text{və} \quad |y_n - A_2| < \varepsilon \quad (n \geq N_2) \quad (9)$$

bərabərsizlikləri ödənilməlidir.  $N_1$  və  $N_2$  ədədlərinin ən böyüyünü  $N$  ilə işarə etsək,  $n \geq N$  olduqda (8) və (9) bərabərsizliklərinin ikisi də eyni zamanda ödənilər.

Buradan  $n \geq N$  olduqda

$$|A_1 - A_2| = |(A_1 - y_n) + (y_n - A_2)| \leq |A_1 - y_n| + |y_n - A_2| < 2\varepsilon = |A_1 - A_2|$$

və ya  $|A_1 - A_2| < |A_1 - A_2|$  alınır. Bu ziddiyyət teoremin doğruluğunu göstərir.

**Tərif.** Limiti olan ardıcılığa yığılan ardıcılıq, limiti olmayan ardıcılığa isə dağılan ardıcılıq deyilir.

**Misal 4.**

$$1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n-1}, \dots,$$

$$0, 1, 0, 1, \dots, \frac{1 + (-1)^n}{2}, \dots,$$

$$1, 4, 9, 16, \dots, n^2, \dots$$

ardıcılıqları dağılındır.

Qeyd edək ki, verilmiş yığılan ardıcılığın sonlu sayda həddini atmaq və ya dəyişmək olar, bu onun yığılmasına və limitinin qiymətinə təsir etmir.

Ardıcılığın bütün hədləri müxtəlif olmaya da bilərlər. Bütün hədləri bir-birinə bərabər olan

$$A, A, A, \dots, A \quad (10)$$

ardıcılığına stasionar ardıcılıq deyilir.

**Misal 5.** Stasionar  $y_n = A (n=1, 2, \dots)$  və ya (10) ardıcılığı yığılındır və onun limiti  $A$ -ya bərabərdir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$$

Doğrudanda, istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün

$$|y_n - A| = 0 < \varepsilon$$

bərabərsizliyi  $n$ -nin bütün qiymətlərində ödənilir.

**Teorem 2.**  $x_0$  nöqtəsi  $X = \{x\}$  ədədi çoxluğunun limit nöqtəsi olduqda, həmin çoxluğun elementlərindən  $x_0$  ədədinə yığılan  $\{x\}$  ardıcılığını ayırmaq olar.

İsbatı.  $x_0$  nöqtəsi  $X$  çoxluğunun limit nöqtəsi olduğundan onun istənilən ətrafında həmin çoxluğun sonsuz sayda elementi yerləşir. Onda  $(x_0 - 1, x_0 + 1)$  intervalında da  $X$  çoxluğunun sonsuz sayda elementi yerləşir. Bu elementlərin birini  $x_1$  ilə işarə edək. Sonra

$X$  çoxluğunun  $\left(x_0 - \frac{1}{2}, x_0 + \frac{1}{2}\right)$  intervalında yerləşən və

$x_1$ -dən fərqli olan hədlərinin birini götürüb  $x_2$  ilə işarə edək. Bu prosesi davam etdirdikdə  $n$ -ci dəfə  $X$

çoxluğunun  $\left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right)$  intervalında yerləşən  $x_n$

elementi  $(x_n \neq x_k, k = 1, n-1)$  götürülür. Beləliklə, ayrılmış  $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$  ardıcılığı üçün

$$|x_n - x_0| < \frac{1}{n}$$

münasibəti ödənilir. Buradan:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

İsbat etdiyimiz teoremin müəyyən mənada tərsi də doğrudur:  $X$  çoxluğunun  $x_0$  nöqtəsinə yığılan  $\{x_n\}$  ardıcılığı ayırmaq mümkündürsə, onda  $x_0$  nöqtəsi  $X$  çoxluğunun limit nöqtəsidir.

Doğrudan da,  $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$  olması o deməkdir ki, ixtiyari  $\varepsilon > 0$  ədədinə qarşı elə  $N = N(\varepsilon)$  var ki,  $n$ -nin  $n \geq N$  qiymətlərində

$$|x_n - x_0| < \varepsilon \quad \text{və yaxud} \quad x_0 - \varepsilon < x_n < x_0 + \varepsilon$$

bərabərsizliyi ödənilir. Deməli,  $x_0$ -in ətrafında ardıcılığın (buna görə də  $X$  çoxluğunun) sonsuz sayda həddi yerləşir. Bu isə  $x_0$  nöqtəsinin  $X$  çoxluğunun limit nöqtəsi olduğunu göstərir.

### 7.1.2. Yığılan ardıcılığın sadə xassələri

**Teorem 1. Yığılan ardıcılıq məhduddur.**

**İsbati.** Fərz edək ki,  $\{y_n\}$  ardıcılığı yığılandır və onun limiti  $a$ -ya bərabərdir. Onda  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $N$  var ki,  $n \geq N$  olduqda

$$|y_n - a| < \varepsilon \quad (n \geq N)$$

bərabərsizliyi ödənilir. Buradan:

$$|y_n| = |(y_n - a) + a| \leq |y_n - a| + |a| < \varepsilon + |a|$$

və ya

$$|y_n| < \varepsilon + |a| \quad (n \geq N)$$

Onda  $M$  ilə  $|y_1|, |y_2|, \dots, |y_{N-1}|, \varepsilon + |a|$  ədədlərinin ən böyüyünü işarə etsək,  $n$ -in bütün qiymətlərində  $|y_n| \leq M$  bərabərsizliyi ödənilir. Bu isə  $\{y_n\}$  ardıcılığının məhdud olması deməkdir.

Bu teoremin tərsi doğru deyildir. Məhdud ardıcılıq yığılan olmaya da bilər.

**Misal 1.** Məhdud  $\{(-1)^{n-1}\}$  ardıcılığının yığılan deyildir.

Doğrudan da,  $1, -1, 1, -1, \dots, (-1)^{n-1}, \dots$  ardıcılığının limiti yoxdur (4-cü misal), lakin onun bütün hədləri mütləq qiymətcə vahidi aşmır. Deməli, ardıcılığın məhdud olması onun yığılan olması üçün zəruri şərtədir, lakin kafi deyildir.

**Teorem 2.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$  olarsa, onda  $\lim_{n \rightarrow \infty} |y_n| = |A|$

**İsbatı.** Tərifə görə istənilən  $\varepsilon > 0$  üçün  $n \in \mathbb{N}$  var ki,  $n \geq N$  olduqda

$$|y_n - A| < \varepsilon \quad (n \geq N) \text{ olur. Onda}$$

$$||y_n| - |A|| \leq |y_n - A| < \varepsilon \quad (n \geq N)$$

$$\text{yəni} \quad |y_n| \rightarrow |A| \quad (n \rightarrow \infty)$$

Hər bir ardıcılığın altardıcılığından danışmaq olar. Verilmiş

$$y_1, y_2, \dots, y_n, \dots \quad (1)$$

ardıcılığının

$$n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$$

indeksli sonsuz sayda hədlərini ayıraraq

$$y_{n_1}, y_{n_2}, \dots, y_{n_k}, \dots \quad (2)$$

ardıcılığını düzəldək; burada  $k$  indeksi sonsuzluğa yaxınlaşanda  $n_k$  da sonsuzluğa yaxınlaşır. (2) ardıcılığına (1) ardıcılığının altardıcılığı deyilir.

Buradan aydındır ki, verilmiş (1) ardıcılığının sonsuz sayda altardıcılığı vardır.

**Teorem 3.** Verilmiş ardıcılığın  $A$  ədədinə yığılan olması üçün onun istənilən altardıcılığının həmin  $A$  ədədinə yığılan olması zəruri və kafi şərtədir.

Şərtin zəruri olduğunu isbat etmək üçün ardıcılığın limitinin tərifindən istifadə edək: istənilən  $\varepsilon > 0$  üçün

elə  $N(\varepsilon)$  var ki,  $n \geq N$  olduqda  $|y_n - A| < \varepsilon$  ( $n \geq N$ ) olur.

Buradan aydındır ki,  $n_k \geq N$  bərabərsizliyini ödəyən bütün  $n_k$  ədədləri üçün də  $|y_{n_k} - A| < \varepsilon$  ( $n_k \geq N$ ) bərabərsizliyi ödənilir. Buradan:

$$y_{n_k} \rightarrow A \quad (k \rightarrow \infty)$$

Şərtin kafiliyi də eyni qayda ilə isbat olunur.

**Qeyd.** Hər bir ardıcılıqdan həmişə yığılan monoton altardıcılığın ayırmaq olar.

**Misal 2.**  $\{y_n\} = \left\{ \sin n \frac{\pi}{2} \right\}$  və ya

$$1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, \dots \quad (3)$$

ardıcılığının limiti yoxdur (dağılındır), lakin (3) ardıcılığının

$$\begin{aligned} &1, 1, 1, \dots, \\ &0, 0, 0, \dots, \\ &-1, -1, \dots \end{aligned} \quad (4)$$

kimi üç altardıcılığından hər birinin ayrılıqda limiti (əlbəttə, müxtəlif) var: 1; 0 və -1. Altardıcılıqlarının hamısı eyni limitə yığılmadığından 3-cü teoremə görə (3) ardıcılığının limiti yoxdur.

**Teorem 4.**  $\{y_n\}$  ardıcılığın  $A$  ədədinə yığılırsa və  $A < p$  ( $A > q$ ) olarsa, onda elə  $N$  var ki,  $n$ -nin  $N$ -dən kiçik olmayan bütün qiymətlərində  $y_n < p$  ( $y_n > q$ ) bərabərsizliyi ödənilir.

**İsbatı.** Limitin tərifinə görə  $\varepsilon = p - A > 0$  ədədi üçün elə  $N(\varepsilon)$  var ki,  $n$ -nin  $N$ -dən kiçik olmayan bütün qiymətlərində

$$|y_n - A| < \varepsilon$$

və ya

$$A - \varepsilon < y_n < A + \varepsilon = p \quad (n \geq N)$$

Bərabərsizlikləri ödənilir. Axırını münasibətdən teoremin doğruluğu aydındır. Bu teoremdən bir sıra maraqlı nəticələr çıxarmaq olar.

**Nəticə 1.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$  və  $n$ -nin bütün qiymətlərində

$$y_n \leq p \quad (y_n \geq q)$$

olduqda

$$A \leq p \quad (A \geq q)$$

Doğrudan da,  $A > p$  olarsa, onda isbat etdiyimiz teoremə görə elə  $N$  ədədi tapmaq olar ki,  $y_n > p$  ( $n \geq N$ ) olur. Alınan münasibət şərtə ziddir, deməli,  $A \leq p$ .

**Nəticə 2.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A < 0$  ( $> 0$ ) olduqda elə  $N > 0$  ədədi var ki,  $n$ -nin  $n \geq N$  qiymətləri üçün

$$y_n < 0 \quad (y_n > 0) \quad (n \geq N)$$

**Teorem 5.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = A$  və  $n$ -nin bütün qiymətlərində

$$y_n \leq v_n \leq u_n \quad (5)$$

münasibəti ödənilərsə, onda  $\{v_n\}$  ardıcılığı yığılandır və

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$$

**İsbatı.** Ardıcılığın limitinin tərifinə görə istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi verildikdə elə  $N_1$  və  $N_2$  ədədləri tapmaq olar ki,

$$A - \varepsilon < y_n < A + \varepsilon \quad (n \geq N_1) \quad (6)$$

$$A - \varepsilon < u_n < A + \varepsilon \quad (n \geq N_1) \quad (7)$$



bərabərsizlikləri ödənilir.  $N$  ilə  $N_1$  və  $N_2$  ədədlərinin ən böyüyünü işarə etsək, onda (5),(6), (7) bərabərsizliklərinə görə  $n$ -nin  $n \geq N$  qiymətlərində

$$A - \varepsilon < v_n < A + \varepsilon$$

bərabərsizlikləri və ya

$$|v_n - A| < \varepsilon$$

münasibəti ödənilər. Buradan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = A$$

olması aydındır.

**Nəticə.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = A$  və  $n$ -in bütün qiymətlərində

$$y_n \leq v_n \leq A$$

münasibəti ödənilirsə, onda  $\{v_n\}$  ardıcılığı  $A$  ədədinə yığılar:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = A.$$

### 7.2.1.Limit nöqtəsinin varlığı

Tutaq ki,  $X = \{x\}$  hər hansı ədədi çoxluqdur. Limit nöqtəsinin tərifindən aydındır ki, sonlu  $x$  çoxluğunun limit nöqtəsi ola bilməz. Sonsuz çoxluğun isə limit nöqtəsi ola da bilər olmaya da bilər. Məsələn : sonsuz

$$N = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$$

Çoxluğunun heç bir limit nöqtəsi yoxdur, sonsuz

$$X_1 = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\}$$

Çoxluğunun isə limit nöqtəsi ( $x=0$ ) var.

Sonsuz çoxluqların limit nöqtəsinin varlığı haqqında kafi şərti aşağıdakı teorem şəklində söyləmək olar.

**Teorem 1(Bolsan -Veyerstrass).** Məhdud sonsuz çoxluğun heç olmasa bir limit nöqtəsi var.

**İsbati.**  $X$  çoxluğu məhdud olduğundan onun bütün nöqtələri bir sonlu  $[a,b]$  parçasında yerləşir.  $[a,b]$  parçasının iki bərabər  $[a,a']$  və  $[a',b]$  ( $a < a' < b$ ) hissəyə bölək. Bu hissələrin heç olmazsa birinin daxilində  $X$  çoxluğundan sonsuz sayda nöqtə yerləşər (əks halda,  $[a,b]$  parçasında  $X$  çoxluğunun sonlu sayda nöqtəsi yerləşər ki, bu da  $X$ -in tamamilə həmin parçada yerləşməsinə ziddir.) Həmin hissənin  $[a_1, b_1]$  ilə işarə edək. Bu parçanı da yarıya bölərək daxilində  $X$  çoxluğunda sonsuz sayda nöqtə yerləşən hissəni  $[a_2, b_2]$  ilə işarə edək. Prosesi davam etdirsək hər birinin daxilində  $X$  çoxluğundan sonsuz sayda nöqtə yerləşən, uzunluqları 0-a yığılan və hər biri özündən əvvəlkinin daxilində yerləşən  $[a_n, b_n]$  parçaları ardıcılığını alarıq.

$$[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n] \supset \dots, \quad (1)$$

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

Yığılan parçalar prinsipinə görə (1) parçalarının hamısı üçün ortaq olan yeganə bir  $S$  nöqtəsi var. Bu nöqtə  $X$  çoxluğunun limit nöqtəsidir.

Doğurdan da  $C$  nöqtəsinin istənilən  $(C - \varepsilon, C + \varepsilon)$  ətrafını götürsək,  $n$ -in kifayət qədər böyük qiymətlərində  $[a,b]$  parçası həmin ətrafdada yerləşər. Bu parçaların hər birinin daxilində  $X$  çoxluğundan sonsuz sayda nöqtə yerləşdiyindən, həmin ətrafdada  $X$  çoxluğunun sonsuz sayda nöqtəsi yerləşər. Deməli,  $C$  nöqtəsi  $X$  çoxluğunun limit nöqtəsidir.

Qeyd edək ki , teoremin doğruluğu üçün çoxluğun məhdud olması vacib şərtidir. Lakin sonsuz çoxluğun məhdudluğu limit nöqtəsinin vətliyi üçün kafi şərt olub zəruri deyildir.

**Nəticə 1.** Məhdud sonsuz çoxluqdan yığılan ardıcillıq ayırmaq olar.

Doğurdan da , belə çoxluğun heç olmazsa bir limit nöqtəsi var.  $X$  çoxluğundan həmin nöqtəyə yığılan ardıcillıq ayırmaq isə həmişə mümkündür .

**Teorem 2 (Bolsan - Veyerştrass).** Hər bir məhdud sonsuz  $\{x_n\}$  ardıcılığından yığılan altardıcillıq ayırmaq olar.

**İsbatı.** Verilmiş  $\{x_n\}$  ardıcılığı sonsuz sayda müxtəlif nöqtələrdən təşkil olunarsa, onun hər hansı  $X_{n_0}$  həddi sonsuz sayda təkrar olunmalıdır. Bu halda həmin hədlərdən düzəlmiş

$$x_{n_0}, x_{n_0}, \dots, x_{n_0}, \dots$$

altardıcılığı tələb edilən atlardıcillıq olacaqdır.

$\{X_n\}$  ardıcılığı sonsuz sayda müxtəlif ədədlərdən təşkil olunarsa  $x = \{x_n\}$  çoxluğuna nəticəni tətbiq etməklə bu halda teoremin doğruluğuna inanmaq olar.

**Qeyd.** Hər bir məhdud sonsuz ardıcılıqdan yığılan monoton ardıcillıq ayırmaq olar. Tutaq ki,  $\{X_n\}$  məhdud ardıcillıq və  $a$  hər hansı (sonlu) ədəddir. Əgər istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün

$$a - \varepsilon < x_n \quad (x_n < a + \varepsilon)$$

Bərabərsizliyi  $n$ -in sonsuz sayda qiymətlərində,

$$a + \varepsilon < x_n \quad (x_n < a - \varepsilon)$$

bərabərsizliyi isə  $n$ -in ancaq sonlu sayda qiymətlərində ödənilsə, onda  $a$  ədədinə  $\{X_n\}$  ardıcılığının yuxarı (aşa-

ğı) limiti deyilir və

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = a$$

və ya

$$\lim \sup x_n \quad (\lim \inf x_n)$$

şəkilində yazılır.

Ardıcılığın ancaq bir yuxarı (aşağı) limiti ola bilər. Məhdud  $\{x_n\}$  ardıcılığının həm sonlu yuxarı və həm sonlu aşağı limiti var və onlar arasında

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n \geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n$$

münasibəti doğrudur. Bu münasibətdə bərabərlik işarəsi yalnız və yalnız o zaman olar ki,  $\{x_n\}$  ardıcılığının limiti olsun. Bu halda

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

Məhdud  $\{X_n\}$  və  $\{Y_n\}$  ardıcılıqlarının yuxarı və aşağı limitləri üçün

$$\begin{aligned} \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) &\leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \\ \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (x_n + y_n) &\geq \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} x_n + \underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} y_n \end{aligned}$$

münasibətləri doğrudur.

Nəhayət, qeyd edək ki, məhdud sonsuz ardıcılıqdan yuxarı(aşağı) limitinə yığılan alt ardıcılıq ayırmaq olar.

### 7.2.2. e ədədi, natural loqarifm

$$\text{Əvvəlcə } y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (1)$$

ardıcılığının limitini tədqiq edək.

Nyuton binomu düsturuna əsasən:

$$\begin{aligned} y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + \frac{n}{1} \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{1 \cdot 2} \cdot \frac{1}{n^2} + \frac{n(n-1)(n-2)}{1 \cdot 2 \cdot 3} \cdot \frac{1}{n^3} + \\ &+ \dots + \frac{n(n-1) \dots [n - (n-1)]}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n} \cdot \frac{1}{n^n} \end{aligned}$$

Bu bərabərliyi

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) + \dots + \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right) \quad (2)$$

şəklində də yazmaq olar (2) bərabərliyinin sağ tərəfində  $(n+1)$  sayda hədd vardır. Bu bərabərliyi  $y_{n+1}$  üçün yazaq:

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = 1 + 1 + \frac{1}{2!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right) + \dots + \frac{1}{n!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) + \frac{1}{(n+1)!} \cdot$$

$$\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \quad (3)$$

(3) bərabərliyinin sağ tərəfindəki hədlərin sayı  $(n+2)$  olur. Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki hədlər (2) bərabərliyin sağ tərəfindəki uyğun hədlərdən kiçik olmadığından, yəni

$$\frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right) < \frac{1}{k!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)\left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right)$$

Olduğundan

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$$

və ya

$$y_n < y_{n+1} \quad (4)$$

Bundan başqa, (2) bərabərliyinə əsasən

$$y_n < 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 + \frac{1 - \frac{1}{2^n}}{\frac{1}{2}} = 1 + 2\left(1 - \frac{1}{2^n}\right) < 3. \quad (5)$$

(4) və (5) münasibətlərindən aydındır ki, (1) ardıcılığı monoton artan və yuxarıdan məhduddur. Belə ardıcılığın birinci teoremə görə sonlu limiti var.

Həmin limit  $e$  ilə işarə olunur.

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad (6)$$

$e$ , irrasional ədəddir. Onun qiymətini təqribi hesablamaq olar:

$$e = 2.718281828459045\dots$$

$e$  ədədinin riyazi analizdə böyük əhəmiyyəti vardır.  $e$  ədədini çox zaman loqarifmin əsası hesab edirlər.  $e$  əsasına görə ədədlərinin loqarifminə natural loqarifm deyilir və «ln» ilə işarə olunur.  $N$  ədədinin natural loqarifmi «ln  $N$ » şəklində yazılır. Natural loqarifmdən istifadə etdikdə riyazi analizim bir sıra düsturları çox sadə şəkildə alınır. Buna görə də riyaziyyatda natural loqarifmdən çox geniş istifadə olunur.

Hər bir  $N$  ədədinin onluq və natural loqarifmləri arasında müəyyən əlaqə yaratmaq olar. Bu məqsədlə  $\ln N = a$  qəbul edək. Onda  $N = e^a$ . Bərabərliyinin hər iki tərəfindən 10 əsasına görə loqarifm alsaq

$$\lg N = a \lg e$$

və  $a = \ln N$  olduğuna görə:

$$\lg N = \ln N \cdot \lg e$$

Buradan

$$\ln N = \frac{\lg N}{\lg e}$$

Bu bərabərlikdən istifadə edərək,  $N$  ədədinin onluq loqarifmi məlum olduqda onun natural loqarifmini və tər-

sinə, N ədədinin natural loqarifmi məlum olduqda onun onluq loqarifmini tapmaq olar.

$$\lg e = \lg 2,718281\dots = 0,43429\dots$$

ədədinə keçmə modulu deyilir və M ilə işarə olunur:

$$M = \lg e = 0,43429\dots$$

Aydınır ki,

$$\frac{1}{M} = \frac{1}{\lg e} = 2,30258\dots$$

**Misal 1.**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+3}$  limitini hesablamalı. e ədədinin tərifinə əsasən:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 = e.$$

### 7.2.3. Funksiyanın limiti

Tutaq ki,  $y=f(x)$  funksiyası  $X=\{x\}$  çoxluğunda təyin olunmuşdur və  $a$  nöqtəsi bu çoxluğun limit nöqtəsidir ( $a$  nöqtəsi  $X$  çoxluğuna daxil ola da bilər, olmaya da bilər). Onda  $X$  çoxluğundan  $a$ -ya yığılan

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots \quad (1)$$

( $x_k \neq a, k=1, 2, \dots$ ) ardıcılığını ayırmaq olar. Aydınır ki,  $X$  çoxluğu  $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$  ( $\varepsilon > 0$ ) və  $(a, a+\varepsilon)$  intervalları,

$[a-\varepsilon, a+\varepsilon], [a-\varepsilon, a]$  və  $[a, a+\varepsilon]$  parçaları,  $[a-\varepsilon, a)$  yarım intervalı və s. ola bilər.  $y=f(x)$  funksiyasının (1) nöqtələrində aldığı qiymətlər

$$f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n), \dots \quad (2)$$

ardıcılığını əmələ gətirir. Aydınır ki,  $X$  çoxluğundan  $a$ -ya yığılan çox ardıcılıq ayırmaq olar.

a-ya yığılan (1) ardıcılıqlarına uyğun olaraq (2) ardıcılıqlarının yığılması haqqında nə demək olar?

Burada iki hal ola bilər: ola bilər ki, a-ya yığılan (1) ardıcılıqlarına uyğun olan (2) ardıcılıqlarının hamısı eyni bir  $A$  ədədinə yığılır, ola da bilər ki, eyni bir  $A$  ədədinə yığılmır.

Birinci halda deyirlər ki,  $x$  argumenti a-ya yaxınlaşdıqda ( $x \rightarrow a$ ) və ya  $x=a$  nöqtəsində  $f(x)$  funksiyasının limiti var və  $A$  ədədi onun limitidir. Buna

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \quad (3)$$

və ya

$$f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow a) \quad (4)$$

şəkilində yazırlar.

İkinci halda deyirlər ki,  $f(x)$  funksiyasının  $x=a$  nöqtəsində limiti yoxdur. İndi funksiya limitinin dəqiq tərifini verək.

**Tərif 1.**  $X$  çoxluğunun a-ya yığılan istənilən  $\{x_n\}$  ( $x_n \neq a$ ,  $n=1, 2, \dots$ ) nöqtələri ardıcılığına  $f(x)$  funksiyasının uyğun olan  $\{f(x_n)\}$  qiymətləri ardıcılıqlarının hamısı eyni bir  $A$  ədədinə yığıldıqda, həmin  $A$  ədədinə  $x \rightarrow a$  şərtində  $f(x)$  funksiyasının limiti deyilir.

Buradan aydındır ki a-ya yığılan heç olmazsa iki  $\{x'_n\}$  və  $\{x''_n\}$  ardıcılığına  $f(x)$  funksiyasının  $\{f(x'_n)\}$  və  $\{f(x''_n)\}$  uyğun qiymətləri ardıcılıqları müxtəlif limitlərə yığılarsa onda  $f(x)$  funksiyasının  $x=a$  nöqtəsində limiti yoxdur.

Funksiyanın nöqtədə limitinin başqa tərfi dəvardır.

**Tərif 2.** Tutaq ki, sonlu  $a$  və  $A$  ədədləri və istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $\varphi > 0$  ədədi var ki,  $x$ -in  $X$  çoxluqundan götürülmüş və

$$0 < |x - a| < \varphi \quad (5)$$



bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad (6)$$

münasibəti ödənilir. Onda  $A$  ədədinə  $x \rightarrow a$  şərtində  $f(x)$  funksiyasının limiti deyilir.

Qeyd edək ki,  $A$  ədədi  $x \rightarrow a$  şərtində  $f(x)$  funksiyasının limiti olduqda (6) bərabərliyinin  $x=a$  qiymətində ödənilib ödənilməməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur.  $f(x)$  funksiyası  $x=a$  nöqtəsində təyin olunduqda isə onun həmin nöqtədə limiti xüsusi  $f(a)$  qiymətinə bərabər ola da bilər, olmaya da bilər.

Funksiya qiymətinin 1-ci tərifinə “limitin ardıcılıq dilində tərfi” (və ya Heyne mənada tərfi) 2-ci tərifinə isə “limitin  $\varepsilon, \delta$  dilində tərfi” (və ya Koşi mənada tərfi) deyilir.

**Teorem 1.** Funksiyanın nöqtədə limitinin 1 və 2-ci tərifləri ekvivalentdir (eynigüclüdür). Bu o deməkdir ki,  $A$  ədədi təriflərin birinə görə  $f(x)$  funksiyasının  $x=a$  nöqtəsində limitdirsə, təriflərin digərinə görə də həmin nöqtədə  $f(x)$ -in limitidir.

**İsbati.** Fərz edək ki,  $A$  ədədi təriflərin birinə görə  $f(x)$  funksiyasının  $x=a$  nöqtəsində limitidir, lakin 2-ci tərifə görə  $x=a$  nöqtəsində limiti deyil. Bu o deməkdir ki, istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədinə qarşı 2-ci tərifin tələblərini ödəyən  $\varphi > 0$  ədədi tapmaq mümkün deyil, yəni elə  $\varepsilon_0 > 0$  ədədi var ki, ona qarşı götürülmüş istənilən  $\varphi > 0$  ədədi üçün  $x$ -in  $|x - a| < \varphi$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində ( $\varphi$ ) bərabərsizliyi ödənilmir,  $x$ -in (5) münasibətini ödəyən heç olmazsa bir  $x^*$  qiyməti var ki

$$|f(x^*) - A| \geq \varepsilon_0 \text{ olur}$$

Beləliklə  $\delta$  ədədinə ardıcıl olaraq  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$  qiymətlərini verməklə elə

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \dots \quad (7)$$

nöqtələrini tapırıq ki,

$$|x_k - a| < \frac{1}{k} |f(x_k) - A| \geq \varepsilon_0 \quad (8)$$

Münasibətləri eyni zamanda ödənilər.  $|x_k - a| < \frac{1}{k}$  bərabərsizliyi ödənildiyindən (7) ardıcılığı  $a$  ədədinə yığılar. Onda 1-ci tərifə görə

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = A$$

olmalıdır. Bu o deməkdir ki, istənilən  $\varepsilon_0 > 0$  ədədinə qarşı elə  $N = N(\varepsilon_0)$  var ki,  $k$ -nın  $k \geq N$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində

$$|f(x_k) - A| < \varepsilon_0 \quad (9)$$

bərabərsizliyi ödənilir. (8) bərabərsizliklərinin ikincisinə görə isə (9) bərabərsizliyi ödənilə bilməz.

Alınan ziddiyət göstərir ki  $A$  ədədi ikinci tərifə görə də  $f(x)$  funksiyasının  $x=a$  nöqtəsində limitidir.

İndi fərz edək ki,  $a$  ədədi 2-ci tərifə görə  $f(x)$  funksiyasının  $x=a$  nöqtəsində limitidir. Onda istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədinə qarşı elə  $\delta > 0$  tapmaq olar ki,  $x$ -in  $|x - a| < \delta$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində  $|f(x) - A| < \varepsilon$  bərabərsizliyi ödənilir. Bu halda,  $\{x_n\}$  ardıcılığı  $a$ -ya yığılan istənilən ardıcılıq olduqda  $\varphi > 0$  ədədinə qarşı elə  $N$  tapmaq olar ki,

$$|x_n - a| < \varphi \quad (n \geq N)$$

bərabərsizliyi ödənilsin. Belə  $x_n$  nöqtələri üçün:

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon \quad (n \geq N),$$

olar. Bu isə

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

olduğunu, yəni  $A$  ədədi 1-ci tərifə görə  $f(x_n) - \ln x = a$  nöqtəsində limiti olduğunu göstərir.

Funksiya limitinin 1 və 2-ci tərifləri ekvivalent olduğundan onların hər birindən istifadə etmək olar.

### Misal 1.

$$f(x) = \sin \frac{1}{x} \quad (x \neq 0) \quad (10)$$

funksiyasının  $x=0$  nöqtəsində limitini hesablamalı.

Bu məqsədlə 0-a yığılan  $x'_n = \frac{1}{n\pi}$  ( $n=1, 2, \dots$ ) və  $x''_n = \frac{2}{(4n+1)\pi}$  ( $n=1, 2, \dots$ ) ardıcılıqlarını götürək:  $x'_n \rightarrow 0, (n \rightarrow \infty)$  və  $x''_n \rightarrow 0$  ( $n \rightarrow \infty$ ). Bu ardıcılıqlara (10) funksiyasının uyğun olan qiymətləri

$$f(x'_n) = \sin \frac{1}{x'_n} = \sin n\pi = 0 \quad (n=1, 2, \dots)$$

$$\text{və } f(x''_n) = \sin \frac{1}{x''_n} = \sin \frac{(4n+1)\pi}{2} = 1 \quad (n=1, 2, \dots)$$

olduğundan  $\{f(x'_n)\}$  və  $\{f(x''_n)\}$  ardıcılıqları müxtəlif ədədlərə yığılır.

$$f(x'_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

$$f(x''_n) \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

Funksiya limitini birinci tərifinə görə (10) funksiyasının  $x=0$  nöqtəsində limiti yoxdur.

### Misal 2.

$$f(x) = \begin{cases} 1 + x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 2 & x = 0 \end{cases} \quad (11)$$

Funksiyasının  $x=0$  nöqtəsində limitinin 1-ə bərabər olduğunu göstərməli.

Bu məqsədlə (11) funksiyası üçün  $x \neq 0$  nöqtəsində doğru olan

$$|f(x) - 1| = \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|$$

bərabərsizliyini nəzərə alaraq, ixtiyari  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün  $\delta = \varepsilon$  seçmək kifayətdir. Onda  $x$ -in  $|x - 0| < \delta$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində

$$|f(x) - 1| \leq |x| < \varphi = \varepsilon$$

bərabərsizliyi doğru olar, bu da

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$

olduğunu göstərir.

İndi  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$  olmasının həndəsi izahını verək. Bu məqsədlə funksiya limitinin 2-ci tərifindən istifadə edək (6) bərabərsizliyinin ona ekvivalent olan

$$- \varepsilon < f(x) - A < \varepsilon$$

və ya

$$A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$$

şəklində yazaq. (12) bərabərsizliyi göstərilir ki,  $M[x, f(x)]$  nöqtəsi  $y = A - \varepsilon$  və  $y = A + \varepsilon$  düz xəttləri arasında yerləşir.

Deməli,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$  olması həndəsi olaraq o deməkdir ki,  $(xOy)$  müstəvisi üzərində  $y = A - \varepsilon$  və  $y = A + \varepsilon$  düz xətləri ilə hüdudlanmış ixtiyari zolaq üçün elə  $(a - \delta, a + \delta)$  intervalı var ki,  $f(x)$  funksiyasının bu intervaldakı qrafikinin (qrafik üzərində  $a$ -ya uyğun olan nöqtə müstəsna olmaqla) bütün nöqtələri (NQ əyrisi) həmin zolağın daxilində yerləşir.

### 7.3.1. Limiti olan funksiyanın xassələri

Fərz edək ki,  $y=f(x)$  funksiyası  $x=x_0$  nöqtəsini öz daxilinə alan hər hansı intervalda təyin olunmuşdur.

**Teorem 1.**  $x_0$  nöqtəsində sonlu limiti olan  $f(x)$  funksiyası həmin nöqtənin müəyyən  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  ətrafında ( $x_0$  nöqtəsi müstəsna olmaqla) məhduddur.

**İsbati.** Tutaq ki,  $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$ . Onda  $\varepsilon = 1$  ədədi üçün elə  $\delta > 0$  var ki,  $x$ -in  $0 < |x - x_0| < \delta$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

münasibəti ödənilir. Buradan,  $x$ -in  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  intervalında yerləşən bütün qiymətləri ( $x_0$  müstəsna olmaqla) üçün:

$$|f(x)| \leq |A| + |f(x) - A| < |A| + 1 = M$$

**Nəticə.**  $X_0$  nöqtəsinin heç bir ətrafında məhdud olmayan  $f(x)$  funksiyasının  $x \rightarrow x_0$  şərtində (və ya  $x = x_0$  nöqtəsində) sonlu limiti yoxdur.

**Teorem 2.**  $f(x)$  funksiyasının bir  $x_0$  nöqtəsində müxtəlif iki  $A$  və  $B$  limiti ola bilməz.

Bu teoremin doğruluğu ardıcılığın limitinin yeganə olması haqqındakı teoremdən aydındır.

**Teorem 3.**  $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$  və  $A > B$  ( $A < B$ ) olduqda  $x_0$  nöqtəsinin elə  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  ətrafı var ki,  $x$ -in bu ətrafdakı bütün qiymətlərində ( $x_0$  müstəsna olmaqla)

$$f(x) > B \quad (f(x) < B)$$

**İsbati.**  $A > B$  olduqda  $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$  olduğundan

$\varepsilon = A - B$  ədədi üçün elə  $\delta > 0$  var ki,  $x$ -in  $0 < |x - x_0| < \delta$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad \text{və ya} \quad A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$$

münasibəti ödənilir. Deməli,  $x$ -in  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  intervalındakı bütün qiymətlərində ( $x_0$  müstəsna olmaqla)

$$f(x) > A - \varepsilon = B$$

**Nəticə.**  $\lim_{n \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$  ( $A < 0$ ) olduqda  $x_0$  nöqtəsinin elə  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  ətrafı var ki,  $x$ -in bu ətrafdakı bütün qiymətlərində ( $x_0$  nöqtəsi müstəsna olmaqla)

$$f(x) > 0 \quad (f(x) < 0)$$

**Teorem 4. (Koşî kriteriyası).**  $y = f(x)$  funksiyanın  $x_0$  nöqtəsində sonlu limitinin olması üçün aşağıdakı şərtin ödənilməsi zəruri və kafidir: istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ , ədədi var ki,  $x$ -in  $0 < |x' - x_0| < \delta$  və  $0 < |x'' - x_0| < \delta$  bərabərsizliklərini ödəyən ixtiyari iki  $x'$  və  $x''$  qiymətlərində

$$|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$$

bərabərsizliyi ödənilir.

Bu teoremin isbatını vermirik.

İsbat olunan teoremlərdə və 4-cü teoremdə  $x_0$  əvəzinə  $-\infty, +\infty$  simvollarının hər birini götürmək olar.

### **Sonsuz kiçilən funksiyalar.**

Burada biz  $x = x_0$  nöqtəsini öz daxilinə alan hər hansı intervalda təyin olunmuş ( $x_0$  nöqtəsi müstəsna ola bilər)  $f(x)$  funksiyanı baxacağıq.

Limiti  $x = x_0$  nöqtəsində sıfıra bərabər olan  $y = f(x)$  funksiyanı həmən nöqtədə və ya  $x \rightarrow x_0$ -da sonsuz kiçilən funksiya deyilir.

**Teorem 1.** A ədədi  $x \rightarrow x_0$  şərtində  $f(x)$ -in limiti olması üçün  $\alpha(x)=f(x)-A$  fərqlinin  $x \rightarrow x_0$  şərtində sonsuz kiçilən olması üçün zəruri və kafi şərtir.

**Şərtin zəruriliyi.** Tutaq ki,  $f(x) \rightarrow A$  ( $x \rightarrow x_0$ ). Onda ixiyari  $\varepsilon > 0$  üçün  $\delta > 0$  var ki,  $x$ -in  $|x - x_0| < \delta$  ( $x \neq x_0$ ) münasibətini ödəyən bütün qiymətlərində

$$|\alpha(x)| = |f(x) - A| < \varepsilon$$

(1)

bərabərsizliyi ödənilir. Buradan

$$\alpha(x) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0) \text{ alınır.}$$

**Şərtin kafiliyi.**  $\alpha(x) \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow x_0$ ) olduqda  $x$ -in  $|x - x_0| < \delta$  ( $x \neq x_0$ ) münasibətini ödəyən bütün qiymətlərində (1) bərabərsizliyi ödənilir, bu da  $f(x) \rightarrow A$  ( $x \rightarrow x_0$ ) olması deməkdir.

Bu teoremdən aydın olur ki,  $f(x) \rightarrow A$  ( $x \rightarrow x_0$ ) olması funksiyanın

$$f(x) = A + \alpha(x), \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$$

(2)

Şəklində göstərilməsinə ekvivalentdir.

**Misal 1.**  $f(x) = 5 + (x-1)^2$  olduqda  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ , çünki,

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x-1)^2 = 0$$

### 7.3.2. Funksiyanın sağ və sol limiti

Funksiya limitinin tərifindən aydındır ki, A ədədi  $x=a$  nöqtəsində  $f(x)$  funksiyanın limitidirsə, onda  $x$ -in

a-ya yaxın və onun istənilən tərəfində (sol və sağ) yerləşən bütün qiymətlərində

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad (1)$$

bərabərsizliyi ödənilir. Funksiyanın  $x=a$  nöqtəsində limiti olmadıqda isə (1) bərabərsizliyi  $x$ -in  $a$ -nın müəyyən tərəfində (məsələn, ya solunda, ya da sağında) yerləşən qiymətlərində ödənilə bilər. Bu halda funksiyanın həmin nöqtədə birtərəfli limitindən danışmaq olar.

**Tərif.** Tutaq ki, sonlua və  $A$  ədədləri verildikdə istənilən  $\varepsilon > 0$  ədi üçün elə  $\delta > 0$  ədədi var ki,  $x$ -in  $X$  çoxluğundan götürülmüş və

$$0 < a - x < \delta \quad (2)$$

bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad (3)$$

münasibəti ödənilir. Onda  $A$  ədədinə  $x \rightarrow a$  şərtində (və ya  $x=a$  nöqtəsində)  $f(x)$  funksiyanının sol limiti deyilir və

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ (x < a)}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0) \quad (4)$$

şəklində işarə olunur.

Bu tərifdəki (2) bərabərsizliyini  $0 < x - a < \delta$  ilə əvəz etsək,  $f(x)$  funksiyanının  $x=a$  nöqtəsində sağ limitinin tərifini alarıq. Funksiyanın sağ limiti

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ (x > a)}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a+0) \quad (5)$$

şəklində işarə olunur.

$f(x)$  funksiyanının  $x=0$  nöqtəsində sol və sağ limitini uyğun olaraq  $f(-0)$  və  $f(+0)$  ilə işarə edirlər

**Teorem.**  $y=f(x)$  funksiyanının  $x=a$  nöqtəsində limitinin olması üçün onun həmin nöqtədə sol və sağ limitlə-



rinin varlığı və bir-birinə bərabər olması zəruri və kafi şərtidir.

**İsbati.** Tutaq ki, bərabərsizliklərini ödəyən bütün qiymətlərində. Onda (3) bərabərsizliyi,  $x$ -in  $0 < |x - a| < \delta$  münasibətini ödəyən və buna görə də  $x$ -in  $0 < a - x < \delta$  və  $0 < x - a < \delta$  bərabərsizliklərini ödəyən bütün qiymətlərində ödənilir. Deməli,

$$A = \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a - 0) = f(a + 0)$$

yəni şərtin zəruriliyi doğrudur. Şərtin kafiliyini isbat edək.

İndi fərz edək ki,  $f(x)$ -in  $x = a$  nöqtəsində bir-birinə bərabər olan sağ və sol limitləri var:

$$A = f(a - 0) = f(a + 0)$$

Onda sol və sağ limitlərin tərifinə görə istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $\delta_1$  və  $\delta_2$  ədədləri var ki,  $x$ -in  $0 < a - x < \delta_1$  və  $0 < x - a < \delta_2$  bərabərsizliklərini ödəyən bütün qiymətlərində

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad (6)$$

bərabərsizliyi ödənilir. Buradan,  $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$  olarsa  $x$ -in  $0 < |x - a| < \delta$  bərabərsizliklərini ödəyən bütün qiymətlərində (6) bərabərsizliyinin ödənildiyi alınır, yəni

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

$a$  və  $A$  ədədlərinin hər hansı biri və ya hər ikisi  $-\infty$ ,  $+\infty$  olduqda da funksiyanın sol və sağ limiti (sonlu və ya «sonsuz») uyğun şəkildə təyin olunur.

**Misal 1.**  $f(x) = [x]$  funksiyanının  $x = n$  ( $n$  natural ədəddir) nöqtəsində sol və sağ limitini hesablamalı.

Funksiyanın tərifinə görə

$$f(x) = \begin{cases} n-1, & n-1 \leq x < n \text{ nolarsa,} \\ n, & n \leq x < n+1 \text{ olarsa} \end{cases}$$

olduğubdan istənilən  $\varepsilon > 0$  üçün  $x$ -in  $0 < n-x < \delta$  ( $< 1$ ) qiymətlərində

$|f(x) - (n-1)| = 0 < \varepsilon$  və  $x$ -in  $0 < n-x < \delta$  ( $< 1$ ) qiymətlərində

$$|f(x) - n| = 0 < \varepsilon$$

bərabərsizliyi ödənilir. Deməli,

$$f(n-0) = n-1 \text{ və } f(n+0) = n$$

Aydınır ki, funksiyanın  $x=n$  nöqtəsində limiti yoxdur.

**Misal 2.**  $f(x) = \text{sign } x$  funksiyasının  $x=0$  nöqtəsində sol və sağ limitini hesablamalı.  $x$ -in  $x < 0$  qiymətlərində  $f(x) = -1$  və  $x > 0$  qiymətlərində isə  $f(x) = 1$  olduğundan

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = -1 = f(-0)$$

və

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ (x > 0)}} f(x) = 1 = f(+0)$$

**Misal 3.**  $f(x) = 2^{\frac{1}{x}}$  funksiyası üçün

$$f(-0) = 0 \text{ və } f(+0) = +\infty$$

### 7.3.3. Limitlər haqqında əsas teoremlər

Əvvəlki paragrafda olduğu kimi burada da biz, arqumentin sonlu  $x_0$  nöqtəsinə yaxınlaşdığı halda limit-

ləri öyrənəcəyik. Lakin aşağıda isbat edəcəyimiz teoremlər arqumentin  $(-\infty)$  və  $(+\infty)$  - a yaxınlaşdığı hallarda da doğrudur.

**Teorem 1.** Sonlu limitləri olan sonlu sayda  $f_k(x)$  ( $k=1, 2, \dots, n$ ) funksiyalarının cəminin limiti onların limitləri cəminə bərabərdir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sum_{k=1}^n f_k(x) = \sum_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) \quad (1)$$

**İsbatı.** Fərz edək ki,  $f_k(x) \rightarrow A_k$  ( $x \rightarrow x_0$ ) ( $k = \overline{1, n}$ ). Onda əvvəlki paraqrafda isbat etdiyimiz 1-ci teoremə görə

$$F_k(x) = A_k + \alpha_k(x) \quad (k=1, 2, \dots, n), \quad (2)$$

burada

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha_k(x) = 0 \quad (k = \overline{1, n}) \quad (2) \text{ bərabərliklərinə əsasən}$$

$$\sum_{k=1}^n f_k(x) = \sum_{k=1}^n A_k + \sum_{k=1}^n \alpha_k(x)$$

Sonlu sayda sonsuz kiçilənlərin cəmi sonsuz kiçilən olduğundan

$$\alpha(x) = \sum_{k=1}^n \alpha_k(x)$$

funksiyası  $x \rightarrow x_0$  şərtində sonsuz kiçiləndir. Onda:

$$\sum_{k=1}^n f_k(x) = \sum_{k=1}^n A_k + \alpha(x),$$

bu da 1-ci teoremə görə

$$\sum_{k=1}^n f_k(x) \rightarrow \sum_{k=1}^n A_k \quad (x \rightarrow x_0)$$

və ya (1) bərabərliyini doğru olduğunu göstərir.

**Teorem 2.** Sonlu limitləri olan sonlu sayda  $f_k(x)$  ( $k=1,2,..n$ ) funksiyalarının hasilinin limiti onların limitləri hasilinə bərabərdir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \prod_{k=1}^n f_k(x) = \prod_{k=1}^n \lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) \quad (3)$$

**İsbatı.** Ümumiliyi pozmadan, teoremi  $n=2$  olduqda isbat edək. Əvvəlki teoremin isbatında olduğu kimi yenə  $\lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = A_k$  ( $x \rightarrow x_0$ ) qəbul etsək (2) bərabərliklərini alarıq

Həmin bərabərliklərə əsasən

$$\begin{aligned} f_1(x) \cdot f_2(x) &= [A_1 + \alpha_1(x)][A_2 + \alpha_2(x)] = \\ &= A_1 A_2 + [A_1 \alpha_2(x) + A_2 \alpha_1(x) + \alpha_1(x) \cdot \alpha_2(x)] \end{aligned}$$

və ya

$\alpha(x) = A_1 \alpha_2(x) + A_2 \alpha_1(x) + \alpha_1(x) \cdot \alpha_2(x)$  qəbul etsək, onda:

$$f_1(x) \cdot f_2(x) = A_1 \cdot A_2 + \alpha(x)$$

$\alpha(x)$  funksiyası sonsuz kiçilən olduğundan (teorem 3,4) axırıncı bərabərlikdən (teorem 1) (3) münasibətinin  $n=2$  olduqda doğruluğu aydındır.

**Nəticə 1.** Sabit vuruğu limit işarəsi xaricinə çıxarmaq olar:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [c f(x)] = c \cdot \left[ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]$$

Nəticənin doğruluğu sabitin limitinin özünə bərabər olmasından  $\lim_{x \rightarrow x_0} c = c$  və teoremdən aydındır.

**Nəticə 2.** Sonlu limiti olan  $f(x)$  və  $\varphi(x)$  funksiya­larının fər­qinin limiti onların limitləri fər­qinə bərabərdir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - \varphi(x)] = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$$

Doğrudan da,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - \varphi(x)] &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + (-1)\varphi(x) = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) + \lim_{x \rightarrow x_0} (-1)\varphi(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) \end{aligned}$$

**Nəticə 3.** Sonlu limiti olan  $f(x)$  funksiya­si üçün

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = \left[ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \right]^n$$

bərabərliyi doğrudur.

**Teorem 3.**  $f(x)$  və  $\varphi(x)$  funksiya­larının sonlu limit­ləri varsa və  $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) \neq 0$  olarsa, onların nisbətinin limiti limitlərinin nisbətinə bərabərdir:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)} \quad (4)$$

**İsbatı.** Fərz edək ki,  $f(x) \rightarrow A$  ( $x \rightarrow x_0$ ) və  $\varphi(x) \rightarrow B$  ( $x \rightarrow x_0$ ). Onda  $f(x) = A + \alpha(x)$  və  $\varphi(x) = B + \beta(x)$ , burada  $\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$  və  $\lim_{x \rightarrow x_0} \beta(x) = 0$  Bu münasibətlərə əsasən

$$\begin{aligned} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \frac{A + \alpha(x)}{B + \beta(x)} = \frac{A}{B} + \left( \frac{A + \alpha(x)}{B + \beta(x)} - \frac{A}{B} \right) \text{ və ya} \\ \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \frac{A}{B} + \gamma(x) \end{aligned} \quad (5)$$

Burada

$\gamma(x) = \frac{\alpha(x)B - A\beta(x)}{B(B + \beta(x))}$  ifadəsi  $x \rightarrow x_0$  olduqda sonsuz

kiçilən olduğundan (5) göstərilişindən (4) alınır.

**Misal.** Aşağıdakı limiti tapmalı:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{8x^2 + 4}{4x + 1}$$

Limitlər haqqında isbat etdiyimiz 3-cü, 1-ci və 2-ci teoremlərdən ardıcıl istifadə etsək:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{8x^2 + 4}{4x + 1} = \frac{\lim_{x \rightarrow 2} (8x^2 + 4)}{\lim_{x \rightarrow 2} (4x + 1)} = \frac{8 \lim_{x \rightarrow 2} x^2 + 4}{4 \lim_{x \rightarrow 2} x + 1} = \frac{36}{9} = 4$$

### Bərabərsizlikdə limitə keçmək

**Teorem 1.**  $x$ -in  $x_0$ -ın müəyyən ətrafındakı bütün qiymətlərində ( $x \neq x_0$ )  $f(x) \geq q$  bərabərsizliyi ödənilirsə və  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  limiti sonludursa, onda

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \geq q \quad (1)$$

**İsbatı.**  $x_0$  nöqtəsinə yığılan ixtiyari  $x_n$  ardıcılığını ( $x_n \neq x_0$ ) götürək. Onda  $n$ -nin kifayət qədər böyük bütün qiymətlərində

$$f(x_n) \geq q \quad (n > n_0)$$

bərabərsizliyi ödənilir. Burada limitə keçsək və funksiya limitinin tərifini nəzərə alsaq (1) bərabərsizliyi alınır.

**Nəticə.**  $\varphi(x)$  və  $\psi(x)$  funksiyalarının  $x \rightarrow x_0$  şərtində limiti varsa və  $x_0$ -ın müəyyən ətrafındakı bütün ( $x \neq x_0$ ) qiymətlərində

$$\varphi(x) \geq \psi(x)$$

bərabərsizliyi ödənilərsə, onda:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) \geq \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x)$$

Nəticənin doğruluğuna inanmaq üçün  $f(x) = \psi(x) - \varphi(x)$  funksiyasına teoremi tətbiq etmək ( $q=0$  hesab edərək) kifayətdir.

### **Teorem 2. Əgər sonlu**

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = A$$

limiti varsa və  $x$ -in  $x_0$ -in müəyyən ətrafındakı bütün ( $x_n \neq x_0$ ) qiymətlərində  $f(x) \leq \psi(x) \leq \varphi(x)$ .

Tutaq ki,  $\{x_n\} = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ ,  $\{y_n\} = \{y_1, y_2, \dots, y_n, \dots\}$  ardıcılıqları və  $m \neq 0$  ədədi verilmişdir. Onda bu ardıcılıqlar üzərində aşağıdakı əməlləri aparmaq olar:

- 1)  $m\{x_n\} = \{mx_n\} = mx_1, mx_2, \dots, mx_n, \dots$ ,
- 2)  $\{x_n\} \pm \{y_n\} = \{x_n \pm y_n\} = x_1 \pm y_1, x_2 \pm y_2, \dots, x_n \pm y_n, \dots$ ,
- 3)  $\{x_n\} \cdot \{y_n\} = \{x_n \cdot y_n\} = x_1 \cdot y_1, x_2 \cdot y_2, \dots, x_n \cdot y_n, \dots$ ,
- 4)  $y_n \neq 0$ ;  $\frac{\{x_n\}}{\{y_n\}} = \left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\} = \frac{x_1}{y_1}, \frac{x_2}{y_2}, \dots, \frac{x_n}{y_n}, \dots$ ,

Bütün elementləri eyni olan ardıcılıq, sabit və ya stasionar ardıcılıq adlanır.

## VIII FƏSİL. FUNKSIYALARIN KƏSİLMƏZLİYİ

### 8.1.1. Funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyi

**Tərif 1.**  $(a,b)$  intervalında təyin olunmuş  $f(x)$  funksiyanın  $x_0 \in (a,b)$  nöqtəsindəki limiti  $f(x_0)$ -a bərabər olarsa, başqasözlə

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

olarsa, deyirlər ki,  $f(x)$  funksiyası  $x_0$  nöqtəsində kəsilməzdir.

**Misal 1.**  $f(x)=x^2$  funksiyanın  $x_0$  nöqtəsində kəsilməzliyini aydınlaşdırın.

**Həlli:** Funksiya hər bir  $x_0 \in (-\infty, +\infty)$  nöqtəsində kəsilməzdir, çünki

$$\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = x_0^2$$

**Misal 2.** Aşağıdakı funksiyanın kəsilməzliyini tədqiq edin :

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ x^2 + 1, & x < 0. \end{cases}$$

**Həlli.** Bu funksiya  $x=0$  nöqtəsindən başqa hər bir  $x \in (-\infty, +\infty)$  nöqtəsində kəsilməzdir.  $x=0$  nöqtəsində isə funksiya kəsilməz deyil, belə ki,

$$f(-0) = \lim_{x \rightarrow -0} f(x) = \lim_{x \rightarrow -0} (x^2 + 1) = 1,$$

$$f(+0) = \lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \lim_{x \rightarrow +0} x = 0.$$



### 8.1.2.Sağdan (soldan) kəsilməz funksiyalar

**Tərif 2.** Əgər

$$f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = f(x_0) \quad \left( \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = f(x_0) \right)$$

olarsa, onda deyirlər ki,  $f(x)$  funksiyası  $x=x_0$  nöqtəsində **soldan (sağdan) kəsilməzdir.**

Əgər  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında təyin olunmuşsa, onda aydındır ki, onun  $x=a$  nöqtəsində sağdan,  $x=b$  nöqtəsində isə soldan kəsilməzliyindən söhbət gedə bilər. Əgər  $x_0 \in (a, b)$  olarsa, onda  $f(x)$  funksiyası  $x=x_0$  nöqtəsində yalnız və yalnız o zaman kəsilməz olur ki, o həmin nöqtədə həm sağdan və həm də soldan kəsilməz olsun.

### 8.1.3.Artım vasitəsilə kəsilməzliyin tərfi

Funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyinin tərfini başqa cür də vermək olar.  $x \in (a, b)$  və  $x_0 \in (a, b)$  olarsa,  $\Delta x = x - x_0$  fərqi **argumentin artımı**,  $\Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0)$  fərqi **isə funksiyanın  $x=x_0$  nöqtəsində artımı** deyilir:

$$\Delta x = x - x_0, \quad \Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0).$$

**Tərif 2.** Əgər  $f(x)$  funksiyası  $(a, b)$  intervalında təyin olunmuşsa və  $x_0 \in (a, b)$  üçün

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$$

olarsa, onda deyirlər ki,  $f(x)$  funksiyası  $x=x_0$  nöqtəsində kəsilməzdir.

**Misal.**  $f(x) = \sqrt{x}$ ,  $x \in [0, +\infty)$  funksiyasının hər bir  $x=x_0 > 0$  nöqtəsində kəsilməz olduğunu göstərək.

**Həlli.** Bunun üçün  $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}|$  qiymətləndirək:

$$0 \leq |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}}$$

$\frac{1}{\sqrt{x_0}}$  sabit olduğundan

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} = 0$$

olur. Onda

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = 0 \text{ və ya } \lim_{x \rightarrow x_0} (\sqrt{x} - \sqrt{x_0}) = 0$$

olur və buna görə də

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$$

alırıq.

Funksiya  $X$  aralığının hər bir nöqtəsində kəsilməzdirsə, onda deyirlər ki, həmin funksiya  $X$  aralığında kəsilməzdir.

## 8.2. Nöqtədə kəsilməz funksiyanın əsas xassələri

**Teorem 1.**  $x_0$  nöqtəsində kəsilməz olan sonlu sayda funksiyaların cəmi (fərqi) həmin nöqtədə kəsilməzdir.

**Teorem 2.**  $x_0$  nöqtəsində kəsilməz olan sonlu sayda funksiyaların hasili həmin nöqtədə kəsilməzdir.

**Teorem 3.** Əgər məxrəcdəki funksiyanın  $x_0$  nöqtəsindəki qiyməti sıfırdan fərqli olarsa, onda bu nöqtədə kəsilməz olan iki funksiyanın nisbəti həmin nöqtədə kəsilməzdir.

Bu teoremlər bilavasitə funksiyaların limitlərinin xassələri haqqında olan uyğun teoremlərdən alınır.

**Misal 1.**  $f(x) = x^n$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  funksiyası bütün həqiqi ədədlər çoxluğunda kəsilməzdir. Çünki  $f(x) = x^n = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_n$  funksiyası  $n$  sayda kəsilməz funksiyanın hasilidir.

**Misal 2.**  $f(x) = Cx^n$  ( $C$ -sabitdir) funksiyası  $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$  çoxluğunda kəsilməzdir, çünki həm  $u(x)=C$  sabir funksiyası və həm də  $\psi(x) = x^n$  funksiyası həmin çoxluqda kəsilməzdir.

**Misal 3.**  $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$  çoxhədli funksiyası sonlu sayda kəsilməz (bütün həqiqi ədədlər çoxluğunda) funksiyaların cəmindən ibarət olduğu üçün kəsilməzdir.

**Misal 4.** İki çoxhədli funksiyanın nisbəti olan

$$f(x) = \frac{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n}{b_0x^m + b_1x^{m-1} + \dots + b_{m-1}x + b_m}$$

kəsr rasiyal funksiya məxrəcin sıfıra çevrildiyi nöqtələrdən başqa bütün nöqtələrdə kəsilməzdir.

### 8.3. Parçada kəsilməyən funksiyanın xassələri

Burada  $[a, b]$  parçasında kəsilməyən  $y=f(x)$  funksiyasının bir sıra əsas xassələri şərh olunur. Qeyd edək ki,  $f(x)$  funksiyasının parçanın  $a$  sol uc nöqtəsində kəsilməzliyi dedikdə, onun həmin nöqtədə sağdan kəsilməzliyi ( $f(a+0) = f(a)$ ),  $b$  sağ uc nöqtəsində kəsilməzliyi dedikdə isə həmin nöqtədə soldan kəsilməzliyi ( $f(b-0) = f(b)$ ) başa düşülür.

**Teorem 1.** (Veyerştrassın birinci teoremi). Sonlu  $[a, b]$  parçasında kəsilməyən  $f(x)$  funksiyası həmin parçada məhduddur.

**İsbati.** Əksinə fərz edək ki,  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında məhdud deyildir. Onda hər bir natural  $n$  ədədi üçün elə  $x_n \in [a, b]$  nöqtəsi var ki,

$$|f(x_n)| > n \quad (n = 1, 2, \dots) \quad (1)$$

olur. Bu  $\{x_n\}$  ardıcılığı məhdud olduğundan ( $a \leq x_n \leq b$ ), ondan bir  $x_0 \in [a, b]$  nöqtəsinə yığılan  $\{x_n\}$  ardıcılığı ayırmaq olar:  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ . Şərtə görə  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında kəsilməyən olduğundan  $x_0$  nöqtəsində kəsilməyəndir. Onda kəsilməzliyin tərifinə görə  $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = f(x_0)$ . Bu isə (1) bərabərsizliyinə ziddir. Deməli,  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında məhduddur.

**Xassə 2.** (Veyerştrassın ikinci teoremi). Sonlu  $[a, b]$  parçasında kəsilməyən  $f(x)$  funksiyası bu parçanın heç olmasa bir  $\alpha$  nöqtəsində özünün həmin parçadakı dəqiq aşağı sərhəddini, heç olmasa bir  $\beta$  nöqtəsində isə dəqiq yuxarı sərhəddini alır, yəni

$$f(\alpha) = \inf_{x \in [a, b]} f(x) = m_0, \quad f(\beta) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) = M_0 \quad (2)$$

**İsbati.** Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasının heç bir nöqtəsində  $M_0$  qiymətini almır. Onda  $x$ -in  $[a, b]$ -dəki bütün qiymətlərində  $f(x) < M_0$  olar. Yeni

$$\varphi(x) = \frac{1}{M_0 - f(x)}$$

funksiyası düzəldək.  $\varphi(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında kəsilməyən olduğundan 1 xassəyə görə məhduddur:

$$\varphi(x) \leq M_1 \quad (M_1 > 0).$$

Buradan:


$$f(x) \leq M_0 - \frac{1}{M_1} \quad (a \leq x \leq b)$$

(bu isə  $M_0$  ədədinin  $[a, b]$  parçasında  $f(x)$  funksiyasının dəqiq yuxarı sərhədi olmadığını göstərir). Deməli, fərziyyə-miz doğru deyil, yəni heç olmasa bir  $\beta \in [a, b]$  nöqtəsində  $f(\beta) = M_0$  olar.

Funksiyanın heç olmasa bir  $\alpha \in [a, b]$  nöqtəsində dəqiq aşağı sərhəddini alması da eyni qayda ilə isbat olunur.

**Xassə 3.**  $[a, b]$  parçasında kəsilməyən  $y=f(x)$  funksiyası həmin parçanın uc nöqtələrində müxtəlifşərəli qiymətlər alırsa, onda  $a$  və  $b$  nöqtələri arasında yerləşən ən azı bir  $c$  ( $a < c < b$ ) nöqtəsi var ki, bu nöqtədə  $f(x)$  funksiyası sıfıra çevrilir:  $f(c)=0$ .

Bu xassəni çox sadə həndəsi mənası var: absis oxunun müxtəlif tərəflərində yerləşən  $A[a, f(a)]$  və  $B[b, f(b)]$  nöqtələrini ( $f(a) > 0, f(b) < 0$ ) və yaxud da ( $f(a) < 0, f(b) > 0$ ) birləşdirən və kəsilməz  $y=f(x)$  funksiyasının qrafiki olan əyri  $Ox$  oxunu heç olmasa bir  $c$  nöqtəsində kəsir.



**Şəkil 1.**

$f(c) = 0$  olduqda  $c$  nöqtəsinə  $f(x)$  funksiyasının sıfırı deyilir.

**Xassə 4.**  $[a, b]$  parçasında kəsilməyən  $y=f(x)$  funksiyası həmin parçanın uc nöqtələrində bərabər olmayan  $A=f(a) \neq B=f(b)$  qiymətlərini alırsa, onda həmin  $A$  və  $B$  ədədləri arasında yerləşən hər bir  $C$  ədədi üçün  $[a, b]$  parçasında yerləşən ən azı bir  $\xi$  nöqtəsi var ki,  $f(\xi)=C$  olar.

#### **8.4 . Tərs funksiyanın kəsilməzliyi**

Verilmiş oblastda monoton olan  $y=f(x)$  funksiyasının tərs funksiyanın varlığı və funksiyanın qiymətlər çoxluğunda onun monoton olması əvvəldən məlumdur.

İndi tərs funksiyanın kəsilməzliyi haqqında aşağıdakı teoremi isbat edək.

**Teorem.**  $[a, b]$  parçasında təyin olunmuş kəsilməyən və artan (ya da azalan)  $y=f(x)$  funksiyasının tərs funk-

siyası olan  $x = \varphi(y)$  funksiyası  $[c, d]$  ( $c = f(a)$ ,  $d = f(b)$ ) parçasında kəsilməyəndir.

**İsbat.** Tərs funksiyanın istənilən  $y_0 \in [c, d]$  nöqtəsində kəsilməz olduğunu isbat etmək üçün həmin nöqtəyə yığılan ixtiyari  $\{y_n\}$  ardıcılığını götürək:


$y_n \rightarrow y_0$  ( $n \rightarrow \infty$ ),  $y_n \in [c, d]$  ( $n = 1, 2, \dots$ )  $x_0 = \varphi(y_0)$  və  $x_n = \varphi(y_n)$  olarsa, onda  $x_0 = f(x_0)$  və  $y_n = f(x_n)$  Kəsilməzliyin tərifinə görə  $x = \varphi(y)$  funksiyasının  $y_0$  nöqtəsində kəsilməz olduğunu yəqin etmək üçün istənilən  $y_n \rightarrow y_0$  ( $n \rightarrow \infty$ ) ardıcılığı üçün həmişə  $x_n = \varphi(y_n) \rightarrow \varphi(y_0) = x_0$  ( $n \rightarrow \infty$ ) olduğunu göstərmək kifayətdir. Bunu isbat etmək üçün əksini fərz edək. Tutaq ki, elə  $\{x_{n_k}\}$  ardıcılığı var ki,  $x_0$  nöqtəsində deyil, başqa  $x^*$  nöqtəsinə yığılır ( $x^* \in [a, b]$ ,  $x^* \neq x_0$ ), onda  $f(x)$  artan funksiya olduğundan  $f(x^*) \neq f(x_0)$ .

Şərtə görə bütün  $f(x_{n_k}) = y_{n_k}$  ardıcılıqları  $y_0 = f(x_0)$  nöqtəsinə yığılır:

$$f(x_{n_k}) = y_{n_k} \rightarrow y_0 = f(x_0) \quad (k \rightarrow \infty)$$

O biri tərəfdən isə  $x_{n_k} \rightarrow x^*$  ( $k \rightarrow \infty$ ) olduğundan  $f(x)$  funksiyasının kəsilməzliyinə görə  $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x^*)$  ( $k \rightarrow \infty$ ) olmasıdır. Deməli,  $\{f(x_{n_k})\}$  ardıcılığı iki müxtəlif  $f(x_0)$  və  $f(x^*)$  limitlərinə yığılır. Bu isə ola bilməz. Alınan ziddiyyət teoremin doğru olduğunu göstərir.

Bu teoremdə funksiyanın təyin oblastı olaraq parça əvəzinə interval da götürmək olar.



**Şəkil 1.**

Lakin təyin oblastı parça və intervaldan fərqli oblast götürüldükdə teorem doğru olmaya bilər.

Doğrudan da, təyin oblastı iki  $[a, a_1]$  və  $[b_1, b]$  parçalarından ibarət olan və monoton artan  $y = f(x)$  funksiyasının  $x = \varphi(y)$  tərs funksiyası  $y_0$  nöqtəsində kəsiləndir (şəkil 1).



## IX FƏSİL. ELEMENTAR FUNKSIYALARIN KƏSİLMƏZLİYİ

### 9.1.1. Kəsilmə nöqtələri

Verilmiş  $f(x)$  funksiyasının təyin oblastına daxil olan  $x_0$  nöqtəsinə o zaman onun kəsilmə nöqtəsi deyilir ki, həmin nöqtədə

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) \quad (1)$$

bərabərliyi ödənilməsin. Elementar funksiyaların belə kəsilmə nöqtəsi ola bilməz, çünki bütün elementar funksiyalar təyin oblastlarının hər bir nöqtəsində kəsilməyəndir.

Qeyd edək ki,  $f(x)$  funksiyasının təyin oblastına daxil olmayan, lakin həmin oblastın sərhəd nöqtəsi olan nöqtəni  $d_f(x)$  funksiyasının kəsilmə nöqtəsi hesab edəcəyik. Elementar funksiyaların kəsilmə nöqtələri isə elə bu tipli nöqtələr olur.

Limitin tərifinə əsasən (1) bərabərliyi  $f(x)$  funksiyasının  $x_0$  nöqtəsindəki sol və sağ limitləri vasitəsilə yazılmış

$$f(x_0 - 0) = f(x_0) = f(x_0 + 0) \quad (2)$$

münasibətinə ekvivalentdir. Deməli,  $x_0$  nöqtəsi  $f(x)$  funksiyasının kəsilmə nöqtəsidirsə, onda (2) münasibətindəki bərabərliklərin heç olmasa biri pozulmalıdır.

### 9.1.2 Birinci və ikinci növ kəsilmə nöqtələri.

**Tərif 1.** Əgər  $x_0$  nöqtəsi  $f(x)$  funksiyasının kəsilmə nöqtəsidirsə və bu nöqtədə funksiyanın sonlu  $f(x_0 - 0)$  və  $f(x_0 + 0)$  sol və sağ limitləri varsa, onda

$x_0$  nöqtəsinə  $f(x)$  funksiyasının birinci növ kəsilmə nöqtəsi deyilir.  $f(x)$  funksiyasının  $x_0$  kəsilmə nöqtəsində

$$f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$$

münasibəti ödənildikdə,  $x_0$  nöqtəsinə  $f(x)$ -in aradan qaldırılı bilən kəsilmə nöqtəsi deyilir. Bu halda funksiya  $x_0$  nöqtəsində təyin olunmuş olarsa, onun həmin nöqtədəki qiymətini dəyişərək

$$f(x_0) = f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) \quad (3)$$

qəbul etsək,  $f(x)$  funksiyası  $x_0$  nöqtəsində kəsilməyən olar. Funksiya  $x_0$  nöqtəsində təyin olunmamışsa, onda həmin nöqtədə funksiyanı (3) bərabərliyi ilə təyin edərək, nəticədə  $x_0$  nöqtəsində kəsilməyən funksiya alarıq.

Funksiyanın  $x_0$  kəsilmə nöqtəsində

$$f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$$

münasibəti ödənildikdə,  $x_0$  nöqtəsinə  $f(x)$ -in sonlu sıçrayışlı kəsilmə nöqtəsi deyilir və

$$d = |f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)|$$

fərqi  $f(x)$  funksiyasının  $x_0$  nöqtəsindəki sıçrayışı adlanır.  $d$  ədədi,  $x_0$  nöqtəsində  $f(x)$  funksiyasının necə dəyişdiyini xarakterizə edir.

Dediklərimizdən aydındır ki, funksiyanın birinci növ kəsilmə nöqtələri aradan qaldırıla bilən və sonlu sıçrayışlı kəsilmə nöqtələrindən ibarətdir.

**Tərif 2.** Əgər  $f(x)$  funksiyanın  $x_0$  kəsilmə nöqtəsində  $f(x_0 - 0)$  (sol) və  $f(x_0 + 0)$  (sağ) limitlərinin


heç olmazsa biri yoxdursa ya da sonsuzluğa bərabərdirsə, onda  $x_0$  nöqtəsinə  $f(x)$  funksiyanın ikinci növ kəsilmə nöqtəsi deyilir.

**Misal 1.**  $f(x) = \text{sign} x$  funksiyanın  $x=0$  nöqtəsində kəsilmə nöqtəsi bu funksiyanın birinci növ (sonlu sıçrayışlı) kəsilmə nöqtəsidir.  $f(-0)=-1$  və  $f(+0)=1$  olduğundan  $x=0$  nöqtəsində  $f(x)$  funksiyanın sıçrayışı  $d=2$  olar.


**Misal 2.**  $f(x) = \frac{\sin x}{x}$  ( $x \neq 0$ ) funksiyanın  $x=0$  nöqtəsində kəsilmə nöqtəsi bu funksiyanın birinci növ (aradan qaldırıla bilən) kəsilmə nöqtəsidir.

$f(-0)=1=f(+0)$  olduğundan  $f(0)=1$  qəbul etsək, funksiya  $x=0$  nöqtəsində kəsilməyən olar (şəkil 1).

**Misal 3.** Ədəd oxunun hər bir nöqtəsi  $y=D(x)$  Dirixle funksiyanın ikinci növ kəsilmə nöqtəsidir. İxtiyari  $x_0 \in (-\infty, \infty)$  nöqtəsində  $D(x)$  funksiyanın nə sol  $D(x_0-0)$ , nə də sağ  $D(x_0+0)$  limiti yoxdur.



Şəkil 1.



Şəkil 2.

$$\text{Misal 4. } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x \neq 0 \text{ olduqda} \\ 2, & x = 0 \text{ olduqda} \end{cases}$$

Funksiyası  $x=0$  nöqtəsində kəsiləndir.  $x=0$  nöqtəsi funksiyanın ikinci növ kəsilmə nöqtəsidir. Bu nöqtədə:  $f(0)=2$ ,  $f(-0)=-\infty$  və  $f(+0)=\infty$  (şəkil 2).

**Misal 5.**  $f(x)=\sin\frac{1}{x}$  ( $x \neq 0$ ) funksiyası üçün  $x=0$  ikinci növ kəsilmə nöqtəsidir. Bu nöqtədə  $f(-0)$  və  $f(+0)$  limitlərinin heç biri yoxdur.

### 9.1.3. Monoton funksiyasının kəsilmə nöqtələri

Fərz edək ki,  $y=f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında təyin olunmuş monoton (artan, azalmayan, azalan, artmayan) funksiyadır. Bu funksiya  $[a, b]$  parçasında məhduddur.  $f(a)$  və  $f(b)$  ədədləri (parçanın uc nöqtələrindəki qiymətləri) onun  $[a, b]$  parçasında ən kiçik və ən böyük qiymətləridir.

Monoton funksiya təyin oblastının bütün nöqtələrində kəsilməyən olmaya da bilər. Lakin onun kəsilmə nöqtələrinin xarakteri haqqında müəyyən fikir söyləmək mümkündür.

**Teorem 1.**  $[a, b]$  parçasında monoton olan  $f(x)$  funksiyasının həmin parçada ancaq birinci növ kəsilmə nöqtəsi ola bilər.

**İsbatı.** Ümumiliyi pozmadan teoremi azalmayan funksiya üçün isbat etmək kifayətdir. Tutaq ki,  $x_0 \in [a, b]$  nöqtəsi parçanın sol ucundan fərqli hər hansı

nöqtədir.  $[a, b]$  parçasının  $x_0$ -dan solda yerləşən hissəsində  $f(x) \leq f(x_0)$  bərabərsizliyi ödənildiyindən həmin çoxluqda  $f(x)$  funksiyası yuxarıda məhduddur. Bu çoxluqda  $f(x)$  funksiyasının dəqiq yuxarı sərhəddi  $M_0$  olsun. Onda dəqiq yuxarı sərhəddin tərifinə görə ixtiyari  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $x'_0 < x_0$  nöqtəsi var ki,  $M_0 - \varepsilon < f(x'_0) \leq M_0$  bərabərsizliyi ödənilir.  $f(x)$  funksiyası azalmayan olduğundan  $x$ -in  $x'_0 < x < x_0$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində də həmin  $M_0 - \varepsilon < f(x) \leq M_0$  bərabərsizliyi doğru olar. Buradan görünür ki,  $M_0 = f(x_0 - 0)$  və  $M_0 = f(x_0 - 0) \leq f(x_0)$  (1) münasibəti doğrudur.

Eyni mühakimə ilə göstərmək olar ki,  $f(x)$  funksiyasının  $x_0$  nöqtəsində sağ limiti də var və

$$f(x_0) \leq f(x_0 + 0) \quad (2)$$

münasibəti ödənilir. (1) və (2) bərabərsizliklərindən

$$f(x_0 - 0) \leq f(x_0) \leq f(x_0 + 0)$$

(3)

Deməli, istənilən  $x_0$  nöqtəsində ya

$f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$  (bu halda,  $f(x)$  funksiyası  $x_0$  nöqtəsində kəsilməyəndir), ya da  $f(x_0 - 0) < f(x_0 + 0)$  olar, bu isə  $x_0$  nöqtəsinin  $f(x)$ -in birinci növ kəsilmə nöqtəsi olduğunu göstərir.

**Teorem 2.**  $[a, b]$  parçasında ((a,b) intervalında) monoton artan (və ya azalan)  $f(x)$  funksiyasının qiymətləri  $[c, d]$  parçasını (ya da (c,d) intervalını) əmələgətirir-

sə, onda  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında **((a,b) intervalında) kəsilməyandır.**

**İsbatı.** Əksini fərz edək. Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası bir  $x_0 \in [a, b]$  nöqtəsində kəsilir. Əvvəlki teoremə görə bu ancaq birinci növ kəsilmə nöqtəsi ola bilər. Bu halda  $x_0$  nöqtəsində ya  $f(x_0-0) < f(x_0)$ , ya da  $f(x_0) < f(x_0+0)$  münasibəti ödənilməlidir. Tutaq ki, birinci bərabərsizlik ödənilir (ikinci ödənildikdə də eyni mühakimə aparılır). Onda  $x < x_0$  olduqda  $f(x) \leq f(x_0-0)$  və  $x > x_0$  olduqda  $f(x) > f(x_0)$  bərabərsizliyi ödənildiyindən,  $f(x)$  funksiyası  $f(x_0-0)$  ilə  $f(x_0)$  arasında yerləşən  $y_0 \in [c, d]$  qiymətini heç yerdə ala bilməz. Bu isə  $f(x)$  funksiyası qiymətlərinin  $[c, d]$  parçasını təşkil etməsi şərtinə ziddir, yəni  $f(x)$ -in  $[a, b]$ -də heç bir kəsilmə nöqtəsi yoxdur.

## 9.2.Sadə elementar funksiyaların kəsilməzliyi

1)  $y = a^x$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) üstlü funksiyası hər bir nöqtədə kəsilməzdir. Bunun isbatını vermirik.

2)  $y = \log_a x$ ,  $x \in \mathbf{R}_+ = (0, \infty)$ ,  $a > 0, a \neq 1$ , **loqarifmik funksiyası**  $\mathbf{R}$ -də təyin edilmiş və ciddi monoton ( $a > 1$  olduqda monoton artan,  $0 < a < 1$  olduqda isə monoton azalan)  $u(x) = a^x$  üstlü funksiyasına tərs funksiya olduğundan 2-nin 6-cı teoreminə görə  $\mathbf{R}_+$ -də kəsilməzdir.

3) Qüvvət funksiyasına baxaq:

$$y = x^\alpha, \quad x \in \mathbf{R}_+, \quad \alpha \in \mathbf{R}.$$

Bu funksiyanı aşağıdakı kimi göstərmək olar:

$$y = a^{a \log_a x}, \quad a > 1.$$

Həm  $y=a^t$  və həm də  $t=\alpha \log_a x$  funksiyası kəsilməz olduğuna görə  $y = a^{\alpha \log_a x}$  mürəkkəb funksiyası da, yəni baxdığımız  $y=x^{\alpha}$  funksiyası da kəsilməz olur.

4)  $y=\sin x$  funksiyasının kəsilməz olduğunu isbat edək. Bunun üçün  $|\sin x - \sin x_0|$  fərqlərini qiymətləndirək:

$$|\sin x - \sin x_0| = \left| 2 \sin \frac{x-x_0}{2} \cos \frac{x+x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \quad (1)$$

Məlum teoremə görə

$$|\sin x| < |x|, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

bərabərsizliyi alınır. Onda (1) bərabərsizliyindən alırıq ki,

$$0 \leq |\sin x - \sin x_0| < 2 \cdot \left| \frac{x-x_0}{2} \right| = |x - x_0|$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |x - x_0| = 0 \quad \text{olduğundan}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} |\sin x - \sin x_0| = 0,$$

Yəni,  $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$  olur.

5)  $y=\cos x$  funksiyası da hər bir  $x \in \mathbb{R}$  nöqtəsində kəsilməzdir. Onun kəsilməz olması  $\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$  düsturundan və 2-nin 7-ci teoremindən alınır.

6)  $\operatorname{tg} x$  və  $\operatorname{ctg} x$  triqonometrik funksiyaları təyin oblastlarının hər bir nöqtəsində kəsilməzdir. Bu funksiyaların kəsilməzliyi iki kəsilməz funksiyanın nisbətinin kəsilməzliyi haqqında olan teoremdən alınır.

7) 2- nin 6-cı teoremindən  $\arcsin x$ ,  $x \in [-1, 1]$ ,  $\arccos x$ ,  $x \in [-1, 1]$   $\arctg x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\operatorname{arcctg} x$ ,  $x \in \mathbb{R}$  funksiyalarının kəsilməzliyi alınır.

**Misal 1.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x-4}.$$

**Həlli.** Bu misalda nisbətın limiti haqqında teoremi bilavasitə tətbiq etmək olmaz, çünki həm sürətin və həm də məxrəcin limiti sıfıra bərabərdir.  $y = \sqrt{x+5}$  əvəzləməsi aparaq. Onda limitdə dəyişənin əvəz edilməsi düsturuna əsasən

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x+5} - 3}{x - 4} = \lim_{y \rightarrow 3} \frac{y - 3}{y^2 - 9} = \lim_{y \rightarrow 3} \frac{y - 3}{(y - 3)(y + 3)} = \lim_{y \rightarrow 3} \frac{1}{y + 3} = \frac{1}{6}$$

olur.

**Misal 2.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow 4} \left( \operatorname{tg} \frac{\pi}{x} + 2^x \cos \pi x \right).$$

**Həlli.**  $\operatorname{tg} \frac{\pi}{x}$ ,  $2^x$  və  $\cos \pi x$  funksiyaları  $x=4$  nöqtəsində kəsilməz olduğu üçün

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \operatorname{tg} \frac{\pi}{x} &= \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \\ &= 1, \quad \lim_{x \rightarrow 4} 2^x = 2^4 \\ &= 16 \quad \lim_{x \rightarrow 4} \cos \pi x = \cos 4\pi = 1 \end{aligned}$$

olur. Onda cəmin və hasilin limiti haqqında teoremlərə əsasən

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \left( \operatorname{tg} \frac{\pi}{x} + 2^x \cos \pi x \right) &= \lim_{x \rightarrow 4} \operatorname{tg} \frac{\pi}{x} + \lim_{x \rightarrow 4} 2^x \cdot \lim_{x \rightarrow 4} \cos \pi x = \\ &= 1 + 16 \cdot 1 = 17 \end{aligned}$$

### 9.3.1. Funksiyaların müntəzəm kəsilməzliyi

Tutaq ki,  $y=f(x)$  funksiyası  $X$  çoxluğunda təyin olunmuşdur. Funksiyanın  $X$  çoxluğunda kəsilməyən olması o deməkdir ki,  $f(x)$  funksiyası bu çoxluğun hər bir  $x_0 \in X$  nöqtəsində kəsilməyəndir, yəni verilmiş ixti-



yarı  $\varepsilon > 0$  ədədinə qarşı elə  $\delta > 0$  var ki,  $x$ -in  $|x - x_0| < \delta$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində  $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$  bərabərsizliyi ödənilir.

Aydındır ki, bu tətirdə verilmiş  $\varepsilon$ -na görə seçilən  $\delta > 0$  ədədi təkcə  $\varepsilon$ -dan deyil, baxılan  $x_0$  nöqtəsindən də asılıdır:  $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$   $\varepsilon$  ədədi verildikdə bir  $x_0$  nöqtəsi üçün seçilən  $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$  ədədi başqa  $x_0'$  nöqtəsi üçün seçilən  $\delta' = \delta'(\varepsilon, x_0')$  ədədindən fərqli ola bilər. Bu zaman  $x_0$  nöqtəsi üçün seçilmiş  $\varepsilon > 0$  ədədi  $x_0'$  nöqtəsi üçün yaramaz. Ümumiyyətlə, verilmiş  $\varepsilon > 0$  ədədi sabit saxlanıldıqda  $x_0$ -in dəyişməsi ilə seçilən  $\delta = \delta(\varepsilon, x_0)$  ədədi də dəyişilir.

Burada iki hal mümkündür: ya eyni bir  $\varepsilon > 0$  ədədi və  $X$  çoxluğunun bütün nöqtələri üçün yarayan bir  $\delta$  ədədi seçmək mümkündür, yaxud da  $\varepsilon > 0$  ədədi verildikdə (bütün nöqtələr üçün eyni olan)  $X$  çoxluğunun bütün nöqtələri üçün yarayan bir  $\delta$  ədədi seçmək mümkün deyildir. Birinci halda  $f(x)$  funksiyasına  $X$  çoxluğunda müntəzəm kəsilməyən funksiya deyilir.

**Tərif.**  $y=f(x)$  funksiyasına  $X$  çoxluğunda o zaman müntəzəm kəsilməyən funksiya deyilir ki, verilmiş ixtiyari  $\varepsilon > 0$  ədədinə qarşı elə  $\delta > 0$  ədədi (çoxluğun nöqtələrindən asılı olmayan) var ki,  $x$ -in  $|x' - x''| < \delta$  bərabərsizliyini ödəyən ixtiyari  $x', x''$  qiymətlərində  $|f(x') - f(x'')| < \varepsilon$  bərabərsizliyi ödənilir.

Beləliklə, funksiyanın kəsilməzliyi onu nöqtədə xarakterizə etdiyi halda, müntəzəm kəsilməzliyi funksiyanı bütün  $X$  çoxluğu üzərində xarakterizə edir.

### 9.3.2. Kantor teoremi

Aydındır ki,  $f(x)$  funksiyası  $X$  çoxluğunda müntəzəm kəsilməyən olduqda həmin çoxluğun hər bir nöqtəsində də kəsilməyən olar, yəni  $X$  çoxluğunda kəsilməyən olar. Lakin bu təklifin tərsi doğru deyildir:  $X$  çoxluğunda kəsilməyən  $f(x)$  funksiyası həmin çoxluqda müntəzəm kəsilməyən olmaya da bilər.

**Teorem (Kantor teoremi). Parçada kəsilməyən funksiya həmin parçada müntəzəm kəsilməyəndir.**

Deməli, funksiyanın parçada kəsilməzliyi anlayışı ilə parçada müntəzəm kəsilməzliyi anlayışı eynidir. Lakin bu xassə interval və yarıminterval üçün doğru deyildir.

Məsələn,  $f(x) = \frac{1}{x}$  funksiyası  $(0,1)$  intervalında kəsilməyəndir, lakin həmin intervalda müntəzəm kəsilməyən deyildir (yoxlamalı).

# X FƏSİL. TÖRƏMƏ.DİFERENSİAL.TÖRƏMƏNİN TƏTBİQLƏRİ.

## 10.1.Funksiyanın törəməsi

**Tərif.** Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası  $(a,b)$  intervalında təyin olunmuşdur və  $x_0$  intervalın müəyyən bir nöqtəsidir. Əgər

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

limiti varsa, bu limit  $f(x)$  funksiyasının  $x_0$  nöqtəsində **törəməsi** adlanır.

Funksiyanın törəməsini

$$f'(x_0), y', \frac{df(x_0)}{dx}, \frac{dy}{dx} \text{ və ya } y_x'$$

kimi işarə edirlər.

Müəyyən bir nöqtədə törəməsi olan funksiya həmin nöqtədə **diferensiallanan funksiya** adlanır.  $(a,b)$  intervalının hər bir nöqtəsində törəməsi olan funksiya isə bu intervalda **diferensiallanan funksiya** adlanır.

$\Delta x = x - x_0$  fərqi arqumentin artımı,

$$\Delta y = \Delta f(x_0) = f(x) - f(x_0)$$

fərqi isə funksiyanın  $x_0$  nöqtəsində **artımı** adlanır. Bunları nəzərə alaraq  $y=f(x)$  funksiyasının  $x_0$  nöqtəsində törəməsini

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x_0)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \end{aligned}$$

kimi də yazıla bilər.

$x_0$  nöqtəsi  $(a, b)$  intervalının ixtiyari nöqtəsi olduğundan onun əvəzinə, ümumiyyətlə  $x$  yazırlar. Onda  $y=f(x)$  funksiyasının  $x$  nöqtəsində törəməsi

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

düsturu şəklində yazılır.

**Misal 1.**  $f(x)=C$ ,  $x \in \mathbb{R}$  ( $C$ - müəyyən bir sabit ədəddir) funksiyasının törəməsini tapmalı.

**Həlli.**

$$f'(x) = (C)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{C - C}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Deməli, sabitin törəməsi sıfıra bərabərdir, yəni  $(C)'=0$ .

**Misal 2.**  $f(x) = ax + b$ ,  $x \in \mathbb{R}$  funksiyasının törəməsini tapmalı.

$$\begin{aligned} \text{Həlli. } f'(x) = (ax + b)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{a(x + \Delta x) + b - (ax + b)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a = a, \\ &\quad (ax+b)'=a \end{aligned}$$

**Misal 3.**  $f(x) = x^2$ ,  $x \in \mathbb{R}$  funksiyasının törəməsini tapmalı.

$$\begin{aligned} \text{Həlli. } f'(x) = (x^2)' &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} = \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x+\Delta x)^2-x^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \\ &+ \Delta x) = 2x, (x^2)'=2x. \end{aligned}$$

## 10.2. Törəmənin fiziki və həndəsi mənası. Bucaq əmsalı

Tutaq ki, hər hansı cisim düzxətli dəyişənsürətli hərəkət edir. Bu cismin  $t$  zamanda getdiyi yol  $s(t)$ ,  $t+\Delta t$  zamanda getdiyi yol isə  $s(t+\Delta t)$  olarsa, onun  $\Delta t$  zamanda getdiyi yol  $\Delta s = s(t + \Delta t) - s(t)$  olar. Bu halda

$$\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

nisbəti cismin  $t$  anındakı  $t+\Delta t$  anına qədər olan müddətdə **orta sürəti** adlanır. Orta sürət cismin dəyişənsürətli hərəkətini tam xarakterizə edə bilmir. Ona görə də **ani sürət** anlayışı verilir.  $\Delta t$  müddəti nə qədər kiçik olsa, orta sürət də zamanın  $t$  anındakı sürətə bir o qədər yaxın olar. Odur ki,  $\Delta t \rightarrow 0$ -da orta sürətin

$$v(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t}$$

limitinə cismin  $t$  anındakı **ani sürəti** deyilir. Törəmənin tərifinə görə

$$v(t) = s'(t)$$

olur. Deməli, zamanın  $t$  anındakı ani sürəti gedilən yolun zamana görə törəməsinə bərabərdir.

Dəyişənsürətli hərəkətdə sürət zamandan asılı müəyyən bir  $v(t)$  funksiyası olur. Bu halda

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t}$$

nisbətinə **orta təcil**,


$$a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t + \Delta t) - v(t)}{\Delta t}$$

limitinə isə  $t$  **anındakı təcili** deyilir. Beləliklə, təcil sürətin zamana görə törəməsinə bərabərdir.

İndi də törəmənin həndəsi mənasını izah edək. Tutaq ki,  $(k)$  əyrisi  $(a,b)$  intervalında təyin edilmiş  $y=f(x)$  kəsilməz funksiyasının qrafikidir (şəkil 1). Bu əyri zərində  $M_0(x_0, y_0)$ ,  $M_1(x_1, y_1)$  nöqtələri götürək və bu nöqtələrdən  $M_0$   $M_1$  kəsənini keçirək. Onun bucaq əmsalı

$$\operatorname{tg}\varphi = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

olur.



Şəkil 1.

Tutaq ki,  $x \rightarrow x_0$ . Onda  $f(x)$  funksiyası kəsilməz olduğundan  $f(x) \rightarrow f(x_0)$ , başqa sözlə  $M_0$  nöqtəsi  $M_1$  nöqtəsinə yaxınlaşır. Əgər  $f(x)$  funksiyası  $x_0$  nöqtəsində differensiallandırsa, onda

$$\operatorname{tg}\alpha = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \operatorname{tg}\varphi = \lim_{x_1 \rightarrow x_0} \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} = f'(x_0)$$

limiti var. Ona görə də  $M_0M_1$  kəsənin  $M_0M$  limit vəziyyəti var və ona  $(k)$  əyrisinin  $M_0$  nöqtəsində **toxunanı** deyirlər. Deməli  $f(x)$  funksiyasının  $x_0$  nöqtəsində törəməsi varsa, onda  $M_0(x_0, f(x_0))$  nöqtəsində onun qrafikinə **bucaq əmsalı**  $f'(x_0)$  olan **toxunan** var. Bu deyilənlərdən törəmənin həndəsi mənası çıxır:  $f(x)$  funksiyasının  $x=x_0$  nöqtəsində törəməsi  $M_0(x_0, f(x_0))$  nöqtəsində onun qrafikinə çəkilmiş toxunanın bucaq əmsalına bərabərdir.

### 10.3. Funksiyanın kəsilməzliyi ilə diferensiallanan olmasının əlaqəsi

**Teorem.**  $x$  nöqtəsində diferensiallanan  $f(x)$  funksiyası əmin nöqtədə kəsilməzdir.

Teoremin şərtinə görə

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x)$$

sonlu limiti var. Bu halda məlumdur ki,

$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = f'(x) + \alpha(x), \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha(x) = 0.$$

Buradan,

$$f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x + \alpha(x)\Delta x$$

bərabərliyini alırıq. Bu bərabərlikdə  $\Delta x \rightarrow 0$  – da limitə keçsək

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x + \Delta x) - f(x)] = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f'(x)\Delta x + \alpha(x)\Delta x] = 0$$

olar. Bu isə funksiyanın  $x$  nöqtəsində kəsilməz olması deməkdir.

Qeyd edək ki, kəsilməzlik diferensiallanma üçün ancaq zəruri şərtidir. Başqa sözlə, funksiyanın müəyyən bir nöqtədə kəsilməz olmasından həmin nöqtədə diferensiallanan olması çıxır.

**Misal.**  $f(x) = |x|$  funksiyasının törəməsini tapın.

**Həlli.**

$$f(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$$

Bu funksiya hər bir nöqtədə kəsilməzdir və

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$$

Bu funksiyanın  $x=0$  nöqtəsində törəməsi yoxdur.

Doğurdanda,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} &= \lim_{x \rightarrow -0} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow -0} (-1) = -1, \\ \lim_{x \rightarrow +0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} &= \lim_{x \rightarrow +0} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow +0} (1) = 1. \end{aligned}$$

Deməli,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

limiti yoxdur. Bu misal onu göstərir ki, müəyyən bir nöqtədə kəsilməz olan funksiya həmin nöqtədə diferensiallanan olmaya bilər.

### 10.4.1. Cəmin, hasilin və nisbətənin törəməsi

**Teorem 1.**  $x=x_0$  nöqtəsində diferensiallanan  $u(x)$  və  $v(x)$  funksiyaalarının cəmi də həmin nöqtədə diferensiallandıdır və

$$(u(x) + v(x))'_{x=x_0} = u'(x_0) + v'(x_0)$$

$u(x)$  və  $v(x)$  funksiyaalarının cəmini  $f(x)=u(x)+v(x)$  ilə işarə edək. Törəmənin tərifinə görə  $f'(x_0) =$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(u(x)+v(x))-(u(x_0)+v(x_0))}{x-x_0} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[ \frac{u(x)-u(x_0)}{x-x_0} + \frac{v(x)-v(x_0)}{x-x_0} \right]. \end{aligned}$$

Buradan, cəmin limiti haqqında teoremə görə

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)-u(x_0)}{x-x_0} + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v(x)-v(x_0)}{x-x_0} = u'(x_0) + v'(x_0).$$

və ya



$$(\mathbf{u}(\mathbf{x}) + \mathbf{v}(\mathbf{x}))'_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = \mathbf{u}'(\mathbf{x}_0) + \mathbf{v}'(\mathbf{x}_0)$$

düsturunu alırıq.

Analoji qayda ilə isbat edilir ki, sonlu sayda diferensiallanan funksiyaların cəminin törəməsi onların törəmələrinin cəminə bərabərdir.

**Teorem 2.**  $\mathbf{x}=\mathbf{x}_0$  nöqtəsində diferensiallanan  $u(\mathbf{x})$  və  $v(\mathbf{x})$  funksiyalarının hasili və həmin nöqtədə diferensiallanandır və

$$(\mathbf{u}(\mathbf{x})\mathbf{v}(\mathbf{x}))'_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = \mathbf{u}'(\mathbf{x}_0)\mathbf{v}(\mathbf{x}_0) + \mathbf{u}(\mathbf{x}_0)\mathbf{v}'(\mathbf{x}_0).$$

$u(\mathbf{x})$  və  $v(\mathbf{x})$  funksiyalarının hasilini  $f(\mathbf{x})=u(\mathbf{x})v(\mathbf{x})$  ilə işarə edək. Törəmənin tərifinə

$$\begin{aligned} f'(\mathbf{x}_0) &= (\mathbf{u}(\mathbf{x})\mathbf{v}(\mathbf{x}))'_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{f(\mathbf{x})-f(\mathbf{x}_0)}{\mathbf{x}-\mathbf{x}_0} = \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{u(\mathbf{x})v(\mathbf{x})-u(\mathbf{x}_0)v(\mathbf{x}_0)}{\mathbf{x}-\mathbf{x}_0} = \\ &= \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \left[ \frac{u(\mathbf{x})-u(\mathbf{x}_0)}{\mathbf{x}-\mathbf{x}_0} v(\mathbf{x}_0) + u(\mathbf{x}_0) \frac{v(\mathbf{x})-v(\mathbf{x}_0)}{\mathbf{x}-\mathbf{x}_0} \right]. \end{aligned}$$

Cəmin və hasilin limiti haqqındakı teoremlərə görə buradan  $(\mathbf{u}(\mathbf{x})\mathbf{v}(\mathbf{x}))'_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = \mathbf{v}(\mathbf{x}_0) \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} \frac{u(\mathbf{x})-u(\mathbf{x}_0)}{\mathbf{x}-\mathbf{x}_0} + \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0} u(\mathbf{x}_0) \frac{v(\mathbf{x})-v(\mathbf{x}_0)}{\mathbf{x}-\mathbf{x}_0} = \mathbf{u}'(\mathbf{x}_0)\mathbf{v}(\mathbf{x}_0) + \mathbf{u}(\mathbf{x}_0)\mathbf{v}'(\mathbf{x}_0)$  münasibəti alınır.

**Nəticə.**  $u(\mathbf{x})$ ,  $v(\mathbf{x})$  funksiyaları diferensiallandırsa  $\lambda$ ,  $\mu$  sabit ədədlədirsə,

$$(\lambda u(\mathbf{x}) + \mu v(\mathbf{x}))' = \lambda u'(\mathbf{x}) + \mu v'(\mathbf{x}).$$

Bu düstur yuxarıda isbat edilən iki teoremdən və sabitin törəməsinin sıfır olması faktından alınır.

**Teorem 3.**  $\mathbf{x}=\mathbf{x}_0$  nöqtəsində diferensiallanan  $u(\mathbf{x})$  və  $v(\mathbf{x})$  funksiyalarının nisbəti  $v(\mathbf{x}_0) \neq 0$  olduqda həmin nöqtədə diferensiallanandır və

$$\left( \frac{u(\mathbf{x})}{v(\mathbf{x})} \right)'_{\mathbf{x}=\mathbf{x}_0} = \frac{u'(\mathbf{x}_0)v(\mathbf{x}_0) - u(\mathbf{x}_0)v'(\mathbf{x}_0)}{v^2(\mathbf{x}_0)}$$

$u(x)$  və  $v(x)$  funksiyalarının nisbətini  $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$  ilə işarə edək. Törəmənin tərifinə görə

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x)v(x_0) - u(x_0)v(x)}{v(x)v(x_0)(x - x_0)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow x_0} \left[ \frac{1}{v(x)v(x_0)} \cdot \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} v(x_0) \right. \\ &\quad \left. - \frac{1}{v(x)v(x_0)} \cdot \frac{v(x) - v(x_0)}{x - x_0} \cdot u(x_0) \right] \end{aligned}$$

Cəmin və hasilin limiti haqqındakı teoremlərə görə

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{v(x_0)}{v^2(x_0)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} - \frac{u(x_0)}{v^2(x_0)} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v(x) - v(x_0)}{x - x_0} = \\ &= \frac{u'(x_0)v(x_0) - u(x_0)v'(x_0)}{v^2(x_0)} \end{aligned}$$

və ya

$$\left( \frac{u(x)}{v(x)} \right)'_{x=x_0} = \frac{u'(x_0)v(x_0) - u(x_0)v'(x_0)}{v^2(x_0)}$$

düsturalınır.

**Misal .** Törəmələritapın:

$$\begin{aligned} \text{a)} & (x^2 - 5x + 9)' = (x^2)' + (-5x)' + (9)' = 2x - 5. \quad \text{b)} (2x^3 - x^2 + 3)' = \\ & (2x^3)' - (x^2)' + (3)' = 2(x^2 \cdot x)' - 2x = 2((x^2)'x + x^2 \cdot (x)') - 2x = \\ & 2(2x^2 + x^2) - 2x = 6x^2 - 2x. \\ \text{c)} & \left( \frac{x+6}{1-x} \right)' = \frac{(x+6)'(1-x) - (x+6)(1-x)'}{(1-x)^2} = \frac{1-x - (x+6)(-1)}{(1-x)^2} = \frac{7}{(1-x)^2}. \end{aligned}$$

### 10.4.2. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi

Tutaq ki,  $y = \varphi(z)$  və  $z = \psi(x)$  funksiyaları verilmişdir.  $y = \varphi[\psi(x)]$  mürəkkəb funksiyanın törəməsi haqqında aşağıdakı teorem doğrudur.

**Teorem.**  $z = \psi(x)$  funksiyası  $x_0$  nöqtəsində,  $y = \varphi(z)$  funksiyası isə  $z_0 = \psi(x_0)$  nöqtəsində diferensiallandırsa,  $y = \varphi[\psi(x)]$  mürəkkəb funksiyası da  $x_0$  nöqtəsində diferensiallandıdır və

$$(\varphi[\psi(x)])'_{x=x_0} = \varphi'(z_0)\psi'(x_0). \quad (1)$$

**İsbatı.** Törəmənin tərifinə görə

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{\varphi(z) - \varphi(z_0)}{z - z_0} = \varphi'(z_0).$$

Buradan

$$\frac{\varphi(z) - \varphi(z_0)}{z - z_0} = \varphi'(z_0) + \alpha(z), \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \alpha(z) = 0$$

və ya

$$\begin{aligned} \varphi(z) - \varphi(z_0) &= \varphi'(z_0)(z - z_0) + \alpha(z) \cdot (z - z_0), \\ \varphi(\psi(x)) - \varphi(\psi(x_0)) &= \varphi'(z_0)(\psi(x) - \psi(x_0)) + \\ &+ \alpha(\psi(x)) \cdot (\psi(x) - \psi(x_0)) \end{aligned}$$

bərabərliklərini alırıq. Axırncı bərabərliyin hər tərəfini  $(x - x_0) - a$  bölüb  $x \rightarrow x_0 - da$  limitə keçsək

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\varphi(\psi(x)) - \varphi(\psi(x_0))}{x - x_0} &= \varphi'(z_0) \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(\psi(x) - \psi(x_0))}{x - x_0} \\ &+ \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\psi(x) - \psi(x_0)}{x - x_0} \alpha(\psi(x)) \end{aligned} \quad (2)$$

düsturunu alırıq. Limitdə dəyişənin əvəz edilməsi düsturuna görə

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(\psi(x)) = \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(z) = 0 \quad (3)$$

olur. (2) və (3) münasibətlərindən

$$(\varphi[\psi(x)])'_{x=x_0} = \varphi'(z_0)\psi'(x_0) \quad (4)$$

bərabərliyi alınır.

(1) düsturunu aşağıdakı kimi də yazı bilərik:

$$y'_x = y'_z \cdot z'_x.$$

**Misal 1.**  $f(x) = (x^2 + 3x + 5)^2$  funksiyanın törəməsini tapın.

**Həlli.** Verilən funksiya  $y=z^2$  və  $z=x^2+3x+5$  funksiyalarından düzəldilmiş mürəkkəb funksiyaadır. (4) düsturuna görə

$$f'(x) = y'_z \cdot z'_x = (z^2)'(x^2 + 3x + 5)' = 2z(2x + 3) = 2(x^2 + 3x + 5)(2x + 3)$$

**Misal 2.**  $f(x) = \left(\frac{x^2-3}{1-x}\right)^3$  funksiyanın törəməsini tapın.

**Həlli.** Verilən funksiya  $y = z^3$  və  $z = \frac{x^2-3}{1-x}$  funksiyalarından düzəldilmiş mürəkkəb funksiyaadır. (4) düsturuna görə

$$y'_x = y'_z \cdot z'_x = (z^3)' \cdot \left(\frac{x^2-3}{1-x}\right)' = 3z^2 \frac{2x(1-x) + (x^2-3)(-1)}{(1-x)^2} = \frac{3(x^2-3)^2}{(1-x)^2} \cdot \frac{-x^2+2x-3}{(1-x)^2} = \frac{3(x^2-3)^2(x^2-2x+3)}{(1-x)^4}$$

### 10.4.3. Tərs funksiyanın törəməsi.

**Teorem.**  $y=f(x)$  funksiyanın  $x_0$  nöqtəsində sıfırdan fərqli törəməsi varsa, onda  $x = \varphi(y)$  funksiyanın  $y_0=f(x_0)$  nöqtəsində törəməsi var və

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}. \quad (1)$$

**İsbatı.** Törəmənin tərifinə görə

$$\varphi'(y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{\varphi(y) - \varphi(y_0)}{y - y_0}$$

Digər tərəfdən  $\varphi(y) = x$  və  $\varphi(y_0) = x_0$  olduğuna görə

$$\varphi'(y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} \quad (2)$$

olur. Məlumdur ki, kəsilməz funksiya tərs funksiya da kəsilməzdir. Ona görə də

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = \varphi(y_0).$$

Başqa sözlə,  $y \rightarrow y_0$  da  $x \rightarrow x_0$ . Bunu nəzərə alaraq (2) bərabərliyindən

$$\varphi'(y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}}$$

və ya

$$\varphi'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

düsturunu alırıq. (1) düsturunu

$$x'_y = \frac{1}{y'_x} \quad (3)$$

şəklində də yazmaq olar.

**Misal.**  $y = \sqrt{x}$ ,  $x > 0$  funksiyanın törəməsini tapın. Verilən funksiya  $x = y^2$  funksiyanın tərs funksiyasıdır.

(3) düsturuna görə

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{(y^2)'} = \frac{1}{2y} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

## 10.5. Parametrik şəkildə verilmiş funksiyanın törəməsi

Funksiyanı  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$ ,  $a \leq t \leq b$  kimi iki tənlik vasitəsilə də vermək olar. Bu halda deyirlər ki, funksiya parametrik şəkildə verilmişdir.

Tutaq ki,  $x = \varphi(t)$  funksiyanın tərs funksiyası var:  $t = g(x)$ . Onda

$$y = \psi(g(x)) \quad (1)$$

mürəkkəb funksiyanı alırıq.

**Misal 1.**  $y = (x-1)^2$  funksiyanı  
 $x = t+1$  və  $y = t^2$

parametrik şəkildə vermək olar.

(1) mürəkkəb funksiyanın törəməsinin tapılma qaydasını biz artıq bilirik, lakin parametrik şəkildə verilmiş funksiyanı heç də həmişə (1) mürəkkəb funksiya şəklində göstərə bilmirik.

Parametrik şəkildə verilmiş funksiyanın törəməsi haqqında aşağıdakı teorem doğrudur:

**Teorem.**  $\varphi(t)$ ,  $\psi(t)$  funksiyaları diferensiallanan-dırsa və  $\varphi'(t) \neq 0$  olarsa,  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$  parametrik şəkildə verilmiş funksiyanın törəməsi üçün

$$y'_x = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \text{ və ya } y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

düsturu doğrudur.

Teoremin şərtinə görə  $\varphi'(t) \neq 0$ . Ona görə  $x = \varphi(t)$  ciddi monoton funksiya və  $x = \varphi(t)$  funksiyanın tərs funksiyası  $t = g(x)$  ilə işarə edək. Müəkkəb funksiyanın törəməsi haqqındaki teoremə görə

$$y'_x = (\psi[g(x)])'_x = \psi'(t)g'(x) \quad (2)$$

olur. Digər tərəfdən tərs funksiyanın törəməsinin tapılması qaydasına görə

$$g'(x) = \frac{1}{\varphi'(t)} \quad (3)$$

bərabərliyi doğrudur. (2) və (3) münasibətlərindən

$$y'_x = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \text{ və ya } y'_x = \frac{y'_t}{x'_t}$$

düsturunu alırıq.

**Misal 1.**  $x=2t-4$ ,  $y=t^2+1$ ,  $t \in \mathbb{R}$  funksiyanın törəməsini tapın:

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{(t^2+1)'}{(2t-4)'} = \frac{2t}{2} = t.$$

$x=2t-4$  tənliyindən  $t$ -ni  $x$ -lə ifadə edib verilən funksiyanın törəməsini

$$y'_x = \frac{x+4}{2}$$

kimi  $x$ -dən asılı şəkildə yazıla bilər.

**Misal 2.**  $x=t^4+3t^3-t+5$ ,  $y=t^2+t-1$ ,  $t \in \mathbb{R}$  funksiyanın törəməsini tapın:

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{(t^4+3t^3-t+5)'}{(t^2+t-1)'} = \frac{4t^3+9t^2-1}{2t+1}.$$

## XI FƏSİL. FUNKSIYALARIN TÖRƏMƏLƏRİ

### 11.1. Əsas elementar funksiyaların törəməsi

#### 11.1.1. Loqarifmik funksiyanın törəməsi

$y = \log_a x$ ,  $x \in R$  ( $a > 0$ ,  $a \neq 1$ ) funksiyanın törəməsini tapaq.

Argumentə  $\Delta x$  artımı verək:  $x + \Delta x$ . Bu zaman loqarifmik funksiyanın artımı

$$\Delta y = \log_a(x + \Delta x) - \log_a x$$

və ya

$$\Delta y = \log_a\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)$$

olar. Bu bərabərliyin hər tərəfini  $\Delta x$ -ə bölüb

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{\Delta x} \log_a\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right)$$

düsturunu alırıq.  $\frac{\Delta x}{x} = \alpha$  ilə əvəz, budüstur

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x} \cdot \log_a(1 + \alpha)^\alpha \quad (1)$$

şəklini alır. (1) bərabərliyində  $\Delta x \rightarrow 0$  şərt ilə limitə keçsək və bu zaman  $\alpha \rightarrow 0$  olduğunu nəzərə alsaq

$$y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{x} \lim_{\alpha \rightarrow 0} \log_a(1 + \alpha)^\alpha$$



münasibətini alırıq. Loqarifmik funksiya kəsilməz funksiya olduğundan  $y' = \frac{1}{x} \lim_{\alpha \rightarrow 0} \log_{\alpha} \left[ (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} \right]$

(2)

olar.  $\lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 + \alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = e$  olduğuna görə (2) bərabərliyindən

$$y' = \frac{\log_a e}{x} \text{ və ya } (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad (\ln a = \log_e a)$$

düsturu alınır. Xüsusi halda  $a=e$  götürsək,  $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

olar.

**Misal.**  $y = \ln(x^2 + 4x + 11)$  funksiyanın törəməsini tapın:

**Həlli.**

$$y' = (\ln(x^2 + 4x + 11))' = \frac{1}{x^2 + 4x + 11} (x^2 + 4x + 11)' = \frac{2x + 4}{x^2 + 4x + 11}$$

### 11.1.2. Qüvvət funksiyanın törəməsi

$y = x^a, x \in R_+, (a \in R)$  funksiyanı  $y = e^{a \ln x}, x \in R$  kimi göstərmək olar. Bu funksiya  $y = e^z$  və  $z = a \ln x$  funksiylərindən düzəldilmiş mürəkkəb funksiya. Mürəkkəb funksiyanın törəməsi düsturuna görə

$$y' = y'_z \cdot z'_x = (e^z)' (\alpha \ln x)' = e^z \alpha \cdot \frac{1}{x} = e^{a \ln x} \alpha \cdot \frac{1}{x} = \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{x},$$

və yaxud

$$(x^{\alpha})' = \alpha x^{\alpha-1}$$

**Misal.** Aşağıdakı funksiylərin törəmələrini tapın:

a)  $y = x^2, y' = 2x^{2-1} = 2x$

$$\text{b) } y = x^{14}; y' = 14x^{14-1} = 14x^{13},$$

$$\text{v) } y = \sqrt[3]{x}; y' = (x^{\frac{1}{3}})' = \frac{1}{3}x^{\frac{1}{3}-1} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$\text{q) } y = \sqrt[7]{x^2}; y' = (x^{\frac{2}{7}})' = \frac{2}{7}x^{\frac{2}{7}-1} = \frac{2}{7\sqrt[7]{x^5}}$$

$$\text{ğ) } y = x^{0,1}; y' = (x^{0,1})' = 0,1x^{0,1-1} = 0,1x^{-0,9}$$

$$\text{d) } y = 3x^5 + x^3; y' = 3(x^5)' + (x^3)' = 15x^4 + 3x^2$$

$$\text{e) } y = x^4 + \frac{1}{\sqrt{x}}; y' = (x^4)' + (x^{-\frac{1}{2}})' = 4x^3 - \frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$$

### 11.1.3. Triqonometrik funksiyların törämäsı

Əvvəlcə  $f(x)=\sin x$  funksiyanın töräməsini tapaq. Bunun üçün  $x$ -ə  $\Delta x$  artımı verib, funksiyanın uyğun artımına baxaq;

$$\Delta f(x) = \sin(x + \Delta x) - \sin x = 2 \sin \frac{\Delta x}{2} \cos \frac{2x + \Delta x}{2}$$

Bunun hər tərəfini  $\Delta x$ -ə bölsək,

$$\frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \cos \frac{2x + \Delta x}{2}$$

bərabərliyini alarıq. Burada  $\Delta x \rightarrow 0$ -dalimitə keçsək

$$f'(x) = (\sin x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \frac{2x + \Delta x}{2}$$

münasibətini alırıq. Aydındır ki,

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\Delta x}{2}}{\frac{\Delta x}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

Digər tərəfdən  $y = \cos x$  funksiyasının kəsilməz olmasını nəzərə alsaq

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \cos \frac{2x + \Delta x}{2} = \cos x \quad (1)$$

olar. Beləliklə,  $\sin x$  funksiyasının törəməsi üçün

$$(\sin x)' = \cos x$$

düsturu doğrudur.

(1) düsturundan istifadə edərək  $\cos x$  funksiyasının törəməsini tapa bilərik:

$$(\cos x)' = \left( \sin \left( \frac{\pi}{2} + x \right) \right)' = \cos \left( \frac{\pi}{2} + x \right) \cdot \left( \frac{\pi}{2} + x \right)' = \cos \left( \frac{\pi}{2} + x \right)$$

və yaxud

$$(\cos x)' = -\sin x \quad (2)$$

(1) və (2) düsturlarının köməyi ilə  $\operatorname{tg} x$  və  $\operatorname{ctg} x$  funksiyalarının törəmələrini tapaq:

$$(\operatorname{tg} x)' = \left( \frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$(\operatorname{ctg} x)' = \left( \frac{\cos x}{\sin x} \right)' = \frac{(\cos x)' \sin x - \cos x (\sin x)'}{\sin^2 x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

və ya

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, \quad (\operatorname{ctg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

**Misal.** Törəmələri hesablayın:

a)  $(\sin 5x)' = \cos 5x \cdot (5x)' = 5 \cos 5x$

$$\begin{aligned}
 \text{b)} \quad & (\cos(3x^2 + x))' = -\sin(3x^2 + x)(3x^2 + x)' = \\
 & = -(6x + 1)\sin(3x^2 + x) \\
 \text{v)} \quad & (\sin^2 2x)' = 3\sin^2 2x(\sin 2x)' = 3\sin^2 2x \cdot \cos 2x \cdot (2x)' = \\
 & = 6\sin^2 2x \cos 2x \\
 \text{q)} \quad & (tg^5(3x + 7))' = 5tg^4(3x + 7)(tg(3x + 7))' = \\
 & = 5tg^4(3x + 7) \frac{1}{\cos^2(3x + 7)} \cdot (3x + 7)' = \frac{15tg^4(3x + 7)}{\cos^2(3x + 7)}
 \end{aligned}$$

#### 11.1.4. Tərs triqonometrik funksiyaların törəməsi

##### 1. $y = \arcsin x$ funksiyasının törəməsi.

Bu funksiya  $x = \sin y$ ,  $y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  funksiyasına

tərs funksiya. Tərs funksiyanın törəməsi düsturuna görə

$$y'_x = \frac{1}{x'_y} = \frac{1}{(\sin y)'} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

və ya  $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$

##### 2. $y = \arccos x$ funksiyasının törəməsi.

$\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$  düsturunun köməyi ilə bu funksiyanın törəməsi üçün

$$(\arccos x)' = \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin x\right)' = -(\arcsin x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

və yaxud  $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$  düsturunu alırıq.

##### 3. $y = \arctg x$ funksiyasının törəməsi.

$y = \arctg x$  funksiyası  $x = tgy$ ,  $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  funksiyasına tərs funksiyadır. Tərs funksiyanın törəməsi düsturuna görə

$$y_x' = \frac{1}{x_y'} = \frac{1}{(tgy)'} = \cos^2 y = \frac{1}{1 + tg^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$$

və ya  $(\arctg x)' = \frac{1}{1 + x^2}$

#### 4. $y = \arccctg x$ funksiyasının törəməsi.

$\arctg x + \arccctg x = \frac{\pi}{2}$  düsturundan istifadə edib

$$(\arccctg x)' = -\frac{1}{1 + x^2} \text{ düsturunu alırıq.}$$

#### Misal. Törəmələri tapın.

a)  $(\arcsin x^2)' = \frac{1}{\sqrt{1 - (x^2)^2}} \cdot (x^2)' = \frac{2x}{\sqrt{1 - x^4}}$

$$((\arccos \sqrt{x})^2)' = 2 \arccos \sqrt{x} \cdot (\arccos \sqrt{x})' = 2 \arccos \sqrt{x} \times$$

b)  $\times \left( -\frac{1}{\sqrt{1 - (\sqrt{x})^2}} \cdot (\sqrt{x})' \right) = -\frac{2 \arccos \sqrt{x}}{\sqrt{1 - x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = -\frac{\arccos \sqrt{x}}{\sqrt{x(1 - x)}}$

v)  $(\arctg(x^2 + 1))' = \frac{1}{1 + (x^2 + 1)^2} \cdot (x^2 + 1)' = \frac{2x}{x^4 + 2x^2 + 2}$ ,

$$(x \cdot \arccctg x^3)' = (x)' \arccctg x^3 + x(\arccctg x^3)' = \arccctg x^3 +$$

q)  $+ x \left( -\frac{1}{1 + (x^3)^2} \right) \cdot (x^3)' = \arccctg x^3 - \frac{3x^3}{1 + x^6}$

### 11.1.5. Qeyri-aşkar funksiyanın törəməsi

Tutaq ki,  $y=y(x)$  qeyri-aşkar funksiyası

$$F(x,y)=0 \quad (1)$$

tənliyi vasitəsilə verilmişdir. Bu funksiyanın analitik ifadəsini aşkar şəkildə tapmadan onun müxtəlif tərtibli törəmələrini tapmaq bəzən mümkün olur. Bu məqsədlə (1) bərabərliyinin hər iki tərəfini  $x$ -ə görə diferensiallayırlar və  $y$  dəyişəni  $x$ -in funksiyası olduğunu nəzərə alırlar. Alınan bərabərliyi  $y'$ -ə nəzərən həll edərək  $y'$  törəməsini tapırlar. Bu prosesi davam etdirməklə funksiyanın iki, üç və  $s$ .tərtibli törəmələrini də tapmaq olar.

Bunu bir misal üzərində izah edək.

**Misal 1.**

$$ax^2 + by^2 = 2 \quad (2)$$

tənliyi ilə təyin olunan  $y=y(x)$  funksiyanının bir və ikitərtibli törəməsini tapmalı.

(2) bərabərliyinin hər iki tərəfindən  $x$ -ə nəzərən törəmə alaraq (yadda saxlayaraq ki,  $y$  dəyişəni  $x$ -in funksiyasıdır):

$$2ax + 2by \cdot y' = 0,$$

$$y' = -\frac{ax}{by} \quad (3)$$

$$y'' = -\frac{a}{b} \left(\frac{x}{y}\right)' = -\frac{a}{b} \cdot \frac{y - xy'}{y^2}$$

Burada  $y'$ -in əvəzinə (3) qiymətini yazsaq:

$$y'' = -\frac{a}{b} \cdot \frac{y - x \cdot \left(-\frac{ax}{by}\right)}{y^2} = -\frac{a}{b} \cdot \frac{by^2 + ax^2}{by^3}$$

(2) bərabərliyinə görə  $ax^2 + by^2 = 2$  olduğundan ikitərtibli törəmə üçün

$$y'' = -\frac{2a}{b^2} \cdot \frac{1}{y^3}$$

ifadəsini alarıq.

### Misal 2.

$$y^2 = 5 + xe^y \quad (4)$$

tənliyi ilə təyin olunan  $y=y(x)$  qeyri-aşkar funksiyasının törəməsini tapmalı.

(4) bərabərliyinin hər iki tərəfini  $x$ -ə nəzərən diferensiallayaq:

$$2yy' = e^y + xe^y y',$$

$$(2y - xe^y)y' = e^y,$$

$$y' = \frac{e^y}{2y - xe^y}$$

(4) bərabərliyinə görə  $xe^y = y^2 - 5$  olduğundan:

$$y' = \frac{e^y}{2y - y^2 + 5}$$

## 11.2. Loqarifmik törəmə

Tutaq ki,  $u=f(x)$  funksiyası diferensiallandıdır və baxılan nöqtədə sıfır çevrilmir. Onda mürəkkəb funksiyanın

diferensiallanması qaydasına əsasən  $y = \ln|f(x)|$  funksiyasının törəməsini hesablamaq olar :

$$y' = [\ln|f(x)|]' = (\ln|u|)' \cdot u' = \frac{1}{u} \cdot u' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

və yaxud

$$[\ln|f(x)|]' = \frac{f'(x)}{f(x)}. \quad (1)$$

(1) bərabərliyinin sağ tərəfindəki  $\frac{f'(x)}{f(x)}$  kəsrinə  $f(x)$  funksiyasının **loqarifmik törəməsi** deyilir. Aydındır ki, funksiyanın loqarifmik törəməsi məlum olduqda (1) düsturu vasitəsilə özünün törəməsini tapmaq olar:

$$f'(x) = f(x) \cdot [\ln|f(x)|]' \quad (2)$$

Funksiya törəməsinin bu yolla tapılmasına **loqarifmik diferensiallanma üsulu** deyilir.

Loqarifmik diferensiallanma üsulu ilə funksiyaların törəməsini hesabladıqda, sadə olmaq üçün gələcəkdə modul işarəsini yazmayacağıq.

### 11.3. Yüksək tərtibli törəmələr

Əgər  $y=f(x)$  funksiyası  $(a,b)$  intervalında diferensiallanandırsa, onda  $f'(x)$  həmin intervalda təyin edilmiş bir funksiya olur:  $g(x) = f'(x)$  funksiyası  $x_0 \in (a,b)$  nöqtəsində diferensiallanandırsa,  $g'(x)$  funksiyası  $f(x)$  funksiyasının  $x_0$  nöqtəsində ikinci tərtib törəməsi adlanır və

$$f'(x_0), \quad y'', \quad \frac{d^2(f(x_0))}{dx^2} \text{ və ya } \frac{d^2y}{dx^2}$$

kimi işarə edilir.



Əgər  $f(x)$  funksiyasının  $(a,b)$  intervalının hər bir nöqtəsində ikinci tərtib törəməsi varsa, tərifi görə

$$f''(x_0) = (f'(x_0))'$$

$f(x)$  funksiyasının ikinci tərtib törəməsinin törəməsinə onun üçüncü tərtib törəməsi deyilir və

$$f'''(x_0), y''', \frac{d^3 f(x_0)}{dx^3} \text{ kimi işarə edilir.}$$

Anoloji qayda ilə dördüncü tərtib törəmə təyin edilir. Ümumiyyətlə,  $y=f(x)$  funksiyasının  $(n-1)$ -ci tərtib törəməsinin törəməsi onun  $n$ -ci tərtib törəməsi adlanır.

**Misal.**  $y = x^4 + 3x^3 - x^2 + 5x - 1$  funksiyasının birinci, ikinci, üçüncü və dördüncü tərtib törəmələrini tapın:

$$y' = 4x^3 + 9x^2 - 2x + 5,$$

$$y'' = 12x^2 + 18x - 2$$

$$y''' = 24x + 18,$$

$$y^{(iv)} = 24$$

Bəzi çox işlənən yüksək tərtibli törəmələrin tapılması düsturları aşağıdakı kimi olar.

$$1) (x^m)^{(n)} = m(m-1) \dots (m-n+1)x^{m-n},$$

$$2) (a^x)^{(n)} = a^x \ln^n a, \quad (a > 0),$$

$$3) (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \cdot \frac{(n-1)!}{x^n}, \quad (x > 0),$$

$$4) (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right),$$

$$5) (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

## XII FƏSİL. DİFERENSİALIN TƏRİFİ. ROLL TEOREMİ

### 12.1.1. Diferensialın tərifi

Əgər  $y = f(x)$  funksiyasının  $\Delta y(x_0, \Delta x)$  artımını

$$\Delta y(x_0, \Delta x) = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

şəklində göstərmək mümkündürsə, onda  $f(x)$  funksiyasına  $x_0$  nöqtəsində diferensialına bilən (törəməsi olan) **funksiya** deyilir. Artımın birinci toplananı  $\Delta x$ -ə nəzərən xətti ifadədir və ona **artımın baş hissəsi** deyilir.

**Tərif 1.** Funksiya artımının baş hissəsinə  $x_0$  nöqtəsində **funksiyanın diferensialı** deyilir və  $dy(x_0, \Delta x)$  kimi işarə olunur.

Diferensialın ifadəsi

$$dy(x_0, \Delta x) = f'(x_0)dx$$

(1)

şəklindədir. Burada  $\Delta x = dx$  və  $f'(x_0) = A$  qəbul edilmişdir.

$f'(x_0) \neq 0$  olduqda  $\Delta x \rightarrow 0$  şərtində funksiya artımı ilə onun diferensialı ekvivalent sonsuz kiçilən olur və onlar arasında

$$\Delta y \approx dy \quad (|\Delta x| \leq 1)$$

təqribi bərabərliyini yazmaq olar.

Beləliklə, funksiyanın diferensialını tapmaq üçün aşağıdakı qaydaları göstərmək olar.

**Qayda.** Diferensiallanan funksiyanın diferensialı, bu funksiyanın törəməsi ilə arqumentin diferensialı hasilinə bərabərdir.

Diferensialına bilən  $y = f(x)$  funksiyasının  $x=x_0$  nöqtəsindəki  $f(x_0 + \Delta x)$  qiymətini

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x, \quad f'(x_0) \neq 0 \quad (3)$$

(3) təqribi bərabərliyi ilə hesablamaq olar. Bu düstur təqribi hesablama üçün əlverişlidir.

### 12.1.2. Diferensialın həndəsi və mexaniki mənası. Diferensialın invariantlığı


$f(x)$  funksiyasının diferensialının həndəsi mənasını izah etmək üçün onun qrafikinə baxaq. Tutaq ki, bu funksiya  $x_0$  nöqtəsində diferensiallandıdır.  $M(x_0; f(x_0))$  nöqtəsində qrafikə  $MN$  toxunanını çəkək. Düzbucaqlı  $MKN$  üçbucağından

$$|KN| = |MK| \cdot \operatorname{tg} \alpha$$

$$|MK| = \Delta x \text{ və } \operatorname{tg} \alpha = f'(x_0) \text{ olduğunu nəzərə alsaq}$$

$$|KN| = f'(x_0) \Delta x$$

olar. Başqa sözlə,  $|KN| = df(x_0)$ . Bu bərabərlikdən diferensialın həndəsi mənası alınır:



Şəkil 1.

$x_0$  nöqtəsində diferensiallanan  $f(x)$  funksiyasının bu nöqtədə diferensialı onun qrafikinə  $M(x_0; f(x_0))$  nöqtəsində toxunanın toxunma nöqtəsinin absisi  $\Delta x$  artımı aldıqda ordinatının aldığı artımına bərabərdir.

Ümumiyyətlə,  $f(x)$  funksiyasının artımı onun diferensialına bərabər deyil ( $|KD| \neq |KN|$ ). Lakin arqumentin artımı sıfıra nə qədər yaxın olsa, funksiyanın artımı da bir qədər onun diferensialına yaxın olar. Başqa sözlə  $\Delta x$ -in sıfıra yaxın qiymətlərində

$$\Delta f(x) \approx df(x_0)$$

### **Diferensialın mexaniki mənası**

Tutaq ki, hər hansı cisim düz xətt boyunca hərəkət edir və diferensiallanan  $s=s(t)$  funksiyası onun hərəkət qanunudur. Aydınır ki, cisim  $t$  anından  $t+\Delta t$  anına qədər olan müddətdə

$$\Delta s(t) = s(t+\Delta t) - s(t)$$

qədər yol gedər. Hərəkətin  $t$  anında sürətinin  $v(t)=s'(t)$  olması məlumdur. Deməli, əgər hərəkət edən cisim bütün  $\Delta t$  zaman fasiləsində sürəti sabit olub  $t$  anındakı  $v(t)=s'(t)$  sürətinə bərabər olsa idi, onda cisim həmin müddətdə

$$ds(t) = s'(t) \cdot \Delta t \tag{1}$$

qədər məsafə getmiş olardı. Bu,  $s(t)$  funksiyası diferensialının mexaniki mənasını ifadə edir. Cisim dəyişən sürətlə hərəkət etdikdə onun  $\Delta t$  zaman fasiləsində sürəti dəyişir və bu müddətdə getdiyi  $\Delta s(t)$  məsafəsi (1) məsafəsinə bərabər olmur. Aydınır ki,  $\Delta t$  zaman fasiləsi çox kiçik olduqda

$$\Delta s(t) \approx s'(t) \cdot \Delta t$$

hesab etmək olar.

### **Diferensial şəklinin invariantlığı**

Tutaq ki,  $y = f(z)$  və  $z = \varphi(x)$  funksiyaları verilmişdir. Bilirik ki, əgər  $f(x)$  və  $\varphi(x)$  funksiyaları diferensiaslanırsa, onda bu funksiyalardan düzəldilmiş  $y = f(\varphi(x))$  mürəkkəb funksiyası da diferensiaslanandır və

$$y'_x = y'_z \cdot z'_x \quad (1)$$

$y = f(\varphi(x))$  mürəkkəb funksiyasının diferensialı  $dy = y'_x dx$  olur. (1) düsturunu burada nəzərə alsaq

$$dy = y'_z \cdot z'_x dx$$

bərabərliyini alarıq.  $z'_x dx = dz$  olduğuna görə bu bərabərlikdən

$$dy = y'_z dz$$

və ya

$$df(z) = f'(z) dz$$

düsturunu alarıq.

Beləliklə, biz gördük ki, sərbəst dəyişəni başqa bir dəyişənlə əvəz etdikdə funksiyanın diferensialı xarici görünüşünü (şəklini) dəyişmir. Bununla belə qeyd etməliyik ki,  $f(x)$  funksiyasının diferensialının ifadəsində  $z$  dəyişəninin sərbəst və ya asılı dəyişən olmasının böyük fərqi vardır. Belə ki,  $z$  sərbəst dəyişəndirsə,  $dz = \Delta z$  olur. Diferensialın bu xassəsi onun şəklinin invariantlığı adlanır.

## **12.2. Diferensialların hesablama düsturları**

Əsas elementar funksiyaların diferensiallarının hesablama düsturlarını yazmaq olar.

- I.  $d(u + v)dx = u' dx \pm v' dx = du \pm dv$
- II.  $d(u \cdot v)' dx = (u'v + v'u)dx = vdu + udv,$
- III.  $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{u'v - uv'}{v^2} dx = \frac{vdu - udv}{v^2},$
- IV.  $d(u^\alpha) = \alpha u^{\alpha-1} du \ (\alpha \in \mathbb{Z}),$
- V.  $d(a^u) = e^u \ln a du \ (0 < a \neq 1),$
- VI.  $d(e^u) = e^u du,$
- VII.  $d(\log_a u) = \frac{du}{u} \log_a e = \frac{du}{u \ln a},$
- VIII.  $d(\ln u) = \frac{du}{u},$
- IX.  $d(\sin u) = \cos u du,$
- X.  $d(\cos u) = -\sin u du.$
- XI.  $d(\operatorname{tg} u) = \frac{du}{\cos^2 u},$
- XII.  $d(\operatorname{ctg} u) = -\frac{du}{\sin^2 u},$
- XIII.  $d(\arcsin u) = \frac{du}{\sqrt{1-u^2}},$
- XIV.  $d(\arccos u) = -\frac{du}{\sqrt{1-u^2}},$
- XV.  $d(\operatorname{arctg} u) = \frac{du}{1+u^2},$
- XVI.  $d(\operatorname{arcctg} u) = -\frac{du}{1+u^2},$
- XVII.  $d(\operatorname{sh} u) = \operatorname{ch} u \cdot du,$

$$\text{XVIII. } d(chu) = shu \cdot du,$$

$$\text{XIX. } d(thu) = \frac{du}{ch^2u},$$

$$\text{XX. } d(cthu) = -\frac{du}{sh^2u},$$

$$\text{XXI. } d(\sqrt[n]{u}) = \frac{du}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$$

### 12.3. Yüksək tərtibli diferensial

Yuxarıda birtərtibli diferensiala tərif verdik. İndi tutaq ki,  $y = f(x)$  funksiyası  $x$  nöqtəsində iki dəfə diferensiallanan funksiyadır. Onda  $y = f(x)$  funksiyasının birtərtibli diferensialının diferensialına bu funksiyanın ikitərtibli diferensialı deyilir və  $d^2y$  və ya  $d^2f$  kimi işarə olunur. Başqa sözlə

$$d^2y = d(dy) = f''(x)dx^2$$

Oxşar qayda ilə üç və daha çox tərtibli diferensialı təyin etmək olar:

$$d^3y = d(d^2y) = f'''(x)dx^3$$

$$d^{n-1}y = d(d^{n-2}y) = f^{(n-1)}(x)dx^{n-1}$$

$$d^n y = d(d^{n-1}y) = f^{(n)}(x) dx^{n-1}$$

### 12.4. Diferensial hesabının əsas teoremləri

Diferensial hesabının əsas teoremləri aşağıdakılardır:

**Teorem 1 (Ferma).** Tutaq ki,  $y = f(x)$  funksiyası hər hansı aralıqda təyin olunmuşdur və bu aralıqda da-

xili  $x_0$  nöqtəsində özünün ən böyük və ya ən kiçik qiymətini alır. Əgər  $x_0$  nöqtəsində  $f'(x_0)$  törəməsi varsa, onda  $f'(x_0) = 0$  olur.

**Teorem 2 (Roll).** **Rol teoremi:**  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında kəsilməz,  $(a; b)$  intervalında diferensiaslanırsa və həmin parçanın uc nöqtələrində onun qiymətləri bərabərdirsə,  $(a; b)$  intervalına daxil olan elə bir  $c$  nöqtəsi var ki,  $f'(c) = 0$ .

**İsbatı:** Məlumdur ki,  $[a, b]$  parçasında kəsilməz olan  $f(x)$  funksiyasının bu parçada aldığı qiymətlər arasında ən böyüyü və ən kiçiyi var.  $f(x)$  funksiyasının ən kiçik qiymətini  $m$ , ən böyük qiymətini isə  $M$  ilə işarə edək. Əgər  $m = M$  olarsa, onda  $f(x)$  funksiyası sabitdir, çünki  $m \leq f(x) \leq M$ . Bu halda istənilən  $x \in (a; b)$  üçün  $f'(x) = 0$ . İndi tutaq ki,  $m \neq M$ .  $f(a) = f(b)$  olduğuna görə bu halda  $f(a)$ ,  $m$  və ya  $M$  ədədlərinin heç olmazsa birindən fərqli olacaq. Müəyyənlik üçün fərz edək ki,  $f(a) \neq m$ . Onda elə  $c \in (a; b)$  nöqtəsi var ki,  $f(c) = m$ .  $[a, b]$  parçasına daxil olan istənilən  $x$  üçün  $f(x) - f(c) \geq 0$  olduğuna görə  $x$ -in  $c$ -dən kiçik bütün qiymətlərində

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$$

$x$ -in  $c$ -dən böyük bütün qiymətlərində isə

$$\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$

olur.  $f(x)$  funksiyasının  $c$  nöqtəsində törəməsinin olduğunu nəzərə alıb yuxarıdakı bərabərsizliklərdə limiti keçsək

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c - 0} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0,$$

$$f'(c) = \lim_{x \rightarrow c + 0} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$$



münasibətlərini alırıq. Bu münasibətlərdən alırıq ki,  
 $f'(c)=0$ .

**Teorem3 (Laqranj):**  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında kəsilməz və  $(a, b)$  intervalında diferensiallanandırsa, bu interval daxil olan elə  $c$  nöqtəsi var ki,

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a) \quad (1)$$

düsturu daxil olur.

$[a, b]$  parçasında təyin edilmiş

$$F(x)=f(x)-x \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

köməkçi funksiyasına baxaq. Teoremin şərtinə görə  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında kəsilməz,  $(a, b)$  intervalında isə diferensiallanandır. Digər tərəfdən  $x \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$  funksiyası bütün həqiqi oxda diferensiallanan olduğu üçün  $F(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında kəsilməz,  $(a, b)$  intervalında parçasının uc nöqtələrində isə diferensiallanan olacaq. Bundan başqa bu funksiyanın  $[a, b]$  parçasının uc nöqtələrindəki qiymətləri bərabərdir:

$$F(a)=F(b)=\frac{f(a)b-f(b)a}{b-a}.$$

Deməli,  $f(x)$  funksiyası Roll teoreminin bütün şərtlərini ödəyir. Odur ki,  $(a; b)$  intervalına daxil olan elə  $c$  nöqtəsi var ki,

$$F'(c)=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

və ya

$$f(b)-f(a)=f'(c)(b-a)$$

bərabərliyi doğru olur.

Laqranj teoreminin həndəsi mənasını izah edək.

Görürük ki,  $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{BD}{AD}$  Bu bərabərlikdən və (1) düsturundan

$$\frac{BD}{AD} = f'(c) \quad (2)$$

Bərabərliyi alınır.  $\frac{BD}{AD}$  nisbəti AB kəsəninin  $f(x)$  funksiyasının qrafikinə  $(c;f(c))$  nöqtəsində toxunanın bucaq əmsalına bərabərdir. Başqa sözlə (2) bərabərliyi onu göstərir ki, AB kəsəni ilə MK toxunanı paraleldir. Buradan Laqranj teoreminin həndəsi mənası çıxır:  $(a;b)$  intervalına daxil olan elə  $c$  nöqtəsi var ki,  $f(x)$  funksiyasının qrafikinə  $(c;f(x))$  nöqtəsində toxunan AB kəsəninə paralel olur.

**Nəticə 1.** Funksiyanın törəməsi müəyyən bir aralıqda sifra bərabədirsə, bu aralıqda həmin funksiya sabitdir.

**İsbatı:** Tutaq ki, istənilən  $x \in (a;b)$  üçün  $f'(x) \neq 0$ .  $(a;b)$  intervalına daxil olan qeyd olunmuş bir  $x_0$  nöqtəsi və bu nöqtədən fərqli  $x_1$  nöqtəsi götürək. Laqranj teoreminə görə  $x_0$  və  $x_1$  nöqtələri arasında elə  $\xi$  nöqtəsi var ki,

$$f(x_1) - f(x_0) = f'(\xi)(x_1 - x_0).$$

$f'(\xi) = 0$  olduğuna görə

$$f(x_1) = f(x_0)$$

bərabərliyini alırıq. Bu o deməkdir ki,  $f(x)$  funksiyasının  $(a;b)$  intervalının istənilən nöqtəsindəki qiyməti  $f(x_0)$ -a bərabərdir.

**Nəticə 2.** İki funksiyanın törəmələri müəyyən bir aralıqda bərabədirsə, bu funksiyalar həmin aralıqda bir-birindən ancaq sabit toplananla fərqlənə bilər.

**İsbatı:** Tutaq ki, istənilən  $x \in (a;b)$  üçün  $f'(x) = g'(x)$ . Onda

$$[f(x) - g(x)]' = f'(x) - g'(x) = 0.$$

Onda nəticə 1-ə görə istənilən  $x \in (a;b)$  üçün

$$f(x) - g(x) = c$$

bərabərliyi doğru olur.

**Teorem 4 (Koşi).** Tutaq ki,  $f(x)$  və  $\varphi(x)$  funksiyaları  $[a, b]$  parçasında kəsilməyən və bu parçanın bütün daxili nöqtələrində sonlu törəməsi olan funksiyalardır. Həm də  $\varphi'(x) \neq 0$ , onda elə  $\xi \in ]a, b[$  nöqtəsi var ki, bu nöqtədə  $\frac{f(b) - f(a)}{\varphi(b) - \varphi(a)} = \frac{f'(\xi)}{\varphi'(\xi)}$  bərabərliyi ödənilir.

**Nəticə :**  $f(x)$  funksiyası  $]a, b[$  intervalında  $n$  sayda nöqtədə sıfır çevrilirsə və həmin intervalda bu funksiyanın  $(n-1)$  tərtibli törəməsi varsa, onda  $(n-1)$  tərtibli törəmə  $]a, b[$  intervalının ən azı bir nöqtəsində sıfır bərabərdir.

**Nəticə 1.** Laqranj düsturunda  $f(a) = f(b)$  olarsa, onda  $f'(\xi) = 0$  olar. Başqa sözlə Roll teoremi Laqranj teoremin nəticəsidir.

**Nəticə 2.** Koşi teoremində  $\varphi(x) = x$  olarsa,  $\varphi'(x) = 1$   $\varphi(a) = a$ ,  $\varphi(b) = b$  olar və nəticədə  $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$  olur. Deməli, Laqranj teoremi Koşi teoreminin nəticəsidir.

# XIII FƏSİL. QABARIQ VƏ ÇÖKÜK ƏYRİLƏR. LOPİTAL QAYDASI

## 13.1. Qeyri müəyyənliklərin açılışı. Lopital qaydası

Tutaq ki,  $f(x)$  və  $g(x)$  funksiyaları  $x=c$  nöqtəsinin müəyyən bir ətrafında ( $c$  nöqtəsi müstəsna ola bilər) təyin edilmiş funksiyalardır. Fərz edək ki, bu funksiyalar ya

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0 \quad (1)$$

və yaxud 
$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty \quad (2)$$

şərtlərini ödəyir. Hər iki halda  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)}$  limitinin hesab-

lanmasına nisbətən limiti haqqında olan teoremi tətbiq etmək olmaz. (1) şərtləri ((2) şərtləri) ödəndikdə  $\frac{f(x)}{g(x)}$

nisbəti  $x=c$  nöqtəsində  $\frac{0}{0}$  (şəklində  $\frac{\infty}{\infty}$ ) şəklində qeyri-müəyyənlik adlanır. Qeyri-müəyyənliklərin açılışı üçün məzmunu aşağıdakı teoremdə ifadə edilən Lopital qaydasından istifadə edirlər.

**Teorem.** Tutaq ki,  $f(x)$  və  $g(x)$   $x=c$  nöqtəsinin müəyyən bir ətrafında ( $c$  nöqtəsi müstəsna ola bilər) diferensiallanan funksiyadır. Əgər bu funksiyalar  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = \infty$

şərtlərini ödəyirsə və  $\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$  limiti varsa, onda

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} \quad \text{bərabərliyi doğrudur.}$$

Bu teoremin isbatını ancaq  $\frac{0}{0}$  şəklində qeyri-müəyyənlik üçün verəcəyik. Bundan başqa fərz edəcəyik ki,  $f(x)$ ,  $f'(x)$ ,  $g(x)$  və  $g'(x)$  funksiyaları  $x=c$  nöqtəsində kəsilməzdir və  $g'(c) \neq 0$ . Beləliklə, tutaq ki,

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = f(c) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow c} g(x) = g(c) = 0$$

şərtləri ödənilir. Onda 
$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} = \frac{\frac{f(x) - f(c)}{x - c}}{\frac{g(x) - g(c)}{x - c}}$$

münasibəti doğrudur. Burada  $x \rightarrow c$  yaxınlaşdıqda limitə keçək və

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = f'(c); \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{g(x) - g(c)}{x - c} = g'(c) \neq 0;$$

olduğunu nəzərə alsaq

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \quad (3)$$

bərabərliyini alarıq. Digər tərəfdən  $f'(x)$  və  $g'(x)$  funksiyaları  $x=c$  nöqtəsində kəsilməz olduğu üçün

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f'(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g'(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \quad (4)$$

münasibəti doğru olur. (3) və (4) düsturlarından

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

bərabərliyini alırıq.

**Misal 1.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x}$$

**Həlli.**  $\frac{e^x - 1}{\sin x}$  nisbəti  $x=0$  nöqtəsində  $\frac{0}{0}$  şəklində

qeyri-müəyyənlikdir, çünki  $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1) = 0$  və  $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0$

Bu qeyri-müəyyənliyi açmaq üçün Lopital qaydasından istifadə edək:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - 1)'}{(\sin x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{\cos x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} e^x}{\lim_{x \rightarrow 0} \cos x} = \frac{1}{1} = 1$$

**Misal 2.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x}$$

**Həlli.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln \cos x = 0$  və  $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$  olduğu üçün

$\frac{\ln \cos x}{x}$  nisbəti  $x=0$  nöqtəsində  $\frac{0}{0}$  şəklində qeyri-müəyyənlikdir. Bu qeyri-müəyyənliyi Lopital qaydası ilə açaq:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln \cos x)'}{(x)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\sin x}{\cos x}}{1} = -\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} x = 0$$

**Misal 3.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin^2 x}{\ln x^2}$$

**Həlli.**  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln \sin^2 x = -\infty$  və  $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x^2 = -\infty$  olduğu üçün

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin^2 x}{\ln x^2}$  nisbəti  $x=0$  nöqtəsində  $\frac{\infty}{\infty}$  şəklində qeyri-müəyyənlikdir. Bu qeyri-müəyyənliyi Lopital qaydası ilə açaq:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin^2 x}{\ln x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\ln \sin^2 x)'}{(\ln x^2)'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{2 \sin x \cos x}{\sin^2 x}}{\frac{2x}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{ctgx}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{ctgx} = \infty$  və  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$  olduğu üçün  $x \operatorname{ctgx} = \frac{\operatorname{ctgx}}{x^{-1}}$  ifadəsi

$x=0$  nöqtəsində  $\frac{\infty}{\infty}$  şəklində qeyri-müəyyənlikdir. Oudur

ki, Lopital qaydasını bir daha tətbiq etmək lazımdır:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{ctgx} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\operatorname{ctgx})'}{(x^{-1})'} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{\sin^2 x}}{-x^{-2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{x}{\sin x} \right)^2 = 1$$

Beləliklə, Lopital qaydasını iki dəfə tətbiq etməklə

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin^2 x}{\ln x^2} = 1$$

bərabərliyini alırıq.

**Misal 4.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x}$$

**Həlli.**  $x \sin \frac{1}{x}$  hasilı  $x = \infty$  nöqtəsində  $0 \cdot \infty$  şəklində qeyri-müəyyənlikdir. Onu  $x \sin \frac{1}{x} = \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}$  şəklində çevirməklə  $\frac{0}{0}$  şəklində qeyri-müəyyənliyə gətirmək olar:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

**Misal 5.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right]$$

**Həlli.**  $\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}$  ifadəsi  $x=0$  nöqtəsində  $\infty - \infty$  şəklində qeyri-müəyyənlikdir. Onu

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = \frac{x - \sin x}{x \sin x}$$

şəklində göstərməklə  $\frac{0}{0}$  şəklində qeyri-müəyyənliyə gəlirik. Bu qeyri-müəyyənliyi Lopital qaydası ilə açaq:



$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin x + x \cos x} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\cos x + \cos x - x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2 \cos x - \sin x} = \\
&= \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \sin x}{\lim_{x \rightarrow 0} (2 \cos x - x \sin x)} = 0
\end{aligned}$$

**Misal 6.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{x}}$$

**Həlli.**  $(1 + x^2)^{\frac{1}{x}}$  ifadəsi  $x=0$  nöqtəsində  $1^\infty$  şəklində qeyri-müəyyənlikdir. Bu ifadəni

$$(1 + x^2)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+x^2)}{x}}$$

şəklində göstərək.  $f(t) = e^t$  funksiyası kəsilməz funksiya olduğu üçün

$$(1 + x^2)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+x^2)}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{x}}$$

düsturu doğrudur.  $\frac{\ln(1+x^2)}{x}$  nisbəti  $x=0$  nöqtəsində  $\frac{0}{0}$  şəklində qeyri-müəyyənlikdir, onu Lopital qaydası ilə açaq:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\frac{1}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1+x^2}} = e^0 = 1$$

**Misal 7.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow +0} x^{\sin x}$$

**Həlli.**  $x^{\sin x}$  ifadəsi  $x \rightarrow +0$ -da  $0^0$  şəklində qeyri-müəyyənlikdir. Onu əvvəlcə çevirib, sonra Lopital qaydası ilə açaq:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +0} x^{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow +0} e^{\sin x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow +0} \sin x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\ln x}{1/\sin x}} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +0} \frac{1/x}{-\cos x / \sin^2 x}} = e^{-\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} \cdot \operatorname{tg} x} = e^{-\lim_{x \rightarrow +0} \frac{\sin x}{x} \lim_{x \rightarrow +0} \operatorname{tg} x} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

**Misal 8.** Limiti hesablayın:

$$\lim_{x \rightarrow +\pi/2} (\operatorname{tg} x)^{2x-\pi}$$

**Həlli.**  $(\operatorname{tg} x)^{2x-\pi}$  ifadəsi  $x \rightarrow +\frac{\pi}{2}$ -da  $\infty^0$  şəklində qeyri-müəyyənlikdir. Onu əvvəl çevirib, sonra Lopital qaydası ilə açaq:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\pi/2} (\operatorname{tg} x)^{2x-\pi} &= \lim_{x \rightarrow +\pi/2} e^{(2x-\pi) \ln \operatorname{tg} x} = e^{\lim_{x \rightarrow +\pi/2} \frac{\ln \operatorname{tg} x}{1/(2x-\pi)}} = \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow +\pi/2} \left[ \frac{1}{\operatorname{tg} x \cos^2 x} \cdot \frac{1}{2} (2x-\pi)^2 \right]} = e^{-\lim_{x \rightarrow +\pi/2} \frac{(2x-\pi)^2}{\sin 2x}} = e^{-\lim_{x \rightarrow +\pi/2} \frac{2(2x-\pi)}{2 \cos 2x}} = e^0 = 1 \end{aligned}$$

## 13.2. Funksiyaların törəmə vasitəsi ilə tədqiqi və qrafiklərinin qurulması

Analitik şəkildə verilmiş funksiyaların bir sıra əhəmiyyətli xassələrini törəmələrin köməyi ilə araşdırmaq olur.

Onlardan: monotonluq intervalları, ekstremumlar, qabarıqlıq və çöküklük və b. göstərək.

Həmin xassələrlə əlaqədar olan teoremləri verək.

### 13.2.1. Funksiyaların sabitlik intervalları

**Teorem.**  $(a,b)$  intervalında diferensiallanan  $f(x)$  funksiyasının  $[a,b]$  parçasında sabit olması üçün  $\forall x \in (a,b)$  üçün  $f'(x) = 0$  olması zəruri və kafi şərtidir.

**İsbati:** 1)  $f(x) = c = \text{Const}$  olsun. Onda  $f'(x) = 0$  olması məlumdur.

2) İndi tutaq ki,  $\forall x \in [a,b]$  üçün  $f'(x) = 0$

$x_0 \in [a,b]$  hər hansı bir nöqtə,  $x$  isə o aralığın cari nöqtəsi olsun. Onda Lagranj düsturuna görə

$f(x) - f(x_0) = f'(x)(x - x_0) = 0$   $f'(x) = 0$  olmasından alınır ki,  $f(x) = f(x_0)$  olur. Yəni  $\forall x \in [a,b]$  üçün  $f(x)$  funksiyasının  $x$  nöqtəsində sabit  $f(x_0)$  ədədinə bərabər qiymət alır.

### 13.2.2. Funksiyanın monotonluq intervalları

Funksiyanın artdığı, azalmadığı, azaldığı və artmadığı bütün intervallar onun monotonluq intervalları adlanır.

**Teorem 1.** (Zəruri şərt).  $(a;b)$  intervalında diferensiallanan və artan (azalan) funksiyanın törəməsi həmin intervalda mənfi (müsbət) deyil.

**İsbatı:** Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası  $(a;b)$  intervalında artandır və  $x_0$  bu intervalın hər hansı bir nöqtəsidir. Onda  $x < x_0$  qiymətlərində  $f(x) < f(x_0)$  olur. Ona görə də bütün  $x \in (a;b), x \neq x_0$  qiymətlərində

$$\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} > 0$$

bərabərliyi doğrudur.  $f(x)$  funksiyanın  $x_0$  nöqtəsində differensiallanan olduğu nəzərə alaraq bu bərabərsizlikdə  $x \rightarrow x_0$ -da limitə keçsək

$$f'(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \geq 0$$

alırıq. Azalan funksiya üçün teorem analoji qayda ilə isbat edilir.

**Teorem 2.** (Kafi şərt)  $(a;b)$  intervalında törəməsi müsbət(mənfi) olan  $f(x)$  funksiyası həmin intervalda artandır.

**İsbatı:** Tutaq ki,  $x_1$  və  $x_2$   $(a;b)$  intervalına daxil olan ixtiyari iki nöqtədir və  $x_2 > x_1$ . Laqranj teoreminə görə elə  $c \in (x_1, x_2)$  nöqtəsi var ki,

$$f(x_2)-f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) \quad (1)$$

bərabərliyi doğrudur. Bu bərabərlikdən görünür ki, əgər  $(a;b)$  intervalında  $f'(x)$  müsbətdirsə  $x_2 > x_1$  olduqda  $f(x_2) > f(x_1)$  olur. Başqa sözlə, funksiya  $(a;b)$  intervalında artandır. Əgər  $(a;b)$  intervalında  $f'(x)$  mənfidirsə,  $x_2 > x_1$  olduqda  $x_2 > x_1$  olduqda olur. Bu isə o deməkdir ki, funksiya  $(a;b)$  intervalında artandır.

**Qeyd.** Teorem 2-də funksiyanın artan və ya azalan olması üçün onun üzərinə qoyulan şərt zəruri şərt deyil. Məsələn üçün  $y=x^3$ ,  $x \in \mathbb{R}$  funksiyası üçün  $\mathbb{R} = (-\infty; \infty)$ -da artandır, lakin onun törəməsi  $x=0$  nöqtəsində sıfıra bərabərdir.

Məsələn  $f(x) = 2x^2 - \ln x$ ,  $x \in (0; +\infty)$  funksiyasının monotonluq intervallarını tapın.

**Həlli:** Verilən funksiyanın törəməsini tapmaq:

$$f'(x) = 4x - \frac{1}{x}.$$

Törəmə  $x = \frac{1}{2}$  nöqtəsində sıfıra çevrilir.  $x = \frac{1}{2}$  nöqtəsi funksiyanın təyin oblastını iki aralığa bölür:  $(0; \frac{1}{2})$  və  $[\frac{1}{2}; \infty)$ . Bu aralıqların hər birinin daxilində  $f(x)$  öz işarəsini dəyişmir.  $(0; \frac{1}{2})$  intervalında  $f'(x) < 0$ ,  $(\frac{1}{2}; \infty)$  intervalında isə  $f'(x) > 0$  olur (bunu hər intervala daxil olan bir nöqtədə törəmənin qiymətlərini hesablamaqla öyrənmək olar). Onda ki, baxdığımız funksiya  $(0; \frac{1}{2})$  aralığında azalandır,  $(\frac{1}{2}; \infty)$  aralığında isə artandır.

**Məsələn 1.**  $f(x) = e^{-x^2}$  olsun.

1)  $f'(x) = -2x \cdot e^{-x^2}$ ; 2)  $f'(x) = -2x \cdot e^{-x^2} \geq 0$  olması üçün  $x \leq 0$  olmalıdır, yəni  $(-\infty, 0)$  intervalında  $f(x) = e^{-x^2}$  funksiyası artan olur;

3)  $f'(x) = -2x \cdot e^{-x^2} \leq 0$  olması üçün isə  $x \geq 0$  olmalıdır, yəni  $(0, +\infty)$  intervalında funksiya azalandır.

Deyilənlərdən görünür ki,  $x_0 = 0$  nöqtəsi  $f(x)$ -in “dayanma” nöqtəsidir, yəni artma və azalma intervallarının

sərhəddidir. Bu isə o deməkdir ki,  $x_0 = 0$  nöqtəsində  $f(x) = e^{-x^2}$  funksiyası özünün ən böyük qiymətini alır.

$$f(0) = e^0 = 1 = \underset{x \in \mathbb{R}}{\text{Max}} f(x) = \underset{x \in \mathbb{R}}{\text{Sup}} f(x).$$

**Misal 2.**  $f(x) = x \cdot e^{-x^2}$  funksiyasının monotonluq intervallarını tapın.

**Həlli:** 1)  $f'(x) = e^{-x^2} - 2x^2 e^{-x^2} = e^{-x^2} (1 - 2x^2).$

2)  $f'(x) = e^{-x^2} (1 - 2x^2) \geq 0 \Leftrightarrow 1 - 2x^2 \geq 0 \Leftrightarrow 2x^2 \leq 1$

$$x^2 \leq \frac{1}{2}, |x| \leq \frac{1}{\sqrt{2}},$$

yəni  $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  intervalında  $f(x)$  funksiyası artandır;

3)  $f'(x) = e^{-x^2} \cdot (1 - 2x^2) \leq 0 \Leftrightarrow 2x^2 \geq 1, |x| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$

olur.

Yəni  $f(x)$  funksiyası  $\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  və  $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$  intervallarında azalandır.


$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}} < 0, \quad f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\frac{1}{2}}$$

olur. (şəkil 1)

Bu isə o deməkdir ki,

$$\text{Max } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}};$$

$$\text{Min } f(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}}$$



Şəkil 1.

### 13.2.3.Funksiyanın ekstremumu

Fərz edək ki,  $y=f(x)$ ,  $[a,b]$  parçasında təyin olunmuş funksiya,  $x_0$  isə həmin parçanın hər hansı daxili nöqtəsidir.

**Tərif.** Əgər  $f(x)$ -in  $x_0$  nöqtəsinin hər hansı  $(x_0-\delta, x_0+\delta)$  ( $\delta>0$ ) ətrafında yerləşən bütün qiymətlərində

$$f(x) \leq f(x_0) \quad (1)$$

bərabərsizliyi ödənilərsə, onda deyilər ki,  $f(x)$  funksiyanın  $x_0$  nöqtəsində lokal maksimumu var.  $f(x_0)$  ədədinə funksiyanın lokal maksimum qiyməti deyilir.

Anoloji olaraq,  $x$ -in  $x_0$  nöqtəsinin hər hansı  $(x_0-\delta, x_0+\delta)$  ( $\delta>0$ ) ətrafında yerləşən bütün qiymətlərində


$$f(x) \geq f(x_0)$$

bərabərsizliyi ödənilərsə, onda deyirlər ki,  $f(x)$  funksiyanın  $x_0$  nöqtəsində lokal minimumu var.  $f(x_0)$  ədədinə funksiyanın lokal minimum qiyməti deyilir.

Tərifdən aydındır ki, funksiyanın lokal minimumu və lokal maksimumu baxılan nöqtənin yaxın ətrafına nəzərən götürülür. Funksiyanın lokal maksimumuna və lokal minimumuna birlikdə funksiyanın lokal ekstremumu deyilir.

Funksiya ekstremumunu oblastın daxili nöqtələrində aldığından ona daxili ekstremum da deyilir.  $f(x)$  funksiyasının  $[a,b]$  parçasının  $a$  ucundakı  $f(a)$  qiyməti həmin nöqtənin hər hansı sağ  $(a, a+\delta)$  ( $\delta>0$ ) ətrafındakı bütün qiymətlərdən kiçik (böyük) olmazsa, yəni  $f(a)\geq f(x)$ ,  $x\in(a, a+\delta)$  olarsa, onda deyirlər ki,  $f(x)$  funksiyasının  $x=a$  nöqtəsində sərhəd maksimumu (minimumu) var. Parçanın  $x=b$  ucunda sərhəd maksimumu və sərhəd minimumu da eyni qayda ilə təyin olunur.

Funksiyanın sərhəd maksimumu və və sərhəd minimumu birlikdə funksiyanın sərhəd ekstremumu adlanır. Lokal ekstremumun tərifindən aydındır ki, funksiyanın öz təyin oblastında lokal ekstremumu ola da bilər, olmaya da bilər. Funksiyanın təyin oblastında bir və ya bir neçə lokal minimumu və lokal maksimum ola bilər. Məsələn,  $f(x)=x^3$  funksiyasının lokal ekstremumu yoxdur  $f(x)=x^2$  funksiyasının isə  $x=0$  nöqtəsində lokal minimumu vardır



Şəkil 2.

Qrafiki 2-ci şəkildə verilmiş funksiyanın  $x_1$  və  $x_3$  nöqtələrində lokal maksimumu,  $x_2$  və  $x_4$  nöqtələrində isə lokal minimumu vardır. Funksiyanın  $x=a$  nöqtəsində sərhəd minimumu,  $x=b$  nöqtəsində isə sərhəd maksimumu var.



Funksiyanın lokal ekstremumu hansı nöqtələrində ola bilər?

**Teorem ( Lokal ekstremumun varlığı üçün zəruri şərt ).**

**$y=f(x)$  funksiyasının diferensiallanan olduğu  $x_0$  nöqtəsində lokal ekstremumu varsa, onun törəməsi həmin nöqtədə sıfıra bərabərdir:  $f'(x_0)=0$ .**

**İsbati:** Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyasının  $x_0$  nöqtəsində ekstremumu var. Onda ixtiyari (kiçik)  $\Delta x$  artımı üçün :

$$f(x_0+\Delta x) \leq f(x_0), \quad f(x_0+\Delta x)-f(x_0) \leq 0.$$

Buradan

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0) \leq 0}{\Delta x} \leq 0, \quad \Delta x > 0 \text{ olduqda,}$$

$$\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0) \leq 0}{\Delta x} \geq 0, \quad \Delta x < 0 \text{ olduqda}$$

Bu bərabərsizliklərdə  $\Delta x \rightarrow 0$  şərtində limitə keçsək, eyni zamanda

$$f'(x_0) \leq 0, \quad f'(x_0) \geq 0$$


münasibətləri alınır, buradan da  $f'(x_0)=0$ .

Deməli, diferensiallanan  $f(x)$  funksiyanın lokal ekstremumu, onun törəməsinin sıfıra bərabər olduğu nöqtələrdə ola bilər.


Funksiyanın törəməsinin sıfıra bərabər olduğu nöqtələrə bəzən həmin funksiyanın stasionar nöqtələri deyilir.

Funksiyanın lokal ekstremumu, törəməsi olmadığı ( $f'(x_0)=\infty$  olan və  $f'(x_0)$ -in heç olmadığı) nöqtələrdə də ola bilər.

Məsələn,  $y=x^{\frac{2}{3}}$  və  $y=|x|$  funksiyaların hər ikisinin  $x=0$  nöqtəsində törəməsi yoxdur, lakin həmin  $x=0$  nöqtəsində onların lokal minimumu var. (şəkil 1, 2)



Şəkil 1.



Şəkil 2.

Kəsilməyən funksiya törəməsinin sıfıra çevrildiyi və törəməsi olmadığı nöqtələrə həmin funksiyanın böhran nöqtələri deyilir. Buradan aydındır ki, funksiyanın böhran nöqtələri onun stasionar nöqtələri ilə törəməsinin olmadığı nöqtələrdən ibarətdir.

Yuxarıda deyilənlərə əsasən funksiyanın lokal ekstremumunun varlığı üçün şərtin zəruriliyini aşağıdakı ümumi şəkildə söyləmək olar.

### Şərtin zəruriliyi.


**Funksiyanın lokal ekstremum qiymət aldığı hər bir nöqtə həmin funksiyanın böhran nöqtəsidir.** Lakin hər bir böhran nöqtəsində funksiyanın lokal ekstremumu olduğunu düşünmək səhvdir. Böhran nöqtəsində funksiya lokal ekstremum qiymət almaya da bilər.

Məsələn,  $x=0$  nöqtəsi  $f(x)=x^3$  funksiyanının böhran nöqtəsidir, funksiyanın  $f'(x)=3x^2$  törəməsi həmin nöqtədə sıfıra bərabərdir.

Lakin funksiya həmin nöqtədə lokal ekstremum qiymət almır (şəkil 3). Eləcə də,  $x=0$  nöqtəsi  $f(x)=\sqrt[3]{x}$  funksiyanının böhran nöqtəsidir. Bu nöqtədə

$$f'(x) = \frac{1}{3} \cdot x^{-\frac{2}{3}}$$

törəməsi sonsuzluğa bərabərdir. Verilmiş funksiya  $x=0$  böhran nöqtəsində lokal ekstremum qiymət almır (3-cü şəkil).



Şəkil 3.

Verilmiş funksiyanın böhran nöqtəsində lokal ekstremumu olduğunu necə bilmək olar?

#### 13.2.4. Ekstremumun varlığı üçün kafi şərtlər

Verilmiş funksiya özünün böhran nöqtəsində nə zaman lokal ekstremum qiymət alacağını təyin etmək üçün nöqtə ətrafında onun törəməsini tədqiq edirlər. Bu qayda ilə funksiyanın birtərtibli, ikitərtibli və s. törəmələrindən istifadə etməklə lokal ekstremum varlığı üçün müxtəlif kafi şərtlər verilir.

**Teorem 1.** Tutaq ki,  $y=f(x)$  funksiyası  $x_0$  böhran nöqtəsinin müəyyən ətrafında kəsilməyən və həmin ətrafda,  $x_0$  nöqtəsi müstəsna olmaqla, diferensiallanan funksiyadır.

Əgər soldan sağa  $x_0$  nöqtəsindən keçdikdə funksiyanın  $f'(x)$  törəməsi öz işarəsini dəyişirsə, onda hə-

min nöqtədə funksiyanın lokal ekstremumu var, soldan sağa  $x_0$  nöqtəsindən keçdikdə funksiyanın törəməsi öz işarəsini dəyişmədikdə isə həmin nöqtədə funksiyanın lokal ekstremumu yoxdur.

Bu halda, funksiyanın  $f'(x)$  törəməsi  $x_0$  nöqtəsindən solda müsbət, sağda mənfi olduqda həmin nöqtədə funksiyanın lokal maksimumu var, funksiyanın törəməsi  $x_0$  nöqtəsində solda mənfi ( $f'(x) < 0$ ), sağda müsbət ( $f'(x) > 0$ ) olduqda isə həmin nöqtədə funksiyanın lokal minimumu var.

**İsbati:** Əvvəlcə, fərz edək ki, funksiya törəməsi öz işarəsini  $x_0$  nöqtəsində müsbətdən mənfiyə dəyişir, yəni

$x < x_0$  olduqda  $f'(x) > 0$ ,  $x > x_0$  olduqda isə  $f'(x) < 0$  olur. Onda  $x$ -in  $x_0$  nöqtəsinin teoremdə göstərilən ətrafında yerləşən ixtiyari qiyməti üçün Laqranj teoreminə görə

$$f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) \quad (1)$$

olar.

Əgər  $x < x_0$  olarsa,  $x < \xi < x_0$  olduğundan  $f'(\xi) > 0$  və  $x - x_0 < 0$ . Bu halda (1) düsturunun sağ tərəfi mənfi ədəd olar, buna görə də həmin  $x$  nöqtələrində

$$f(x) - f(x_0) < 0 \quad (2)$$

bərabərsizliyi ödənilər.

Əgər  $x_0 < x$  olarsa,  $x - x_0 > 0$  və  $x_0 < \xi < x$  olduğundan  $f'(\xi) < 0$ .

Bu halda (1) bərabərliyinin sağ tərəfi mənfi ədəd olar və yenə də (2) bərabərsizliyi ödənilər.

Deməli  $x - x_0$  nöqtəsinin göstərilən ətrafında yerləşən bütün qiymətlərində (2) bərabərsizliyi, yəni

$$f(x) < f(x_0)$$

bərabərsizliyi ödənilir.

Bu isə  $x_0$  nöqtəsində  $f(x)$  funksiyanın lokal maksimumu olduğunu göstərir. Eyni qayda ilə göstərmək olar ki, funksiyanın törəməsi  $x_0$  nöqtəsində öz işarəsini mənfidən müsbətə dəyişdikdə  $x - x_0$  nöqtəsinin göstərilən ətrafında yerləşən bütün qiymətlərində

$$f(x) > f(x_0)$$

bərabərsizliyi ödənilir. Buradan  $x_0$  nöqtəsində  $f(x)$  funksiyanın lokal minimumu olması aydındır.

Əgər  $f(x)$  funksiyanın törəməsi  $x_0$  nöqtəsindən keçdikdə öz işarəsini dəyişmirsə onda  $f'(\xi)$  kəmiyyəti həmin ətrafda eyni işarəli olar,  $x - x_0$  fərqi isə soldan sağa  $x_0$  nöqtəsindən keçdikdə öz işarəsini mənfidən müsbətə dəyişir. Buna görə də  $x_0$  nöqtəsinin istənilən kiçik ətrafında həm  $f(x) > f(x_0)$  və həm də  $f(x) < f(x_0)$  bərabərsizliyinin ödənilməsi nöqtələr olar. Bu isə  $x_0$  nöqtəsində lokal ekstremumun olmadığını göstərir.

Teoremin həndəsi mənası belədir: soldan sağa hərəkət etdikdə funksiyanın artma intervalı qurtarıb azalma intervalı başlayırsa (və ya tərsinə), onda funksiyanın artma və azalma intervallarını ayıran  $x_0$  nöqtəsi həmin funksiyanın lokal maksimum (minimum) nöqtəsidir. Bu təklifin tərsi doğru olmaya da bilər. Funksiyanın lokal ekstremum nöqtəsi onun monotonluq (artma və azalma) intervallarını ayırmaya da bilər. Məsələn,

$$f_0(x) = \begin{cases} x^2 \left( \sin^2 \frac{1}{x} + 1 \right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

funksiyanın  $x = 0$  nöqtəsində lokal minimumu var. Bu nöqtədə törəməsi sıfıra bərabərdir:

$$f'_0 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(\Delta x)^2 \left( \sin \frac{1}{\Delta x} + 1 \right)}{\Delta x} = 0$$

Lakin  $x = 0$  nöqtəsi  $f_0(x)$  funksiyasının monoton-luq intervallarını ayırmır. Funksiyanın

$$f'_0(x) = 2x \left( \sin^2 \frac{1}{x} + 1 \right) - \sin \frac{2}{x}$$

törəməsi  $x = 0$  nöqtəsinin hər iki tərəfində (əlbəttə,  $x = 0$  nöqtəsinə çox yaxın olan nöqtələrdə) həm müsbət və həm də mənfi işarəli qiymətlər alır .

İsbat etdiyimiz teoremə əsasən verilmiş  $(a, b)$  intervalında kəsilməz törəməsi olan  $f(x)$  funksiyasının həmin intervaldakı lokal ekstremumlarını tapmaq üçün aşağıdakı praktiki qaydanı alırıq: həmin funksiyanın  $(a, b)$  intervalında yerləşən bütün böhran nöqtələrini taparaq

$$a < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n < b$$

şəklində nömrələyirik.

Bu nöqtələrin təyin etdiyi

$$(a, x_1), (x_1, x_2), \dots, (x_{n-1}, x_n), (x_n, b) \quad (3)$$

İntervallarının hər birinin daxilində funksiyanın  $f'(x)$  törəməsi var və bu törəmə (3) intervallarının hər birinin daxilində öz işarəsini saxlayır. Bu intervallarda törəmənin işarəsini təyin etməklə (törəmənin intervalda işarəsi intervalın bir daxili nöqtəsində törəmənin qiymətinin işarəsi ilə təyin olunur)  $x_k$  ( $k = 1, 2, \dots, n$ ) nöqtələrində funksiyanın lokal ekstremumunun varlığını teoremə əsasən yoxlamaq olar.

**Misal 1.** Bütün ədəd oxunda təyin olunmuş  $f(x) = x^2 - \frac{1}{2}x^4$  funksiyasının lokal ekstremumunu tapmalı. Bu məqsədlə

$$f'(x) = 2x - 2x^3 = 2x(1 - x)(1 + x) \quad (4)$$

törəməsinin sıfıra çevrildiyi nöqtələri tapaq:


$$x_1 = -1, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 1.$$

Aydındır ki, verilmiş funksiyanın böhran nöqtələri ancaq bu üç nöqtə olar, çünki funksiya törəməsinin sıfıra çevrildiyi və törəmənin olmadığı başqa nöqtələr yoxdur. Bu nöqtələr vasitəsilə ədəd oxu

$$(-\infty, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, \infty) \quad (5)$$

kimi intervallara ayırılır.

Funksiyanın törəməsinin bu intervallarda işarəsi göstərilmişdir (şəkil 1).



**Şəkil 1.**

Bir daha qeyd etmək lazımdır ki, (5) intervallarının hər birinin daxilində (4) törəməsi öz işarəsini saxlayır. Buradan aydındır ki, funksiyanın törəməsi  $x_1 = -1$  nöqtəsində öz işarəsini müsbətdən mənfiyə,  $x_2 = 0$  nöqtəsində öz işarəsini mənfidən müsbətə və  $x_3 = 1$  nöqtəsində isə müsbətdən mənfiyə dəyişir.

Deməli teoremə görə verilmiş funksiyanın  $x_1 = -1$  nöqtəsində lokal maksimumu  $x_2 = 0$  nöqtəsində lokal minimumu və  $x_3 = 1$  nöqtəsində isə lokal maksimumu var. Bu ekstremal qiymətlər

$$f(-1) = \frac{1}{2}, \quad f(0) = 0, \quad f(1) = \frac{1}{2}$$

ədədləridir.

### 13.3. Lokal ekstremumun yüksək tərtibli törəmə vasitəsilə araşdırılması

Funksiyanın lokal ekstremumunun varlığını ikitərtibli törəmə vasitəsilə təyin etmək bəzən daha əlverişli olur.

**Teorem 2.** Əgər  $f(x)$  funksiyasının stasionar  $x_0$  (yəni,  $f'(x_0) = 0$  olan) nöqtəsində ikitərtibli  $f''(x_0)$  törəməsi varsa, onda  $f''(x_0) < 0$  olduqda funksiyanın  $x_0$  nöqtəsində lokal maksimumu,  $f''(x_0) > 0$  olduqda isə həmin nöqtədə lokal minimumu var.

**İsbatı.** İkitərtibli törəmənin tərifinə görə

$$f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0}$$

Olduğundan ixtiyari  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $\delta > 0$  var ki  $x$  - in  $0 < |x - x_0| < \delta$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində

$$f''(x_0) - \varepsilon < \frac{f'(x)}{x - x_0} < f''(x_0) + \varepsilon \quad (1)$$

münasibəti ödənilir .

$f''(x_0) < 0$  olduqda müsbət  $\varepsilon$  ədədini elə seçmək (məsələn  $\varepsilon = \frac{|f''(x_0)|}{2}$ ) olar ki  $f''(x_0) + \varepsilon < 0$  bərabərsizliyi ödənilsin. Onda (1) bərabərsizliyinin sağ tərəfindən alarıq ki  $x$  - in  $0 < |x - x_0| < \delta$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində

$$\frac{f'(x)}{x - x_0} < 0 \quad (2)$$



$x < x_0$  olduqda  $x - x_0 < 0$  və  $x > x_0$  olduğundan (2) bərabərsizliyinin ödənilməsi üçün  $x < x_0$  olduqda  $f'(x) > 0$ ,  $x > x_0$  olduqda isə  $f'(x) < 0$  olmalıdır.

Deməli funksiyanın  $f'(x)$  törəməsi  $x_0$  nöqtəsində öz işarəsini müsbətdən mənfiyə dəyişir yəni həmin nöqtədə funksiyanın lokal maksimumu var.

$f''(x_0) > 0$  olduqda isə (6) münasibətinin sol bərabərsizliyinə əsasən göstərmək olar ki  $x < x_0$  olduqda  $f'(x) < 0$ ,  $x > x_0$  olduqda isə  $f'(x) > 0$  olmalıdır yəni  $f'(x)$  törəməsi öz işarəsini  $x_0$  nöqtəsində mənfidən müsbətə dəyişir. Bu isə funksiyanın  $x_0$  nöqtəsində lokal minimumunun olduğunu göstərir.

**Misal 2.**  $f(x) = 2x^3 - 15x^2 + 36x + 5$  funksiyanın lokal ekstremumunu tapmalı.

$$f'(x) = 6x^2 - 30x + 36 = 6(x - 2)(x - 3)$$

Olduğundan funksiyanın böhran nöqtələri  $x_1 = 2$  və  $x_2 = 3$  olar. Bu nöqtələrdə ikinci törəmənin qiymətini tapaq:

$$f''(x) = 12x - 30,$$

$$f''(2) = 12 \cdot 2 - 30 = -6 < 0$$

$$f''(3) = 12 \cdot 3 - 30 = 6 > 0$$

Olduğundan 2-ci teoremə görə funksiyanın  $x_1 = 2$  nöqtəsində lokal maksimumu  $x_2 = 3$  nöqtəsində isə lokal minimumu var.

**Misal 3.**  $f(x) = x^4$  funksiyanın lokal ekstremumunu tapmalı.

$$f'(x) = 4x^3 = 0$$

bərabərliyini yeganə  $x = 0$  nöqtəsi ödəyir. Bu nöqtədə funksiyanın ikinci törəməsi sıfıra bərabərdir:

$$f''(x) = 12x^2, f''(0) = 12 \cdot 0 = 0.$$


Ona görə də  $x = 0$  nöqtəsində funksiyanın lokal ekstremumunun olmasını 2-ci teoremi tətbiq etməklə yoxlamaq olmaz.

Lakin  $x < 0$  olduqda  $f'(x) = 4x^3 < 0$   $x > 0$  olduqda  $f'(x) > 0$  olması göstərir ki  $f'(x)$  törəməsi  $x = 0$  nöqtəsində işarəsini mənfiyədən müsbətə dəyişir. Onda 1-ci teoremə görə  $x = 0$  nöqtəsində funksiyanın lokal minimumu var.


**Misal 4.**  $f(x) = x \ln x$  ( $x > 0$ ) funksiyanın  $f'(x) = \ln x + 1$  törəməsi  $x = e^{-1}$  nöqtəsində sıfıra çevrilir. Bu nöqtədə  $f''(x) = \frac{1}{x}$  törəməsi  $f''(e^{-1}) = e > 0$  olduğundan 2-ci teoremə görə  $x = e^{-1}$  böhran nöqtəsində funksiyanın lokal minimumu var.

### 13.4. Qabarıq və çökük əyrilər

**Tərif 1.** Hamar AB əyrisi hər bir  $M$  nöqtəsinə çəkilmiş toxunandan aşağıda (yuxarıda) yerləşərsə, onda AB əyrisinə qabarıq (çökük) əyri deyilir (şəkil 4 və 5).



Şəkil 4.



Şəkil 5.

Bəzi kitablarda qabarıq və çökük sözləri yerinə “qabarıqlığı yuxarıya” və “qabarıqlığı aşağıya” yönəl-

miş əyriyə deyirlər. Biz “qabarıq” və “çökük” məvhumlarını işlədəcəyik.  $M(x_0, y_0)$  əyrinin hər hansı bir nöqtəsi,  $y=f(x)$  isə  $(a \leq x \leq b)$  0 əyrinin tənliyi olsun. Bu halda  $M_0$  nöqtəsində əyriyə çəkilmiş toxunanın tənliyi  $Y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ ;  $Y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$  (1) olar.  $N(x, y)$  toxunanın,  $M_1(x, y) = M_1(x, f(x))$  isə AB əyrisinin  $x$ -ə uyğun nöqtələri olsun. Onda, qabarıq əyri üçün  $y \leq Y$  (2) çökük əyri üçün isə  $y \geq Y$  (3) olacağı aydındır. Ona görə də bir əyrinin qabarıq və ya çökük olacağını göstərmək üçün (2) və ya (3) bərabərsizliklərinin doğru olduğunu göstərmək kifayət olar. (1)-dən və əyrinin  $y=f(x)$  tənliyindən yazıla bilər:

$$y - Y = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0).$$

Burada Laqranj düsturunu tətbiq etsək,

$$y - Y = f'(c_1) \cdot (x - x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = [f'(c_1) - f'(x_0)](x - x_0)$$

alırıq,  $c_1$  isə  $x$  ilə  $x_0$  arasında bir nöqtədir. Yenidən Laqranj teoremini tətbiq etsək,

$$y - Y = f''(c_2)(c_1 - x_0)(x - x_0) \quad (4)$$

bərabərliyini almış olarıq burada  $c_2$ ,  $c_1$  ilə  $x_0$  arasında bir nöqtədir.

**Teorem 1.** Əgər  $(a, b)$  aralığında  $f''(x) < 0$  isə, onda  $y=f(x)$  əyrisi bu aralıqda qabarıq,  $f''(x) > 0$  olduqda isə çökük olur.

**İsbatı.** (4) bərabərliyində  $x_0, x, c_1, c_2$  kimi dörd nöqtə vardır və onların iki formada düzülüşü mümkündür:

$$I) x < x_0 \Rightarrow x < c_1 < c_2 < x_0 \text{ və}$$



$$\text{II) } x > x_0 \Rightarrow x > c_1 > c_2 > x_0.$$



Əvvəlcə:

I) hala baxaq. Bu halda  $c_1 - x_0 < 0, x - x_0 < 0$  olduğundan  $(c_1 - x_0)(x - x_0) > 0$  olar.

$f''(x) < 0$  qəbul etsək, onda  $y < Y < 0, y < Y$  olar.

Əgər  $f''(x) < 0$  olmaqla

II) hala baxmış olsaydıq, onda da  $y < Y$  olduğunu görürdik. Beləliklə,  $f''(x) < 0$  olduqda əyri  $(a, b)$  intervalında qabarıq olur. Əgər  $f''(x) > 0$  olsa, o zaman yenə də (4) düsturundan asanlıqla görünür ki, I) və II) halların hər ikisində  $y > 0, y > Y$  olur ki, bu da  $(a, b)$  aralığında  $y = f(x)$  əyrisinin çökük olması deməkdir.


**Tərif 2.**  $y = f(x)$  əyrisi üzərində olub, onun qabarıq hissəsini çökük hissəsindən ayıran  $M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsinə əyrinin dönmə nöqtəsi deyilir.

Dönmə nöqtəsinə tapmaq üçün aşağıdakı teoremdən istifadə etmək olar:

**Teorem 2.** Əgər  $y = f(x)$ -in  $(a, b)$  aralığında  $f', f''$  kəsilməz törəmələri varsa (burada  $x_0$ -müstəsna ola bilər!) və  $x_0$ -dan keçdikdə  $f''(x)$  öz işarəsini dəyişirsə, onda  $M_0(x_0, f(x_0))$  dönmə nöqtəsidir.

Əlavə olaraq  $x_0$  nöqtəsində  $f''$  varsa, onda  $f''(x_0) = 0$  olmalıdır. Verilən təriflərdən görünür ki, dönmə nöqtəsində əyrinin toxunanı 0 əyrini kəsir və onun bir tərəfindən digər tərəfinə keçir. Məsələn,  $x_0 = \pi$  nöqtə-

sində  $y=\sin x$  əyrisinə çəkilməmiş toxunan  $y=\pi-x$  olar və bu düz xətt  $y=\sin x$  əyrisini  $x=\pi$ , yəni



**Şəkil 6.**

$(\pi,0)$  nöqtəsində kəsir.  $(\pi,0)$  nöqtəsindən solda əyri qabarıq, sağda isə çökükdür (şəkil 6).

Solda əyri toxunanın altında, sağda isə üstündə qalır. Başqa bir misal olaraq  $y = e^{-x^2}$  əyrisinə baxaq (şəkil 7). Bu əyri üçün:

$$y' = -2xe^{-x^2}, \quad y'' = -2e^{-x^2} + 4x^2e^{-x^2} = 2e^{-x^2}(2x^2 - 1); \quad y'' = 0$$


olması üçün  $x_1 = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ,  $x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$  olmalıdır.

$|x| > \frac{1}{\sqrt{2}}$  olduqda  $y'' > 0$ ,  $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$  olduqda isə  $y'' < 0$  olur.

Bu isə o deməkdir ki,  $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  intervalında əyri qabarıqdır,

$\left(-\infty, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$  və  $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, +\infty\right)$  intervallarında isə

çökükdür (şəkil 7).




**Şəkil 7.**

yəni  $y = e^{-x^2}$  əyrisinin  $M_1\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-\frac{1}{2}}\right)$  və  $M_2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, e^{-\frac{1}{2}}\right)$  kimi

iki dönmə nöqtəsi vardır.

### Əyrinin asimptotları haqqında

1. Sonsuz uzaqlaşmış nöqtələri olan Q əyrisi və  $\ell$  düz xətti verilmiş olsun (şəkil 8). M nöqtəsi Q əyrisi üzərində qalaraq  $M \rightarrow \infty$  olduqda  $\rho(Q, \ell) = (MN) = \rho$ .



**Şəkil 8.**

məsafəsi  $\rho \rightarrow 0$  olarsa,  $\ell$  düz xəttinə Q əyrisinin asimptotu deyilir.

Şaquli və maili olmaqla iki növ asimptotlardan danışmaq olar.

1) Şaquli asimptot (əgər varsa!) ordinat oxuna paralel olan asimptotlara deyilir.


Deməli, əyrinin  $y=f(x)$  tənliyi verildikdə elə  $x=x_0$  axtarılmalıdır ki,  $x \rightarrow x_0$  olduqda  $y=f(x) \rightarrow \infty$  olsun. Bu zaman  $x=x_0$  düz xətti  $y=f(x)$  əyrisinin şaqulu asimptotu olur.

2) Ordinat oxuna paralel olmayan asimptota isə maili asimptot deyilir.

Hər belə düz xətt  $y=kx+b$  kimi bir tənliklə ifadə oluna bilər. Burada da iki hal ola bilər:

a)  $k=0$ . yəni  $y=b$  olmaqla absis oxuna paralel olan asimptot alınır. Göründüyü kimi bu halda  $y$  sonsuzluğa yaxınlaşa bilməz, ancaq  $y \rightarrow b$  ola bilər. Deməli  $M(x,y) \rightarrow \infty$  olması ancaq  $x \rightarrow \infty$  olduqda mümkün olar. Ona görə də  $x \rightarrow \infty$  olduqda,  $y \rightarrow b$  olarsa,  $y=b$  düz xətti  $y=f(x)$  əyrisinin absis oxuna paralel asimptotu olur.

b)  $k \neq 0$ . Bu halda asimptot koordinat oxlarının heç birinə paralel olmaz. Deməli, bu tipli asimptotun varlığını şərtləndirən düsturlara ehtiyac vardır.  $M(x,y) \in \ell$  ixtiyari nöqtə olsun (şəkil 9). Bu nöqtənin  $y=kx+b$  düz xəttindən olan uzaqlığı



**Şəkil 9.**

$$\rho(M, \ell) = \frac{(kx - y + b)}{\sqrt{1 + k^2}} = \frac{(y - kx - b)}{\sqrt{1 + k^2}}$$

olur və  $\rho \rightarrow 0$  olması  $\lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx - b) = 0$  olması deməkdir.

Buradan görünür ki,

$$K = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad (1)$$

olur. Əgər bu limit yoxdursa, onda əyrinin maili asimptotu yoxdur. Əgər (1) limiti varsa, onda

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - k \cdot x] \quad (2)$$

limitinə baxılır. Bu limit də yoxdursa, maili asimptot yoxdur. Əgər (2) limiti də varsa, onda  $k$  və  $b$  sabitləri (1) və (2), düsturları ilə hesablanır və maili asimptotun  $y=kx+b$  tənliyi yazılır.

2) Qeyd edək ki, bir əyrinin sonsuz sayda şaquli asimptotu ola bildiyi halda, ən çoxu iki maili asimptotu ola bilər:  $x \rightarrow -\infty$  və  $x \rightarrow +\infty$  hallarında

Məsələn, a)  $y = \operatorname{tg} x$  əyrisinin sonsuz sayda şaquli asimptotu var:  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$  ( $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ) şəklində olan düz xətlərin hər biri belə asimptotdur.

b)  $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$  əyrisinin heç bir şaqulu asimptotu yoxdur. Lakin  $y=0$  onun maili asimptotudur.

v)  $y = \frac{x}{(x-1)(x-2)}$  əyrisinin  $x=1$  və  $x=2$  kimi iki şaquli asimptotu var.

Bu əyri üçün

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{(x-1)(x-2)} = 0,$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - k \cdot x] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{(x-1)(x-2)} = 0$$

olduğundan,  $y=0 \cdot k + 0 = 0$  (absus oxu) onun maili asimptotudur.



3. Parametrik şəkildə.  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$  şəklində verilmiş əyrilər üçün bu asimptotların olub-olmaması aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilir:

a) əgər elə  $t_0$  varsa ki,  $t \rightarrow t_0$  olduqda  $x \rightarrow x_0$ ,  $y \rightarrow \infty$  olsun, onda  $x = x_0$  şaquli asimptot olur;

b) əgər elə  $t_0$  varsa ki,  $t \rightarrow t_0$  olduqda  $x \rightarrow \infty$ ,  $y \rightarrow y_0$  olsun, onda  $y = y_0$  absis oxuna paralel asimptot olur;

c) əgər elə  $t_0$  varsa ki,  $t \rightarrow t_0$  olduqda  $x \rightarrow \infty$ ,  $y \rightarrow \infty$  olmaqla, sonlu

$$k = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\psi(t)}{\varphi(t)} = k_0, \quad b = \lim_{t \rightarrow t_0} [\psi(t) - k_0 \cdot \varphi(t)]$$

limitləri olsun, onda əyrinin  $y = k_0 x + b$  maili asimptotu var.

**Misal 1.**  $\begin{cases} x = \frac{t}{t-1} \\ y = \frac{t+2}{t+1} \end{cases}$  olsun.

a)  $t \rightarrow 1$  - da  $x \rightarrow \infty$ ,  $y \rightarrow \frac{3}{2}$  Deməli  $y = \frac{3}{2}$  asimptotudur.

b)  $t \rightarrow -1$  - da  $y \rightarrow \infty$ ,  $x \rightarrow \frac{1}{2}$  olduğundan,  $x = \frac{1}{2}$  şaquli asimptotdur.

c) elə  $t = t_0$  yoxdur ki,  $t \rightarrow t_0$  olduqda eyni zamanda həm  $x \rightarrow \infty$  həm də  $y \rightarrow \infty$  olsun. Bu isə o deməkdir ki, maili asimptot ( $y = kx + b$ ,  $k \neq 0$ ) yoxdur.

**Misal 2.**  $x = \frac{2t}{t^2 - 1}$ ,  $y = \frac{t^2}{t - 1}$  parametrik tənliklərlə verilmiş əyri üçün

a)  $t \rightarrow \infty$  olduqda  $x \rightarrow 0$ ,  $y \rightarrow \infty$  olduğundan,  $x = 0$  şaquli asimptotdur;

b)  $t \rightarrow -1$  olduqda  $x \rightarrow \infty$ ,  $y \rightarrow -\frac{1}{2}$  olduğu üçün  $y = -\frac{1}{2}$  absis oxuna paralel asimptotdur;

c)  $t \rightarrow 1$  olduqda  $x \rightarrow \infty$ ,  $y \rightarrow \infty$  olur və buradan

$$k = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{y}{x} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t(t+1)}{2} = 1,$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{t \rightarrow 1} (y - 1 \cdot x) = \lim_{t \rightarrow 1} \left( \frac{t^2}{t-1} - \frac{2t}{t^2-1} \right) = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2(t-1) - 2t}{t^2-1} = \\ &= \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^3 + t^2 - 2t}{(t-1)(t+1)} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{t^2 + 2t}{t+1} = \frac{3}{2}; \quad y = kx + b = x + \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

(maili asimptot).

### 13.5. Funksiyanın qrafikinin qurulması

Bütün deyilənləri yekunlaşdıraraq, funksiyanın araşdırılmasının aşağıdakı sxemini almış oluruq.

1. Verilmiş  $y=f(x)$  ifadəsinin varlıq oblastını, kəsilməzlik oblastını, kəsilmə nöqtələrini müəyyənləşdirmək;
2. Funksiyanın sabitlik oblastlarını tapmaq;
3. Funksiyanın monotonluq intervallarını tapmaq;
4. Funksiyanın lokal ekstremumlarını tapmaq;
5. Funksiyanın mütləq maksimum və mütləq minimumlarını tapmaq;
6. Funksiyanın qabarılıq, çöküklük intervallarını, habelə dönmə nöqtələrini tapmaq;
7. Funksiyanın asimptotlarını araşdırmaq və tapmaq;
8. Əldə edilənlərin hamısını Koordinat sistemində köçürüb  $y=f(x)$  əyrisini tapmaq;

**Qeyd.** Qrafikin daha dəqiq olması üçün funksiyanın tək-cütlük, periodiklik kimi xassələrini, oxlarla kəşismə nöqtələrini və bu kimi əlavə xassələrini də öyrənmək olar.

## XIV FƏSİL. İBTİDAİ FUNKSIYA VƏ QEYRİ-MÜƏYYƏN İNTEQRAL

### 14.1.1. İbtidai funksiya və qeyri müəyyən inteqralın tərifı

Məlumdur ki, diferensial hesabının əsas məsələsi verilən funksiyanın törəməsinin və ya diferensialının tapılmasından ibarətdir. Praktikada tez-tez funksiyanın törəməsinin tapılmasına tərs olan məsələnin həlli lazım gəlir. Başqa sözlə biz tez-tez törəməsi verilən funksiyanın özünü tapmaq məsələsi ilə rastlaşırıq. Bu məsələ inteqral hesabının əsas məsələsi hesab olunur.

**Tərif 1.** Müəyyən bir aralıqda  $F(x)$  funksiyanın törəməsi  $f(x)$  funksiyanına bərabər olarsa,  $F(x)$  funksiyası həmin aralıqda  $f(x)$  funksiyanının **ibtidai funksiyası** adlanır, yəni

$$F'(x) = f(x) \quad (1)$$

$F(x) = x^4$  funksiyası  $f(x) = 4x^3$  funksiyanın ibtidai funksiyasıdır, çünki

$$F'(x) = 4x^3 = f(x), \quad x \in \mathbf{R}.$$

Aydındır ki,  $F_1(x) = x^4 + 1$ ,  $F_2(x) = x^4 - 3$  və ümumiyyətlə,  $F_3(x) = x^4 + C$  ( $C$ - ixtiyari sabitdir) şəklində olan funksiyaların hər biri  $f(x) = 4x^3$  funksiyanın ibtidai funksiyasıdır.

Bu misal onu göstərir ki, verilən funksiyanın ibtidai funksiyası varsa, belə funksiyalar sonsuz saydadır.

**Teorem.** Müəyyən bir aralıqda verilən funksiyanın iki müxtəlif ibtidai funksiyası həmin aralıqda bir-birindən sabit toplananla fərqlənir.

Tutaq ki,  $F_1(x)$  və  $F_2(x)$  funksiyaları  $(a, b)$  aralığında  $f(x)$  funksiyanın ibtidai funksiyalarıdır.

$$F'_1(x)=f(x) \text{ v} \acute{e} F'_2(x)=f(x).$$

$F'_1(x)=F'_2(x)$  olduđuna g\or\ae  $F_1(x)$  v\ae  $F_2(x)$  funksiyaları bir-birind\en ancađ sabit toplananla f\erql\enir.

$$F_1(x)-F_2(x)=C.$$

**T\arif 2.**  $f(x)$  funksiyasının b\ut\un ibtidai funksiyalarının \c{o}xluđuna onun **qeyri-m\ueyy\en inteqralı deyilir** v\ae bu  $\int f(x)dx$  kimi i\sa r\ae edilir.

$\int f(x)dx$  yazılı\ında  $f(x)$  funksiyası inteqralaltı funksiya,  $f(x)dx$  is\ae **inteqralaltı ifad\ae** adlanır.

Yuxarıda isbat edil\en teoremd\en \c{ı}xır ki, \aeđer  $F(x)$  funksiyası m\ueyy\en bir aralıqda  $f(x)$  funksiyasının ibtidai funksiyadırsa, onda bu funksiyanın b\ut\un ibtidai funksiyaları \c{o}xluđu

$$F(x) + C, \quad C \in (-\infty, +\infty)$$

d\usturu il\ae verilir. Bu o dem\ekdir ki,

$$\int f(x)dx = F(x) + C.$$

Funksiyanın qeyri-m\ueyy\en inteqralının tapılması \ae m\aeliyyatı **inteqrallama** adlanır.

Misal.  $f(x) = x^2 + 5$  funksiyasının qeyri-m\ueyy\en inteqralını tapın.

**H\elli.**

$$\int (x^2 + 5)dx = \frac{1}{3}x^3 + 5x + C,$$

\c{u}nki

$$\left(\frac{1}{3}x^3 + 5x + C\right)' = x^2 + 5.$$

### 14.1.2. Qeyri-m\ueyy\en inteqralın \ae sas xass\el\eri

1. Qeyri-m\ueyy\en inteqralın t\or\em\esi inteqralaltı funksiya b\er\eb\erdir:

$$(\int \mathbf{f}(\mathbf{x})d\mathbf{x})' = \mathbf{f}(\mathbf{x}).$$

Bu xassə bilavasitə qeyri-müəyyən inteqralın tərifindən alınır.

2. Funksiyanın törəməsinin inteqralı həmin funksiyanın özü ilə sabit toplananın cəminə bərabərdir:

$$\int \boldsymbol{\varphi}'(\mathbf{x})d\mathbf{x} = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{x}) + \mathbf{C}.$$

3. Sıfırdan fərqli sabit vuruğu inteqral işarəsi qarşısına çıxarmaq olar:

$$\int \mathbf{A}\mathbf{f}(\mathbf{x})d\mathbf{x} = \mathbf{A} \int \mathbf{f}(\mathbf{x})d\mathbf{x}.$$

Tutaq ki,  $F(\mathbf{x})$  funksiyası  $f(\mathbf{x})$  funksiyasının ibtidai funksiyasıdır. Onda (1) düsturuna görə

$$\mathbf{A} \int \mathbf{f}(\mathbf{x})d\mathbf{x} = \mathbf{A}(F(\mathbf{x}) + \mathbf{C}) = \mathbf{A}F(\mathbf{x}) + \mathbf{A}\mathbf{C} = \mathbf{A}F(\mathbf{x}) + \mathbf{C}_1 \quad (1)$$

Bu düsturda həm  $\mathbf{C}$  və həm də  $\mathbf{C}_1 = \mathbf{A}\mathbf{C}$  ixtiyari sabitlərdir. Digər tərəfdən

$$(\mathbf{A}F(\mathbf{x}))' = \mathbf{A}F'(\mathbf{x}) = \mathbf{A}f(\mathbf{x})$$

olduğu üçün

$$\int \mathbf{A}f(\mathbf{x})d\mathbf{x} = \mathbf{A}F(\mathbf{x}) + \mathbf{C}_1 \quad (2)$$

(1) və (2) düsturlarından

$$\int \mathbf{A}f(\mathbf{x})d\mathbf{x} = \mathbf{A} \int \mathbf{f}(\mathbf{x})d\mathbf{x}$$

bərabərliyi alınır.

4. İki funksiyanın cəminin qeyri-müəyyən inteqralı onların qeyri-müəyyən inteqralının cəminə bərabərdir:

$$\int [\mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})]d\mathbf{x} = \int \mathbf{f}(\mathbf{x})d\mathbf{x} + \int \mathbf{g}(\mathbf{x})d\mathbf{x}$$

Tutaq ki,  $F(\mathbf{x})$  və  $G(\mathbf{x})$  funksiyaları uyğun olaraq  $f(\mathbf{x})$  və  $g(\mathbf{x})$  funksiyalarının ibtidai funksiyalarıdır:

$F'(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$ ,  $G'(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x})$ . Onda müəyyən inteqralın tərifinə

$$\int \mathbf{f}(\mathbf{x})d\mathbf{x} + \int \mathbf{g}(\mathbf{x})d\mathbf{x} = [\mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{C}_1] + [\mathbf{G}(\mathbf{x}) + \mathbf{C}_2] = [\mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{G}(\mathbf{x})] + (\mathbf{C}_1 + \mathbf{C}_2) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{G}(\mathbf{x}) + \mathbf{C} \quad (3)$$

Bu düsturda  $C_1, C_2$  və  $C$  ixtiyari sabitlərdir. Digər tərəfdən

$$[\mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{G}(\mathbf{x})]' = \mathbf{F}'(\mathbf{x}) + \mathbf{G}'(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})$$

olduğu üçün düsturuna görə

$$\int [\mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})] \mathbf{d}\mathbf{x} = [\mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{G}(\mathbf{x})] + \mathbf{C} \quad (4)$$

olar. (3) və (4) düsturlarından

$$\int [\mathbf{f}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x})] \mathbf{d}\mathbf{x} = \int \mathbf{f}(\mathbf{x}) \mathbf{d}\mathbf{x} + \int \mathbf{g}(\mathbf{x}) \mathbf{d}\mathbf{x}$$

düsturu alınır.

### 14.2.1. Əsas inteqrallar cədvəli

Qeyri müəyyən inteqralın tərifinə görə, əgər  $F(x)$  funksiyası  $f(x)$  funksiyasının ibtidai funksiyasıdırsa, onda

$$\int \mathbf{f}(\mathbf{x}) \mathbf{d}\mathbf{x} = \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{C}(1)$$

**Misal.** İnteqralı hesablayın:

$$\int \mathbf{x}^5 \mathbf{d}\mathbf{x}.$$

**Həlli.**  $\left(\frac{x^6}{6}\right)' = x^5$  olduğu üçün (1) düsturuna görə

$$\int \mathbf{x}^5 \mathbf{d}\mathbf{x} = \frac{\mathbf{x}^6}{6} + \mathbf{C}.$$

(1) düsturundan istifadə edərək aşağıdakı düsturların doğru olduğunu yoxlamaq olar:

$$1) \int \mathbf{0} \mathbf{d}\mathbf{x} = \mathbf{C},$$

$$2) \int \mathbf{x}^{\alpha} \mathbf{d}\mathbf{x} = \frac{\mathbf{x}^{\alpha+1}}{\alpha+1} \quad (\alpha \neq -1 \text{ və } \alpha \text{ sabit ədəddir}).$$

$$3) \int \frac{\mathbf{d}\mathbf{x}}{\mathbf{x}} = \ln|\mathbf{x}| + \mathbf{C}, \quad (\mathbf{x} \neq 0 \text{ olduğu hər bir intervalda})$$

$$4) \int \mathbf{a}^{\mathbf{x}} \mathbf{d}\mathbf{x} = \frac{\mathbf{a}^{\mathbf{x}}}{\ln \mathbf{a}} + \mathbf{C}, \quad (\mathbf{a} > 0, \mathbf{a} \neq 1), \text{ a xüsusi hal-}$$

da  $\mathbf{a}=\mathbf{e}$  olarsa  $\int \mathbf{e}^{\mathbf{x}} \mathbf{d}\mathbf{x} = \mathbf{e}^{\mathbf{x}} + \mathbf{C}$

$$5) \int \cos \mathbf{x} \mathbf{d}\mathbf{x} = \sin \mathbf{x} + \mathbf{C},$$

$$6) \int \sin \mathbf{x} \mathbf{d}\mathbf{x} = -\cos \mathbf{x} + \mathbf{C},$$

7)  $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \text{tg}x + C$ , ( $\cos x$ -in sıfırdan fərqli olduğu tərki b intervalda)

8)  $\int \frac{dx}{\sin^2} = -\text{ctg}x + C$ , ( $\sin x$ -in sıfırdan fərqli olduğu hər bir intervalda )

$$9) \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C_1,$$

$$10) \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x + C = -\text{arcctg} x + C_1,$$

$$11) \int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| + C,$$

$$12) \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+\alpha}} = \ln|x + \sqrt{x^2 + \alpha}| + C, \quad \alpha \neq 0.$$

$$13) \int \frac{dx}{x^2 \pm a^2} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + c$$

### 14.2.2. İnteqralın doğruluğunun yoxlanılması

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi bu düsturların hər birinin doğruluğunu bilavasitə diferensiallamaqla yoxlamaqla olar.

Məsələn, 13-cü düsturun doğruluğunu yoxlayaq. Sağ tərəfin diferensialını hesablasaq,

$$\begin{aligned} d(\ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C) &= \frac{(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})' dx}{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}} = \\ &= \frac{dx}{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}} \cdot \left( 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \right) = \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \end{aligned}$$

olar, yəni 13-ci düstur doğrudur.

Bu inteqrallar cədvəldən istifadə edərək, bir çox elementar funksiyaların inteqralını hesablamaqla olar.

İnteqralı, cədvəldən istifadə edərək hesablamağa bilavasitə inteqrallama deyilir.



## XV FƏSİL. İNTEQRALLAMA ÜSULLARI. RASİONAL KƏSRLƏRİN İNTEQRALLANMASI

### 15.1. Əsas inteqrallama üsulları haqqında

Qeyri-müəyyən intqeralı hesablamaq üçün onu müəyyən üsullarla cədvəl intqerallarına gətirirlər. Bu üsulların ən çox tətbiq edilən bir neçəsi ilə tanış olaq.

Ən çox istifadə edilən üsullar aşağıdakılardır:

1. Dəyişənlərə ayırma üsulu.
2. Dəyişəni əvəzetmə üsulu.
3. Hissə - hissə ineqrallama üsulu.

**I. Dəyişənlərə ayırma üsulu.** Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyasını elə  $f_1(x)$  və  $f_2(x)$  funksiyalarının cəmi şəklində göstərmək mümkündür ki,

$$\int f_1(x) dx \text{ və } \int f_2(x) dx$$

İnteqralları cədvəl inteqrallarının köməyi ilə hesablanabilir. Onda

$$\int f(x) dx = \int [f_1(x) + f_2(x)] dx$$

inteqralını məlum

$$\int [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int f_1(x) dx + \int f_2(x) dx$$

düsturu ilə hesablamaq olar.

**Misal 1.**

$$\int (x^2 + 3x + \frac{2}{x}) dx = \int x^2 dx + \int 3x dx + \int \frac{2}{x} dx = \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 2\ln|x| + C$$

**Misal 2.**

$$\int \frac{x^3+1}{x^2} dx = \int x dx + \int \frac{dx}{x^2} = \frac{x^2}{2} + \frac{x^{-2+1}}{-2+1} + C = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{x} + C.$$

### Misal 3.

$$\int \left( \frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt[4]{x^3}} \right) dx = \int \frac{dx}{\sqrt{x}} + \int \frac{2dx}{\sqrt[4]{x^3}} = \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + \frac{2x^{-\frac{3}{4}+1}}{-\frac{3}{4}+1} + C$$
$$+ C = 2\sqrt{x} + 8\sqrt[4]{x} + C$$

### Misal 4.

$$\int \cos^2 x dx = \int \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) dx = \int \frac{1}{2} dx + \int \frac{1}{2} \cos 2x dx =$$
$$= \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{4} \int \cos 2x d2x = \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + C.$$

## II. Dəyişəni əvəzetmə üsulu.

Tutaq ki,

$$\int f(x) dx$$

inteqralını hesablamaq lazımdır. Bir çox hallarda elə  $\varphi(x)$  funksiyası tapmaq mümkün olur ki, inteqralaltı ifadəni

$$f(x) dx = g(\varphi(x)) \varphi'(x) dx$$

şəkildə göstərmək,

$$\int g(t) dt$$

inteqralını isə hesablamaq mümkün olur. Bu halda əgər

$$\int g(t) dt = G(t) + C$$

olarsa, onda

$$\int f(x) dx = \int g(\varphi(x)) d\varphi(x) = G(\varphi(x)) + C$$

düsturu doğru olar.

**Misal 5.** İnteqralı hesablayın:

$$\int \frac{dx}{1+\sqrt{x+1}}.$$

**Həlli.**  $\sqrt{x+1} = t$  əvəzləməsi aparaq. Buradan

$$x = t^2 - 1 \text{ və } dx = 2t dt$$

alınır. Ona görə də

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sqrt{x+1}} &= \int \frac{2tdt}{1+t} = \int 2 \left( 1 - \frac{1}{1+t} \right) dt = \\ &= 2 \int dt - 2 \int \frac{d(1+t)}{1+t} = 2t - 2\ln|1+t| + C \\ &= 2\sqrt{x+1} - \end{aligned}$$

$$-2\ln(1 + \sqrt{x+1}) + C.$$

**Misal 6.** İnteqralı hesablayın:

$$\int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}}.$$

**Həlli.**  $\sqrt{x+1} = t$  qəbul edək. Buradan

$$x = t^2 - 1 \text{ və } dx = 2tdt$$

alınır. Onda

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x\sqrt{x+1}} &= \int \frac{2tdt}{(t^2-1)t} = -2 \int \frac{dt}{1-t^2} = \frac{-2}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C = \\ &= \ln \left| \frac{1-\sqrt{x+1}}{1+\sqrt{x+1}} \right| + C \end{aligned}$$

### III. Hissə-hissə inteqrallama üsulu.

Tutaq ki  $u = f(x)$  və  $v = g(x)$  kəsilməz törəmələri olan funksiyalardır. Hasilin diferensialı düsturuna görə

$$d(uv) = u dv + v du.$$

Buradan

$$\int d(uv) = \int u dv + \int v du$$

və ya

$$\int u dv = uv - \int v du$$

düsturu alınır. Bu düstur **hissə-hissə inteqrallama düsturu** adlanır.

Hissə-hissə inteqrallama düsturu o zaman tətbiq edilir ki,  $\int v du$  inteqralı verilmiş  $\int u dv$  inteqralına nisbətən asan hesablınsın.

**Misal 8.** İntegralı hesablayın:

$$\int x \sin x \, dx$$

**Həlli.**  $u=x$  və  $dv=\sin x dx=d(-\cos x)$  götürək və hissə-hissə inteqrallama düsturunu tətbiq edək:

$$\begin{aligned} \int x \sin x \, dx &= \int x d(-\cos x) = -x \cos x - \int (-\cos x) dx = \\ &= -x \cos x + \sin x + C \end{aligned}$$

**Misal 9.** İntegralı hesablayın:

$$\int x e^{-x} \, dx$$

**Həlli.**  $u=x$  və  $dv = e^{-x} dx = d(-e^{-x})$  götürək və hissə-hissə inteqrallama düsturunu tətbiq edək:

$$\begin{aligned} \int x e^{-x} \, dx &= \int x d(-e^{-x}) = -x e^{-x} - \int (-e^{-x}) dx = \\ &= -x e^{-x} - \int e^{-x} d(-x) = -x e^{-x} - e^{-x} + C. \end{aligned}$$

**Misal 10.** İntegralı hesablayın:

$$\int x \operatorname{tg}^2 x \, dx.$$

**Həlli.**  $u=x \sin x$ ,  $dv=\frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = -d\left(\frac{1}{\cos x}\right)$  götürək və hissə-hissə inteqrallama düsturunu tətbiq edək:

$$\begin{aligned} \int x \operatorname{tg}^2 x \, dx &= - \int x \sin x d\left(\frac{1}{\cos x}\right) = -x \sin x \frac{1}{\cos x} + \\ &+ \int \frac{1}{\cos x} (x \sin x) dx = -x \operatorname{tg} x + \int \frac{1}{\cos x} (\sin x + x \cos x) dx \\ &= -x \operatorname{tg} x - \int \frac{d \cos x}{\cos x} + \int x dx = -x \operatorname{tg} x - \ln |\cos x| - \\ &\frac{x^2}{2} + C. \end{aligned}$$

## 15.2. Sadə rasiyal kəsrlərin inteqrallanması. Rasiyal kəsrlərin sadə kəsrlərə ayrılması

Tutaq ki,  $P_m(x)$  və  $Q_n(x)$  uyğun olaraq  $m$  və  $n$  dərəcəli çoxhədlilərdir. Aşağıdakı rasiyal funksiya baxaq:

$$R(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} \quad (1)$$

Burada iki hal mümkündür:

1)  $m < n$ , başqa sözlə rasiyal funksiya düzgün rasiyal kəsr şəklində verilmişdir;

2)  $m \geq n$ , başqa sözlə rasiyal funksiya düzgün olmayan kəsr şəklində verilmişdir.

Düzgün olmayan rasiyal kəsrin surətini məxrəcinə bölməklə onu çoxhədli ilə düzgün rasiyal kəsrin cəmi şəklində göstərmək olar. Beləliklə, rasiyal funksiyaların inteqrallanması düzgün rasiyal kəsrlərin inteqrallanması məsələsinə gətirilir.

**Misal 1.** İnteqralı hesablayın:

$$\int \frac{adx}{bx+c}.$$

**Həlli.**  $\int \frac{adx}{bx+c} = \frac{a}{b} \int \frac{d(bx+c)}{bx+c} = \frac{a}{b} \ln|bx+c| + C.$

**Misal 2.** İnteqralı hesablayın:

$$\int \frac{x^3-5x+7}{x-3} dx.$$

**Həlli.**  $x^3-5x+7$  çoxhədlisini  $(x-3)$ -ə bölməklə inteqrallı funksiyanı

$$\frac{x^3-5x+7}{x-3} = x^2 + 3x + 4 + \frac{19}{x-3}$$

şəklində göstərək. Onda

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 - 5x + 7}{x - 3} dx &= \int \left( x^2 + 3x + 4 + \frac{19}{x - 3} \right) dx = \\ &= \int x^2 dx + 3 \int x dx + 4 \int dx + 19 \int \frac{d(x - 3)}{x - 3} = \\ &= \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 4x + 19 \ln|x - 3| + C. \end{aligned}$$

**Misal 3.** İntegrali hesablayın:

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} \quad (a \neq 0).$$

**Həlli.**  $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \int \frac{d(x/a)}{(x/a)^2 + 1} = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} + C.$

**Misal 4.** İntegrali hesablayın:

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} \quad (a \neq 0).$$

**Həlli.** İntegralaltı funksiyanı

$$\begin{aligned} \frac{1}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{(x + a)(x - a)} = \frac{1}{2a} \frac{(x + a) - (x - a)}{(x + a)(x - a)} = \\ &= \frac{1}{2a} \left( \frac{1}{x - a} - \frac{1}{x + a} \right) \end{aligned}$$

şəklində göstərək. Onda

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 - a^2} &= \frac{1}{2a} \left[ \int \frac{dx}{x - a} - \int \frac{dx}{x + a} \right] = \\ &= \frac{1}{2a} \left[ \ln|x - a| - \ln|x + a| \right] + \\ + C &= \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C. \end{aligned}$$

**Misal 5.** İntegrali hesablayın:

$$\int \frac{xdx}{x^2 \pm a^2}.$$

**Həlli.**  $\int \frac{x dx}{x^2 \pm a^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 \pm a^2)}{x^2 \pm a^2} = \frac{1}{2} \ln|x^2 \pm a^2| + C.$

**Misal 6.** İntegralı hesablayın:

$$\int \frac{dx}{x^2 + 6x - 11}.$$

**Həlli:**  $\int \frac{dx}{x^2 + 6x - 11} = \int \frac{dx}{(x+3)^2 - 20} = \int \frac{d(x+3)}{(x+3)^2 - (\sqrt{20})^2} =$   
 $= \frac{1}{2\sqrt{20}} \ln \left| \frac{(x+3) - \sqrt{20}}{(x+3) + \sqrt{20}} \right| + C = \frac{1}{4\sqrt{5}} \ln \left| \frac{(x+3) - 2\sqrt{5}}{(x+3) + 2\sqrt{5}} \right| + C$

**Misal 7.** İntegralı hesablayın:

$$\int \frac{x dx}{2x^2 - 3x + 4}.$$

**Həlli.**  $\int \frac{x dx}{2x^2 - 3x + 4} = \frac{1}{2} \int \frac{x dx}{x^2 - \frac{3}{2}x + 2} = \frac{1}{2} \int \frac{x dx}{(x - \frac{3}{4})^2 + 2 - \frac{9}{16}}.$

$x - \frac{3}{4} = t$  əvəz edək. Onda

$$\int \frac{x dx}{2x^2 - 3x + 4} = \frac{1}{2} \int \frac{(t + \frac{3}{4}) dt}{t^2 + \frac{23}{16}} = \frac{1}{2} \int \frac{t dt}{t^2 + \frac{23}{16}} +$$

$$+ \frac{3}{8} \int \frac{dt}{t^2 + \frac{23}{16}} = \frac{1}{4} \int \frac{d(t^2 + \frac{23}{16})}{t^2 + \frac{23}{16}} + \frac{3}{8} \int \frac{dt}{t^2 + (\frac{\sqrt{23}}{4})^2} =$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left( t^2 + \frac{23}{16} \right) + \frac{3}{8\sqrt{23}} \operatorname{arctg} \frac{4t}{\sqrt{23}} + C =$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left( \left( x - \frac{3}{4} \right)^2 + \frac{23}{16} \right) + \frac{3}{2\sqrt{23}} \operatorname{arctg} \frac{4x - \frac{3}{4}}{\sqrt{23}} + C =$$

$$= \frac{1}{4} \ln \left( x^2 - \frac{3}{2}x + 2 \right) + \frac{3}{2\sqrt{23}} \operatorname{arctg} \frac{4x - 3}{\sqrt{23}}$$

6-cı və 7-ci misallarda tətbiq edilən qaydalardan istifadə edərək biz həmişə

$$\int \frac{ax+b}{cx^2+dx+e} dx \quad (1)$$

şəklində olan qeyri-müəyyən inteqralı hesablaya bilərik.

Əgər  $cx^2+dx+e$  çoxhədlisinin iki müxtəlif kökü varsa, (1) inteqralını inteqralaltı funksiyanı sadə kəsrlərin cəmi şəklində göstərməklə hesablamaq daha əlverişli olur.

**Misal 8.** İnteqralı hesablayın:

$$\int \frac{x-3}{x^2-3x-4} dx$$

**Həlli.**  $x^2-3x-4$  çoxhədlisinin iki müxtəlif kökü var:  $x_1=-1$  və  $x_2=4$ . Bu halda məlumdur ki, inteqralaltı funksiyanı

$$\frac{x-3}{x^2-3x-4} = \frac{A}{x-x_1} - \frac{B}{x-x_2}$$

şəklində göstərmək olar. Burada A və B naməlum əmsallərdir.

Onları

$$\frac{x-3}{x^2-3x-4} = \frac{A(x-4) + B(x+1)}{(x+1)(x-4)}$$

və ya

$$(A+B)x-4A+B=x-3$$

eyniliyindən təyin edə bilərik:

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -4A+B=-3 \end{cases} \begin{cases} A=\frac{4}{5} \\ B=\frac{1}{5} \end{cases}$$

Beləliklə, inteqralaltı funksiya

$$\frac{x-3}{x^2-3x-4} = \frac{4}{5(x+1)} + \frac{1}{5(x-4)}$$



şəklində göstərilə bilər. Onda

$$\int \frac{x-3}{x^2-3x-4} dx = \frac{4}{5} \int \frac{d(x+1)}{x+1} + \frac{1}{5} \int \frac{d(x-4)}{x-4} = \frac{4}{5} \ln|x+1| + \frac{1}{5} \ln|x-4| + C.$$

### 15.3. İrrasional kəsrlərin inteqralı

İrrasional funksiyaları inteqrallamaq üçün elə əvəzləmə aparılır ki, həmin funksiya rasiyal funksiyaya çevrilir.

**Misal 1.**  $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x+3}}$ .

**Həlli.**  $\sqrt{x+3} = t$  əvəz edək. Buradan  $x=t^2-3$  və  $dx=2tdt$  düsturları alınır. Ona görə də

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{x+3}} &= \int \frac{2t(t^2-3)^2}{t} dt = 2(t^4 dt - 6 \int t^2 dt + \\ &+ 9 \int dt = 2 \left( \frac{t^5}{5} - 6 \frac{t^3}{3} + 9t \right) + C = \frac{2}{5} (x+3)^{\frac{5}{2}} - \\ &- 4(x+3)^{\frac{3}{2}} + 18(x+3)^{\frac{1}{2}} + C \end{aligned}$$

**Misal 2.**  $\int \frac{dx}{\sqrt[4]{x+\sqrt{x}}}$ .

**Həlli:**  $\sqrt[4]{x} = t$  əvəz edək. Onda

$$x=t^4, \sqrt{x} = t^2 \text{ və } dx = 4t^3 dt.$$

Ona görə

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt[4]{x+\sqrt{x}}} &= \int \frac{4t^3 dt}{t+t^2} = 4 \int \frac{t^2 dt}{1+t} = 4 \int \frac{t^2-1+1}{t+1} dt = \\ &= 4 \int \frac{t^2-1}{t+1} dt + 4 \int \frac{dt}{t+1} = 4 \int \frac{dt}{t+1} = 4 \int t dt - 4 \int dt + \\ &+ 4 \int \frac{d(t+1)}{t+1} = 4 \cdot \frac{t^2}{2} - 4t + 4 \ln|t+1| + C = \\ &= 2\sqrt{x} - 4\sqrt[4]{x} + 4 \ln(\sqrt[4]{x} + 1) + C \end{aligned}$$

**Misal 3.**  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}}, a \neq 0.$

**Həlli.** Bu inteqralı hesablamaq üçün Eyler əvəzləməsi aparaq:

$$\sqrt{x^2+a} = t - x.$$

Buradan

$$a = t^2 - 2tx$$

bərabərliyi alınır. Bu bərabərliyin hər tərəfini diferensiallayaq:

$$0 = 2t dt - 2x dt - 2tdx$$

və ya

$$t dx = (t-x)dt$$

Bu bərabərlikdən

$$\frac{dx}{t-x} = \frac{dt}{t} \text{ və ya } \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \frac{dt}{t}$$

alınır. Beləliklə,

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C.$$

Buradan  $t = \sqrt{x^2+a} + x$  olduğunu nəzərə alıb

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a}} = \ln|\sqrt{x^2+a} + x| + C$$

cədvəl inteqralını alırıq.

**Misal 4.**  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}, a > 0.$

**Həlli.**  $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \int \frac{d(x/a)}{\sqrt{1-(x/a)^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C.$

Aşağıdakı inteqrala baxaq:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{ax^2+bx+c}}, a \neq 0.$$

Bu inteqralın hesablanması a-nın işarəsindən asılı olaraq 3-cü və 4-cü misalda baxılan hallardan birinə gətirilir.

**Misal 5.**  $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+5x+6}}$ .

**Həlli.**

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+5x+6}} &= \int \frac{d\left(x+\frac{5}{2}\right)}{\sqrt{\left(x+\frac{5}{2}\right)^2+\frac{1}{4}}} = \\ &= \ln \left| \sqrt{\left(x+\frac{5}{2}\right)^2+\frac{1}{4}}+x+\frac{5}{2} \right| + C = \\ &= \ln \left| \sqrt{x^2+5x+6}+x+\frac{5}{2} \right| + C. \end{aligned}$$

### 15.4. Triqonometrik funksiyalar daxil olan ifadələrin inteqrallanması

**1. Universal əvəzləmə.** Tutaq ki,

$$\int R(\sin x, \cos x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x, \sec x, \operatorname{cosec} x) dx \quad (1)$$

şəklində inteqralın hesablanması tələb olunur.  $\operatorname{tg} x$ ,  $\operatorname{ctg} x$ ,  $\sec x$  və  $\operatorname{cosec} x$  funksiyaları hesab əməlləri vasitəsilə  $\sin x$  və  $\cos x$  ilə ifadə olunduğundan

$$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \operatorname{ctg} x = \frac{\cos x}{\sin x}, \sec x = \frac{1}{\cos x}, \operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$$

(1) inteqralı həmişə

$$\int R(\sin x, \cos x) dx \quad (2)$$

şəklində inteqrala çevrilir. Buna görə də ancaq (2) inteqralının hesablanması ilə məşğul olaq. (2) inteqralında

$$\operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \quad (3)$$

əvəzləməsini paraq:

$$\begin{aligned} x &= 2 \arctg t, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \\ \sin x &= 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x &= \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1-t^2}{1+t^2}. \end{aligned}$$

Onda həmin inteqral  $t$  dəyişənindən asılı funksiyanın inteqralına çevrilir:

$$\begin{aligned} \int R(\sin x, \cos x) dx &= \\ &= \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2dt}{1+t^2} \\ &= \int R(t) dt. \end{aligned}$$

Rasional funksiyanın inteqralı isə hesablanı bilər.

Deməli, (2) şəklində hər bir inteqral (3) əvəzləməsi vasitəsilə rasional funksiyanın inteqralına gətirilir. Buna görə də (3) əvəzləməsinə “**universal triqonometrik əvəzləmə**” deyilir. Universal triqonometrik əvəzləmə bəzən çox mürəkkəb rasional funksiyanın inteqralına gətirir. Belə hallarda digər əvəzləmələrdən istifadə etmək daha faydalı olur.

**Misal 1.**  $J_1 = \int \frac{dx}{\sin^2 x}$  inteqralını hesablamaq üçün (3) əvəzləməsindən istifadə edək. Onda

$$\begin{aligned}
 J_1 &= \int \left( \frac{1+t^2}{2t} \right)^2 \frac{2dt}{1+t^2} = \\
 &= \frac{1}{2} \int \frac{1+t^2}{t^2} dt = \frac{1}{2} \int \frac{dt}{t^2} + \frac{1}{2} \int dt = -\frac{1}{2} \cdot \\
 &\cdot \frac{1}{t} + \frac{1}{2}t + C = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2}} + \frac{1}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} + C.
 \end{aligned}$$

## 2. $\int \sin^m x \cos^n x dx$ şəklində inteqrallar.

Burada  $m$  və  $n$  rasional ədədlər olduqda  $t = \sin x$  və ya  $t = \cos x$  əvəzləməsi vasitəsilə verilmiş inteqral binomial diferensialın inteqralına gətirilir. Doğrudan da,  $t = \cos x$  əvəzləməsini götürsək, onda

$$\begin{aligned}
 \sin x &= (1 - \cos^2 x)^{\frac{1}{2}} = (1 - t^2)^{\frac{1}{2}}, \quad dt = -\sin x dx \\
 dx &= -(1 - t^2)^{-\frac{1}{2}} dt
 \end{aligned}$$

olur və verilmiş inteqral

$$\int \sin^m x \cos^n x dx = - \int t^n (1 - t^2)^{\frac{m-1}{2}} dt$$

şəklinə gətirilir ki, bu da binomial diferensialın inteqralıdır.  $m$  və  $n$  tam ədədlər olduqda verilmiş inteqral ya bilavasitə hesablanan inteqral, ya da rasional funksiyanın inteqralına gətirilir.

a) Tutaq ki,  $m = 2k + 1$  ( $m$  istənilən tam ədəddir). Onda verilmiş inteqral  $t = \cos x$  əvəzləməsi vasitəsilə rasional funksiyanın inteqralına gətirilir:

$$\begin{aligned}
 \int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^n x dx &= - \int \sin^{2k} x \cdot \\
 \cos^n x d(\cos x) &= - \int (1 - \cos^2 x)^k \cos^n x d(\cos x) = \\
 &= \int (1 - t^2)^k t^n dt.
 \end{aligned}$$

b)  $n=2k+1$  ( $n$  istənilən tam ədəddir) olduqda  $t=\sin x$  əvəzləməsi vasitəsilə verilmiş inteqral rasiyal funksiyanın inteqralına gətirilir.

c)  $m$  və  $n$  ədədlərinin hər ikisi  $m = 2k > 0$  və  $n = 2N > 0$  kimi müsbət cüt ədədlər olduqda

$$\sin^2 x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x, \quad \cos^2 x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x \quad (4)$$

düsturları vasitəsilə verilmiş inteqral

$$\int \sin^{2k} x \cos^{2N} x dx$$

$$= \int \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x \right)^k \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2x \right)^N dx$$

kimi yazılır. İnteqral altındakı ikihədliləri göstərilən dərəcədən qüvvətə yüksəltdikdən sonra  $\cos 2x$ -in qüvvətlərinə nəzərən çoxhədlili alınır. Təkdərəcəli hədlər b) halında göstərilən qayda ilə hesablanır. Cütdərəcəli hədlərin inteqralını isə (4) düsturlarını yenidən tətbiq etməklə kiçik dərəcəli qüvvətlərin inteqralına gətirirlər. Bu proses  $\int \cos kx dx$  inteqralına gəlib çıxana qədər davam etdirilir.

d)  $m$  və  $n$  ədədlərinin heç olmasa biri mənfi cüt ədəd olduqda  $t = \operatorname{tg} x$  və yaxud  $t = \operatorname{ctg} x$  əvəzləməsi vasitəsilə verilmiş inteqral ya bilavasitə hesablanan inteqrala, ya da rasiyal funksiyanın inteqralına gətirilir.

**Misal 2.**  $J_2 = \int \cos^4 x dx$  inteqralını hesablamaq üçün (4) düsturlarının ikincisindən istifadə edək :

$$J_2 = \frac{1}{4} \int (1 + \cos 2x)^2 dx = \frac{1}{4} \int dx + \frac{1}{2} \int \cos 2x dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 2x dx = \frac{1}{4} x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{4} \int \frac{1 + \cos 4x}{2} dx = \frac{1}{4} x +$$

$$\frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{8} x + \frac{1}{32} \sin 4x + C = \frac{3}{8} x + \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C.$$

3. Triqonometrik funksiyların hasılı daxil olan

$\int \sin \alpha x \sin \beta x dx$ ,  $\int \sin \alpha x \cos \beta x dx$ ,  $\int \cos \alpha x \cos \beta x dx$   
inteqralları

$$\sin \alpha x \cdot \sin \beta x = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) x - \cos(\alpha + \beta) x],$$

$$\sin \alpha x \cdot \cos \beta x = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) x + \sin(\alpha - \beta) x],$$

$$\cos \alpha x \cdot \cos \beta x = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) x + \cos(\alpha - \beta) x].$$

düsturlarını tətbiq etdikdə bilavasitə hesablanır.

4. Triqonometrik funksiylar daxil olan

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx \text{ və } \int e^{\alpha x} \sin \beta x dx.$$

inteqrallarını hesablamaq üçün

$$(e^{\alpha x} \cos \beta x)' = e^{\alpha x} (\alpha \cos \beta x - \beta \sin \beta x),$$

$$(e^{\alpha x} \sin \beta x)' = e^{\alpha x} (\alpha \sin \beta x + \beta \cos \beta x).$$

bərabərliklərindən inteqralaltı funksiyları tapaq:

$$e^{\alpha x} \cos \beta x = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} (e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x)' + \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} (e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x),$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \beta^2} (e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x)' - \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2} (e^{\alpha x} \cos \beta x).$$

Bu bərabərlikləri inteqrallasaq, alarıq:

$$\int e^{\alpha x} \cos \beta x dx = \frac{(\alpha \cos \beta x + \beta \sin \beta x) e^{\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2} + C,$$

$$\int e^{\alpha x} \sin \beta x dx = \frac{(\alpha \sin \beta x - \beta \cos \beta x) e^{\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2} + C.$$

5. Hissə-hissə inteqrallama üsulu tətbiq etməklə

$$\int x^n \cos \alpha x dx, \quad \int x^n \sin \alpha x dx, \quad \int x^n e^{\alpha x} dx,$$

$$\int x^n \arcsin x dx, \quad \int x^n \arccos x dx, \quad \int x^n \operatorname{arctg} x dx,$$

$$\int x^n \operatorname{arcctg} x dx.$$

inteqrallarını hesablamaq olar.

**Misal 3.**  $J_2 = \int x^2 \operatorname{arctg} x dx$  inteqralını hissə-hissə inteqrallama üsulu ilə hesablayaq:

$$u = \operatorname{arctg} x, \quad dv = x^2 dx, \quad du = \frac{dx}{1+x^2}, \quad v = \frac{x^3}{3}.$$

Onda

$$\begin{aligned} J_2 &= \frac{x^3}{3} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{3} \int \frac{x^3}{1+x^2} dx = \frac{x^3}{3} \operatorname{arctg} x - \\ &\quad - \frac{1}{3} \int \left( x - \frac{x}{1+x^2} \right) dx = \\ &= \frac{x^3}{3} \operatorname{arctg} x - \frac{1}{6} x^2 + \frac{1}{6} \ln(1+x^2) + C \end{aligned}$$




# XVI FƏSİL. MÜƏYYƏN İNTEQRALIN TƏRİFİ. MÜƏYYƏN İNTEQRALIN ƏSAS XASSƏLƏRİ. ORTA QİYMƏT TEOREMİ

## 16.1.1. İnteqral cəmi

Tutaq ki,  $f(x)$   $[a, b]$  parçasında təyin edilmiş kəsilməz və mənfi qiymətlər almayan funksiyadır. Absis oxu,  $x=a$  və  $x=b$  düz xətlərinin parçaları və  $f(x)$  funksiyasının qrafiki ilə hüdudlanmış  $aABb$  müstəvi fiquru (şəkil 1) **əyrixətli trapesiya** adlanır. Bu əyrixətli trapesiyanın sahəsini tapaq. Bunun üçün  $[a, b]$  parçasını hər hansı qayda ilə  $n$  hissəyə bölək və bölgü nöqtələrini  $x_0, x_1, \dots, x_{i-1}, x_i, \dots, x_n$  ilə işarə edək:

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_{i-1} < x_i < \dots < x_n = b.$$



Şəkil 1.

$f(x)$  funksiyasının  $[x_{i-1}, x_i]$  parçasındakı ən kiçik və ən böyük qiymətlərini uyğun olaraq  $m_i$  və  $M_i$  ilə işarə edək. Beləliklə,  $aABb$  əyrixətli trapesiyası  $n$  sayda əyrixətli trapesiyaya bölünmüş olur. Aydınadır ki,  $i$ -ci trapesiyanın sahəsi  $m_i \Delta x_i$  ( $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ) hasilindən kiçik deyil,  $M_i \Delta x_i$

hasilindən isə böyük deyil. Buna görə də  $aABb$  əyrixətli trapesiyasının sahəsi

$$s_n = m_1 \Delta x_1 + m_2 \Delta x_2 + \dots + m_n \Delta x_n = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

cəmindəm kiçik deyil,

$$S_n = M_1 \Delta x_1 + M_2 \Delta x_2 + \dots + M_n \Delta x_n = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$$

cəmindən isə böyük deyil. Başqa sözlə

$$s_n \leq S_{aABb} \leq S_n$$

Bu bərabərsizlikdəki  $s_n$  və  $S_n$  uyğun olaraq  $aABb$  əyrixətli trapesiyasına daxil olan və onu daxilinə alan pilləvari müstəvi fiqurların sahələridir.  $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$  kəmiyyətlərinin ən böyüyü nə qədər kiçik olsa, başqa sözlə, biz  $[a, b]$  parçasını nə qədər kiçik hissələrə bölsək,  $s_n$  və  $S_n$  kəmiyyətləri də bir o qədər bir-birinə yaxın olar.

**Tərif.** Əgər

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} s_n = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} S_n$$

şerti ödənərsə, onda

$$S = \lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} S_n$$

kəmiyyəti **əyrixətli  $aABb$  trapesiyasının sahəsi** adlanır.

Əgər hər bir  $[x_{i-1}, x_i]$  parçasında hər hansı bir  $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$  nöqtəsi götürsək, onda

$$m_i \leq f(c_i) \leq M_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

bərabərsizlikləri doğru olacaq. Bu bərabərsizliklərdən

$$s_n \leq \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \leq S_n \quad (1)$$

bərabərsizliyi alınır.

$$\sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$$

cəmi  $f(x)$  funksiyasının  $[a,b]$  parçasında **inteqral cəmi** adlanır. (1) bərabərsizliyində  $\max \Delta x_i \rightarrow 0$  – da limitə keçsək

$$\lim_{\max \Delta x_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i = S_{aABb} \quad (2)$$

bərabərliyini alıraq.

### 16.1.2. Müəyyən inteqralın tərfi. Müəyyən inteqralların varlıq məsələsi

Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası  $[a,b]$  parçasında təyin edilmişdir. Təsəvvür edək ki, biz  $[a,b]$  parçasını əvvəl bir qayda ilə, sonra ikinci bir qayda ilə, daha sonra üçüncü bir qayda ilə və sair  $k$ -cı qayda ilə hissələrə bölməklə bu işi sonsuz olaraq davam etdiririk.  $[a,b]$  parçasını  $k$ -cı qayda ilə böldükdə alınan  $[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$  parçalarının ən böyüyünün uzunluğu  $\lambda_k$  ilə işarə edək. Əgər  $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = 0$  olarsa, onda  $[a,b]$  parçasının belə bölünmə ardıcılığı **əsas bölünmə ardıcılığı** adlanır.

**Tərif.** Əgər  $[a,b]$  parçasının hər bir əsas bölünmə ardıcılığı üçün  $f(x)$  funksiyasının

$$\sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$$

**inteqral cəmləri ardıcılığı** cümlətlərinin seçilmə qaydasından asılı olmayaraq eyni bir  $I$  ədədinə yığılırsa, onda  $f(x)$  funksiyası  $[a,b]$  parçasında inteqrallanan funksiya,  $I$  ədədi isə bu funksiyanın həmin parçada müəyyən inteqralı adlanır.

$f(x)$  funksiyasının  $[a,b]$  parçasında müəyyən inteqralı

$$\int_a^b f(x) dx$$

kimi işarə edilir.  $a$  və  $b$  ədədləri müəyyən inteqralın uyğun olaraq aşağı və yuxarı cərhədləri adlanır. Beləliklə, tərifi görə

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i.$$

Bu düsturu bundan əvvəlki paraqrafdakı (2) düsturu ilə müqayisə etsək, görürük ki, mənfi qiymətlər almayan  $f(x)$  funksiyasının müəyyən inteqralı  $aABb$  əyrixətli trapeziyasının sahəsinə bərabərdir (müəyyən inteqralın həndəsi mənası).

Müəyyən inteqral inteqrallama dəyişəninin hansı hərflə işarə edilməsindən asılı deyil. Məsəl üçün

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(\tau) d\tau.$$

İsbat etmək olar ki, əgər  $f(x)$  funksiyası  $[a,b]$  parçasında məhduddursa və bu parçada onun sonlu sayda kəsilmə nöqtələri varsa, onda

$$\int_a^b f(x) dx$$

inteqralı var.

### **16.2.1. Kəsilməyən və monoton funksiyaların inteqrallanan olması**

$f(x)$  funksiyasının  $[a,b]$  parçasında inteqrallanan ol-

ması üçün onun həmin parçada məhdud olması zəruri şərtidir. Elə məhdud funksiyalar var ki, onlar inteqrallanan deyil. Buna misal olaraq  $[0,1]$  parçasında təyin edilmiş Dirixle funksiyasını göstərmək olar. Bu funksiya aşağıdakı kimi təyin edilir:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ rasiyal ədəd olduqda} \\ 0, & x \text{ irrasional ədəd olduqda} \end{cases}$$

$[0,1]$  parçasının hər hansı bir əsas bölünmə ardıcılığı üçün

$$\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

inteqral cəmləri ardıcılığını düzəldək.  $c_1, c_2, \dots$  nöqtələri olaraq əvvəlcə rasiyal nöqtələr götürsək

$$\lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} 1 = 1$$

olar. Əgər  $c_1, c_2, \dots$  nöqtələri olaraq ikinci dəfə irrasional nöqtələr götürsək

$$\lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n 0 \cdot \Delta x_i = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} 0 = 0$$

alırıq. Deməli, Dirixle funksiyasının inteqral cəmlərinin limiti  $c_1, c_2, \dots$  nöqtələrinin seçilmə qaydasından asılıdır. Bu isə o deməkdir ki, Dirixle funksiyası  $[0,1]$  parçasında inteqrallanan deyil.

### 16.2.2. Müəyyən inteqralın əsas xassələri

1. İstənilən sabit  $\alpha$  ədədi üçün

$$\int_a^b \alpha dx = \alpha(b - a)$$

doğrudur.

**İsbatı:**  $f(x) = \alpha$ ,  $x \in [a, b]$  funksiyanın inteqral cəmi

$$\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \alpha \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \alpha(b - a)$$

olduğu üçün

$$\int_a^b \alpha dx = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \alpha(b - a) = \alpha(b - a).$$

2. Əgər  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında inteqrallanan,  $\alpha$  isə hər hansı sabir ədəddirsə

$$\int_a^b f(x) \cdot \alpha dx = \alpha \int_a^b f(x) dx$$

doğrudur, başqa sözlə sabit vuruğu inteqral işarəsi qarşısına çıxarmaq olar.

**İsbatı:**  $\alpha f(x)$  funksiyanın  $[a, b]$  parçasında inteqral cəmi

$$\sum_{i=1}^n \alpha f(c_i) \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i$$

olduğuna görə

$$\lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \alpha f(c_i) \Delta x_i = \alpha \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i = \alpha \int_a^b f(x) dx.$$

3.  $f(x)$  və  $g(x)$  funksiyaları  $[a, b]$  parçasında inteqrallandırsa, onların cəmi də həmin parçada inteqrallandır və bu zaman

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.$$

doğrudur.

**İsbatı :** Müəyyən inteqralın tərifinə görə

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [f(c_i) + g(c_i)] \Delta x_i$$

Hər iki funksiya  $[a, b]$  parçasında interallanan olduğu üçün buradan alırıq:

$$\begin{aligned} \int_a^b [f(x) + g(x)] dx &= \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i + \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n g(c_i) \Delta x_i = \\ &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

4. Əgər  $f(x)$  və  $g(x)$  funksiyaları  $[a, b]$  parçasında inteqrallandırsa və hər bir  $x \in [a, b]$  üçün

$$f(x) \leq g(x) \tag{1}$$

bərabərsizliyi doğrudursa, onda

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

bərabərsizliyi ödənilir.

**İsbatı :** (1) bərabərsizliyindən

$$\sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n g(c_i) \Delta x_i$$

bərabərsizliyi alınır. Burada  $\lambda_k \rightarrow 0$ -da limitə keçsək

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

bərabərsizliyini alırıq.

5. Əgər  $f(x)$   $[a, b]$  parçasında inteqrallanan funksiya varsa və hər bir  $x \in [a, b]$  üçün  $m \leq f(x) \leq M$  ( $m$  və  $M$  sabit ədədlərdir) ikiqat bərabərsizliyi doğrudursa, onda

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

bərabərsizliyi ödənilir.

**İsbatı :** Bu xassə bilavasitə 1-ci və 4-cü xassələrdən alınır.

6. Əgər  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında inteqrallandırsa və  $a < c < b$  olarsa, onda  $[a, c]$  və  $[c, b]$  parçalarında da inteqrallandır və tərsinə. Bu zaman aşağıdakı bərabərlik doğrudur:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad c \in (a, b).$$

Bu xassənin isbatı aydındır.

**Qeyd.**  $a \geq b$  olduqda  $\int_a^b f(x) dx$  aşağıdakı kimi təyin edilir.

$$\int_a^a f(x) dx = 0, \quad \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

### 16.2.3.Orta qiymət haqqında teorem

**Teorem.**  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında kəsilməzdirsə, bu parçaya daxil olan elə  $c$  nöqtəsi var ki,

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) (b - a) \quad (1)$$

bərabərliyi doğru olar.

**İsbatı:**  $a=b$  olduqda (1)-in doğruluğu aydındır. Tutaq ki,  $a < b$ .  $f(x)$  funksiyasının  $[a, b]$  parçasında ən kiçik bə ən



böyük qiymətlərini uyğun olaraq  $m$  və  $M$  ilə işarə edək. Onda  $m \leq f(x) \leq M$  bərabərsizliyindən

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

bərabərsizliyi alınır. Bu bərabərsizliyin hər tərəfini  $(b-a)$ -ya bölək:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

$f(x)$  funksiyası  $[a,b]$  parçasında kəsilməz olduğu üçün bu parçaya daxil olan elə bir  $c$  nöqtəsi var ki,

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

və ya

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

bərabərliyi doğru olur.

İndi fərz edək ki,  $a > b$ . Onda  $\int_a^b f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx = -f(c)(a-b) = f(a)(b-a)$

### 16.3.1. Yuxarı sərhəddi dəyişən olan inteqrallar.

#### Yuxarı sərhəddi dəyişən müəyyən inteqral

Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası  $[a,b]$  parçasında kəsilməzdir. 16.2.2.-də deyildiyi kimi bu funksiya hər bir  $[a, x]$  ( $x \in [a, b]$ ) parçasında inteqrallanandır. Aşağıdakı funksiyyaya baxaq:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b].$$

Bu funksiya **yuxarı sərhədi dəyişən müəyyən inteqral** adlanır.

**Teorem** .f(x) funksiyası [a,b] parçasında kəsilməzdirsə, F(x) funksiyası həmin parçada diferensiallandır və

$$F'(x) = f(x)$$

bərabərliyi doğrudur.

**İsbat:**Tutaq ki,  $x_0$  [a,b] parçasına daxil olan hər hansı qeyd olunmuş bir nöqtədir. 16.2.2.-də verilən 6-cı xassəyə görə

$$F(x) - F(x_0) = \int_a^x f(t)dt - \int_a^{x_0} f(t)dt = \int_{x_0}^x f(t)dt$$

Aralıq qiymət haqqında teoremə görə buradan

$$F(x) - F(x_0) = f(c)(x - x_0)$$

bərabərliyi alınır

( $c \in [x_0, x], x_0 < x$  olduqda,  $c \in [x, x_0], x < x_0$  olduqda).

F(x) funksiyası  $x_0$  nöqtəsində kəsilməz olduğu üçün buradan alırıq:

$$F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} f(c) = \lim_{c \rightarrow x_0} f(c) = f(x_0)$$

Aydındır ki, F(x) funksiyası  $x_0=a$  nöqtəsində sağ,  $x_0=b$  nöqtəsində isə sol törəməyə malik olacaq:

$$F'(a) = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} = f(a),$$

$$F'(b) = \lim_{x \rightarrow b-0} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} = f(b).$$

### 16.3.2. Nyuton-Leybnis düsturu

**Teorem.**  $f(x)$  funksiyası  $[a, b]$  parçasında kəsilməz,  $F(x)$  funksiyası isə  $f(x)$ -in ibtidai funksiyasıdırsa

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (1)$$

düsturu doğrudur.

**İsbatı** :Yuxarı sərhədi dəyişən müəyyən inteqral haqqında teoremə görə

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$$

funksiyası  $f(x)$ -in ibtidai funksiyasıdır. Digər tərəfdən  $F(x)$  funksiyası da  $f(x)$  funksiyasının ibtidai funksiyası olduğundan  $\Phi(x)$  və  $F(x)$  funksiyaları bir-birindən ancaq sabit  $C$  toplananı ilə fərqlənə bilər:  $\Phi(x) = F(x) + C$ .

Bu düsturdan

$$\Phi(a) = F(a) + C, \Phi(b) = F(b) + C$$

bərabərlikləri alınır.

$$\Phi(a) = 0, \Phi(b) = \int_a^b f(x) dx.$$

olduğu üçün  $C = -F(a)$  və

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

(1) düsturu **Nyuton-Leybnis düsturu** adlanır. Sadəlik xatirinə bəzən  $F(b) - F(a)$  əvəzinə  $F(x) \Big|_a^b$  yazırlar. Onda (1) düsturu

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b$$

şeklini alır.

**Misal 1.**

$$\int_0^1 x dx$$

**Həlli.** Nyuton-Leybnis düsturuna görə

$$\int_0^1 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1^2}{2} - \frac{0^2}{2} = \frac{1}{2}$$

**Misal 2.**

$$\int_0^3 x^3 dx$$

**Həlli.**

$$\int_0^3 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_0^3 = \frac{3^4}{4} - \frac{0^4}{4} = \frac{81}{4}$$

**Misal 3.**

$$\int_{-1}^z (x^2 - 2x - 1) dx$$

**Həlli.** Nyuton-Leybnis düsturuna görə

$$\begin{aligned} \int_{-1}^z (x^2 - 2x - 1) dx &= \left( \frac{x^3}{3} - x^2 - x \right) \Big|_{-1}^z = \left( \frac{z^3}{3} - z^2 - z \right) - \\ &- \left( \frac{(-1)^3}{3} - (-1)^2 - (-1) \right) = -3 \end{aligned}$$

## 16.4. Müəyyən inteqralların hesablanma üsulları.

### Müəyyən inteqralın hissə-hissə inteqrallanması

Tutaq ki,  $u(x)$  və  $v(x)$   $[a, b]$  parçasında kəsilməz diferensiallanan (kəsilməz törəməsi olan) funksiyalardır. Onda

$$(uv)' = u'v + uv'$$

Düsturundan

$$\int_a^b (uv)' dx = \int_a^b u'v dx + \int_a^b uv' dx$$

alınır.

$$\int_a^b (uv)' dx = uv \Big|_a^b$$

olduğunu nəzərə alsaq, buradan

$$\int_a^b uv' dx = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

düsturunu alırıq. Bu düstur müəyyən inteqralda **hissə-hissə inteqrallama düsturu** adlanır.

**Misal 1.**

$$\int_0^{\pi} x \sin x dx.$$

**Həlli.** Bu inteqralı hissə-hissə inteqrallama düsturunun köməyi ilə hesablayaq. Bunun üçün  $u=x$  və  $dv=\sin x dx=d(-\cos x)$  götürək. Onda  $du=dx$  və  $v=-\cos x$  olar. Ona görə də

$$\int_0^{\pi} x \sin x dx = x(-\cos x) \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} (-\cos x) dx = -\pi \cos \pi -$$

$$-0(-\cos 0) + \sin x \Big|_0^{\pi} = \pi + (\sin \pi - \sin 0) = \pi$$

**Misal 2.**

$$\int_1^e x \ln x dx$$

inteqralının qiymətini hesablayaq.

**Həlli.**  $u = \ln x$  və  $dv = x dx = d\left(\frac{x^2}{2}\right)$  götürüb hissə-hissə inteqrallama düsturunu tətbiq edək:

$$\begin{aligned} \int_1^e x \ln x dx &= \int_1^e \ln x d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} d \ln x = \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx = \frac{x^2}{2} \ln x \Big|_1^e - \frac{1}{4} x^2 \Big|_1^e = \\ &= \frac{1}{4} (e^2 + 1) \end{aligned}$$

### Müəyyən inteqralda dəyişənin əvəz edilməsi

Müəyyən inteqralda dəyişənin əvəz olunması qaydası aşağıdakı teoremə əsaslanır.

**Teorem.** Tutaq ki,

1)  $a \leq x \leq b$  parçasında  $f(x)$  funksiyası təyin olunmuş kəsilməz funksiyadır;

2)  $x = \varphi(t)$  funksiyası  $\alpha \leq t \leq \beta$  parçasında kəsilməz diferensiallandıdır və

3)  $[\alpha, \beta]$  parçasında  $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b, \varphi(\alpha) \leq \varphi(t) \leq \varphi(\beta)$  münasibətləri ödənilirsə, onda aşağıdakı düstur doğrudur:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt. \quad (1)$$

Bu, müəyyən inteqralda dəyişənin əvəz edilməsi düsturu adlanır.

**İsbati:** Tutaq ki,  $F(x)$  funksiyası  $f(x)$ -in ibtidai funksiyasıdır. Onda  $F(\varphi(t))$  mürəkkəb funksiyası  $(\varphi(t)\varphi'(t))$  funksiyasının ibtidai funksiyası olur. Doğrudan da

$$\frac{d}{dt}F(\varphi(t)) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$$

Nyuton-Leybnis düsturuna görə

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a). \quad (2)$$

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)). \quad (3)$$

Teoremin şərtinə görə  $\varphi(\beta) = b$  və  $\varphi(\alpha) = a$ . Deməli, (2) və (3) düsturlarının sağ tərəfləri bərabərdir.

Ona görə də

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)dt.$$

(1) düsturu müəyyən inteqralda **dəyişənin əvəz edilməsi düsturu** adlanır. Onu

$$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))d\varphi(t)$$

şəklində də yazmaq olar.

**Misal 1.**

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin x^2 dx$$

**Həlli.**  $x^2=t$  əvəzləməsi aparaq. Onda  $x = \sqrt{t}$  və  $dx = \frac{1}{2\sqrt{t}}dt$ . Yeni inteqralın sərhədləri  $t=x^2$  düsturunun kö-

məyi ilə tapılır: bu düsturda  $x=0$  götürüb,  $t=0$  və  $x=\sqrt{\pi}$  götürüb,  $t=\pi$  alırıq. Onda

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin x^2 dx = \int_0^{\pi} \sqrt{t} \sin t \cdot \frac{1}{2\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \sin t dt =$$

$$= -\frac{1}{2} \cos t \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{2} (\cos \pi - \cos 0) = 1.$$

**Misal 2.**


$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1}.$$

**Həlli.**  $e^x = t$  ilə əvəz edək. Onda. Yeni integrallama sərhədlərini tapaq: olduqda  $t=1$  və  $x=1$  olduqda  $t=e$  olur. Onda

$$\int_0^1 \frac{dx}{e^x + 1} = \int_1^e \frac{1}{t(1+t)} dt = \int_1^e \left[ \frac{1}{t} - \frac{1}{t+1} \right] dt = \int_1^e \frac{dt}{t} -$$

$$- \int_1^e \frac{dt}{t+1} = \ln \left| \frac{t}{t+1} \right| \Big|_1^e = 1 + \ln \frac{2}{e+1}.$$

**Tək və cüt funksiyanın simmetrik parça üzrə integralı**



**Şəkil 1.**



Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası simmetrik  $[-a, a]$  parçasında təyin olunmuş cüt funksiyadır, yəni  $x$ -in  $[-a, a]$  parçasındakı bütün qiymətlərində

$$f(-x) = f(x)$$

bərabərliyi ödənilir. Həmin funksiyanın  $[-a, a]$  parçası üzrə götürülmüş inteqralını

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$$

kimi yazaq. Sağ tərəfdəki birinci inteqralda  $x=-t$  əvəzləməsini aparsaq

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= - \int_a^0 f(-t) dt + \int_0^a f(x) dx = - \int_a^0 f(t) dt + \\ &+ \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \end{aligned}$$

və ya

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx \quad (4)$$

münasibətini alarıq. Deməli, cüt funksiyanın simmetrik parça üzrə inteqralı, həmin funksiyanın parçanın yarısı üzrə inteqralının iki mislinə bərabərdir.

İndi fərz edək ki,  $[-a, a]$  parçasında  $f(x)$  tək funksiyadır.

Onda

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = - \int_a^0 f(-t) dt +$$

$$\begin{aligned}
 + \int_0^a f(x) dx &= \int_a^0 f(t) dt + \int_0^a f(x) dx = - \int_0^a f(t) dt + \\
 + \int_0^a f(x) dx &= 0
 \end{aligned}$$

və ya

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0 \quad (5)$$

**Misal 4.**

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos x \, dx = 2 \int_0^{\pi} \cos x \, dx = 2[\sin x]_0^{\pi} = 0.$$

**Misal 5.**

$$\int_{-a}^a x^{2n+1} dx = 0 \quad (n = 0, 1, \dots).$$

**Misal 6.**

$$\begin{aligned}
 \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \sin x)^2 dx &= \int_{-\pi}^{\pi} dx - 2 \int_{-\pi}^{\pi} \sin x \, dx + \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 x \, dx = \\
 &= 2\pi + 2 \int_0^{\pi} \sin^2 x \, dx = 2\pi + 2 \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2x}{2} dx = \\
 &= 2\pi + \pi - \int_0^{\pi} \cos 2x \, dx = 3\pi - \frac{\sin 2x}{2} \Big|_0^{\pi} = 3\pi.
 \end{aligned}$$

## XVII FƏSİL.QEYRİ-MƏXSUSİ İNTEQRALLAR

### 17.1.1.Müəyyən inteqralın ümumiləşməsi

Verilmiş  $f(x)$  funksiyasının  $[a, b]$  parçasında müəyyən inteqralı təyin edilərkən  $[a, b]$  parçasının sonlu və  $f(x)$  funksiyasının məhdud olması tələb olunur. İnteqrallama parçası qeyri-məhdud olduqda onu sonlu sayda  $[x_k, x_{k+1}]$  kimi sonlu hissələrə bölərək

$$J_n(T) = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \Delta x_k \quad (1)$$

inteqral cəmini düzəltmək mümkün deyildir. Əgər sonsuz parçanı sonlu sayda hissəyə bölsək, onda bu hissələrin heç olmasa birinin uzunluğu sonsuz olar. Bu halda (1) cəmi sonsuzluğa çevrilər və buna görə də həmin cəmin limiti sonlu ola bilməz.  $[a, b]$  parçası sonlu olub,  $f(x)$  funksiyası həmin parçada qeyri-məhdud olduqda da düzəldilən (1) inteqral cəmi qeyri-məhdud olar. Bu halda da, (1) inteqral cəminin limiti sonlu ola bilməz. Başqa sözlə,  $f(x)$  funksiyasının sonlu  $[a, b]$  parçasında müəyyən inteqralının varlığı üçün həmin parçada məhdud olması zəruri şərtidir.

Bununla belə, bir çox məsələlərdə müəyyən inteqralın sonsuz oblastlar və qeyri-məhdud funksiyalar üçün ümumiləşməsi tələb olunur. Belə ümumiləşmə isə bir çox hallarda mümkündür.

Müəyyən inteqralın sonsuz oblastlar və qeyri-məhdud funksiyalar üçün ümumiləşməsi olan inteqrallara **qeyri-məxsusi inteqrallar** deyilir. Qeyri-məxsusi inteq-

rallar iki növ olur: sonsuz sərhədli iteqrallar və qeyri-məhdud funksiyaların iteqralı.

### 17.1.2. Sonsuz sərhədli qeyri-məxsusi iteqrallar

Tutaq ki,  $y=f(x)$  funksiyası  $[a, +\infty)$  oblastında təyin olunmuş və istənilən sonlu  $[a, N]$  ( $N > a$ ) parçasında iteqrallanan funksiyadır. Onda istənilən  $N$  üçün

$$J(N) = \int_a^N f(x) dx \quad (1)$$

iteqralı sonludur və  $N \rightarrow +\infty$  şərtində onun limitindən danışmaq olar.

**Tərif.** Əgər sonlu

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N f(x) dx \quad (2)$$

limiti varsa, onda həmin limitə  $f(x)$  funksiyasının  $[a, +\infty)$  oblastında qeyri-məxsusi iteqralı deyilir və

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N f(x) dx \quad (3)$$

kimi işarə olunur. Bu halda, yəni (2) limiti sonlu olduqda  $f(x)$  funksiyasına  $[a, +\infty)$  oblastında **qeyri-məxsusi məna**da iteqrallanan (və ya iteqrallana bilən) funksiya deyilir.

(2) limiti varsa, onda

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

**qeyri-məxsusi inteqralı yığılan**, əks halda, yəni (2) limiti olmadıqda isə həmin **qeyri-məxsusi inteqral dağılan** adlanır.

**Misal.**

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda} \quad (a > 0)$$

qeyri-məxsusi inteqralı  $\lambda > 1$  olduqda yığılan,  $\lambda \leq 1$  olduqda isə dağılındır. Doğrudan da,  $\lambda > 1$  olduqda

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda} &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N \frac{dx}{x^\lambda} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \left[ \frac{x^{-\lambda+1}}{-\lambda+1} \right]_a^N \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\lambda} \cdot \left( \frac{1}{N^{\lambda-1}} - \frac{1}{a^{\lambda-1}} \right) \\ &= \frac{1}{\lambda-1} \cdot \frac{1}{a^{\lambda-1}} \end{aligned}$$

və ya

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda} = \frac{1}{\lambda-1} \cdot \frac{1}{a^{\lambda-1}}$$

olar.  $\lambda \leq 1$  olduqda isə qeyri-məxsusi inteqralın dağılan olması aşağıdakı münasibətlərdən aydındır:

$\lambda = 1$  olduqda

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N \frac{dx}{x} = \lim_{N \rightarrow +\infty} [\ln N - \ln a] = +\infty,$$


$\lambda < 1$  olduqda

$$\lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N \frac{dx}{x^\lambda} = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-\lambda} (N^{1-\lambda} - a^{1-\lambda}) = +\infty.$$

$y = f(x) \geq 0 (a \leq x < +\infty)$  olduqda

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

qeyri-məxsusi inteqralını həndəsi olaraq sonsuz uzun əyrixətli trapesiyanın  $|(x,y)| a \leq x < \infty, 0 \leq y \leq f(x)$  sahəsi hesab etmək olar. (Şəkil 1.)



Şəkil 1.

Doğrudan da, a ABN əyrixətli trapesiyanının sahəsi

$$S(N) = \int_a^N f(x) dx \quad (4)$$

olar.  $N \rightarrow +\infty$  şərtində (4) inteqralının limiti olsa, onda həmin limiti sonsuz uzun əyrixətli trapesiyanın sahəsi hesab etmək olar ki, bu da qeyri-məxsusi

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N f(x) dx$$

inteqralı ilə ifadə olunur.  $N \rightarrow +\infty$  şərtində (4) ifadəsinin limitinin olmaması həmin sonsuz uzun əyrixətli trapesiyanın sahəsinin sonsuz olduğunu, yəni sonlu sahənin olmadığını göstərir. Bu halda

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

qeyri-məxsusi inteqralı dağılındır.

Qeyd edək ki,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (5)$$

və istənilən  $b > a$  üçün

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \quad (6)$$

qeyri-məxsusi inteqralları eyni zamanda yığılan və ya dağılan olar. Doğrudan da,

$$\int_a^N f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^N f(x) dx.$$

və

$$\int_a^b f(x) dx$$

inteqralı sonlu ədəd olduğundan (5) və (6) qeyri-məxsusi inteqralları eyni zamanda yığılan və ya dağılan olar.

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx \text{ və } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

qeyri-məxsusi inteqralları da eyni qayda ilə təyin olunur:

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{N \rightarrow -\infty} \int_N^a f(x) dx, \quad (7)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^b f(x) dx + \int_b^{+\infty} f(x) dx. \quad (8)$$

Axırıncı

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

qeyri-məxsusi inteqralını

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{N_1 \rightarrow -\infty} \int_{-N_1}^b f(x) dx + \lim_{N_2 \rightarrow \infty} \int_b^{N_2} f(x) dx = \\ &= \lim_{\substack{N_1 \rightarrow -\infty \\ N_2 \rightarrow \infty}} \int_{-N_1}^{N_2} f(x) dx \end{aligned}$$

kimi də təyin etmək olar.

Verilmiş  $f(x)$  funksiyanın (5), (7) və (8) qeyri-məxsusi inteqralları ilə bərabər onun mütləq qiymətinin

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx, \quad \int_{-\infty}^a |f(x)| dx, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx$$

qeyri-məxsusi inteqrallarına da baxmaq olar.

(5) inteqralı və



$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

qeyri-məxsusi inteqralları eyni zamanda yığılarsa, onda

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralına **mütləq yığılan qeyri-məxsusi inteqral** deyilir. Bu halda deyirlər ki,  $f(x)$  funksiyası  $[a, +\infty)$  oblastında **mütləq inteqrallandır**.

(5) inteqralı yığılan,

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

inteqralı dağılan olarsa, onda

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralına **şərti yığılan qeyri-məxsusi inteqral** deyilir.

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ və } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralının da mütləq və şərti yığılmasından danışmaq olar.

### 17.2.1. Sonsuz sərhədli qeyri-məxsusi inteqralların xassələri

Burada

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

qeyri-məxsusi inteqralının bir sıra xassələrindən danışılır. Həmin xassələr

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx \text{ və } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralları üçün də uyğun şəkildə doğrudur.

**Xassə 1.**  $[a, +\infty)$  oblastında kəsilməyən  $f(x)$  funksiya-sının ibtidai funksiyası  $F(x)$  olarsa, onda

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = F(x)|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a) \quad (1)$$

bərabərliyi (Nyuton-Leybnis düsturu) doğrudur. Burada

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = F(+\infty) \quad (2)$$

qəbul olunur və (1) bərabərliyi aşağıdakı kimi başa düşülür: bərabərliyin hər iki tərəfinin eyni zamanda ya mənası var (sonludur) və bu halda bərabərlik doğrudur, ya da hər iki tərəfin mənası yoxdur.

Doğrudan da, tərifə görə

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} f(x) dx &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N f(x) dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} [F(N) - F(a)] = \\ &= \lim_{N \rightarrow +\infty} F(N) - F(a) = F(+\infty) - F(a) \end{aligned}$$

olar.  $F(+\infty)$  ifadəsi sonlu ədəd olarsa,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralı yığılan olar və onu (1) düsturu ilə hesablamaq mümkündür. (2) limiti yoxdursa (və ya sonsuzluğa bərabərdirsə),

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralı dağılıdır.

**Xassə 2.**

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ və } \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$$

inteqralları yığılındırsa, onda istənilən həqiqi  $\gamma$  və  $\mu$  ədədləri üçün

$$\int_a^{+\infty} [\lambda f(x) + \mu \varphi(x)] dx$$

inteqralı da yığılıdır.

Doğrudan da, tərifə görə

$$\begin{aligned} \int_a^{+\infty} [\lambda f(x) + \mu \varphi(x)] dx &= \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N [\lambda f(x) + \mu \varphi(x)] dx = \\ &= \lambda \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N f(x) dx + \mu \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N \varphi(x) dx = \\ &= \lambda \int_A^{+\infty} f(x) dx + \mu \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx. \end{aligned}$$

Aşağıdakı xassələri də eyni qayda ilə isbat etmək olar.

**Xassə 3.**  $U = f(x)$  və  $V = \varphi(x)$  funksiyalarının  $[a, +\infty)$

oblastında kəsilməz törəmələri varsa və

$$\int_a^{+\infty} U dV, UV \Big|_a^{+\infty}, \int_a^{+\infty} V dU$$

ifadələrinin hər hansı ikisi sonludursa, onda

$$\int_a^{+\infty} U dV = UV \Big|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} V dU. \quad (3)$$

Düsturu doğrudur.

**Xassə 4.** Tutaqki,  $f(x)$  funksiyası  $[a, +\infty)$  oblastında kəsilməyəndir,  $x = \varphi(t)$  funksiyasının isə  $[\alpha, \beta)$ ,  $\alpha < \beta \leq +\infty$  yarım intervalında kəsilməz törəməsi vardır və

$$a = \varphi(\alpha) \leq \varphi(t) < \lim_{t \rightarrow \beta} \varphi(t) = +\infty$$

münasibəti ödənilir. Bu halda,

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralı yığılandırsa, onda

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t) dt \quad (4)$$

düsturu doğrudur.

Bu xassələrdən istifadə etməklə bir çox qeyri-məxsusi inteqralları hesablamaq olar.

**Misal .**

$$J_0 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1,$$

$$J_1 = \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = -x e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x} dx = 1,$$

$$J_2 = \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + 2 \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx = 2 = 2!,$$

$$J_3 = \int_0^{+\infty} x^3 e^{-x} dx = -x^3 e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + 3 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-x} dx = 6 = 3!$$

və ümumiyyətlə

$$J_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx = -x^n e^{-x} \Big|_0^{+\infty} + n \int_0^{+\infty} x^{n-1} e^{-x} dx = n!$$

### 17.2.2. Sonsuz sərhdəli qeyri-məxsusi inteqralların yığılma əlamətləri

Bəzi məsələlərin tədqiqində çox zaman qeyri-məxsusi inteqralların qiymətini deyil, onların yığılan və ya dağılan olmasını bilmək lazım olur.  $f(x)$  funksiyasının ibtidai funksiyası məlum olarsa, onda

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

qeyri-məxsusi inteqralının yığılan olmasını əvvəlki paragrafda göstərilən təkliflər vasitəsilə yoxlamaq olar. İnteqralaltı funksiyanın ibtidai funksiyası məlum olmadıqda isə qeyri-məxsusi inteqralların yığılma məsələsi çox zaman aşağıda göstərilən əlamətləri tətbiq etməklə öyrənilir.

Fərz edək ki,  $f(x)$  funksiyası  $[a, +\infty)$  oblastında kəsilməyən və mənfi qiymətlər almayan funksiyadır. Onda

$$J(N) = \int_a^N f(x) dx$$

funksiyası  $[a, +\infty)$  yarımintervalında monoton azalmayan olar. Buna görə də  $N \rightarrow +\infty$  şərtində  $J(N)$  funksiyası monoton artaraq ya sonlu limitə, ya da sonsuzluğa yaxınlaşır. Məlumdur ki, monoton artan  $J(N)$  funksiyasının  $N \rightarrow +\infty$  şərtində sonlu limitinin olması üçün onun məhdud, yəni

$$|J(N)| \leq M, \quad a \leq N < +\infty \quad (1)$$

olması zəruri və kafi şərtidir.

Buradan qeyri-məxsusi inteqralların yığılması üçün aşağıdakı teorem aınır:

**Teorem 1.**  $F(x)$  funksiyası  $[a, +\infty)$  yarımintervalında kəsilməyən və mənfi qiymətlərlənməyən funksiya olduqda (1) münasibətinin ödənilməsi

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralının yığılan olması üçün zəruri və kafi şərtidir.

Qeyd edək ki, (1) şərti ödənilmədikdə

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow +\infty} \int_a^N f(x) dx = +\infty$$

olar.

**Teorem 2:**  $[a, +\infty)$  yarımintervalında kəsilməyən  $f(x)$  və  $\varphi(x)$  funksiyaları üçün

$$0 \leq f(x) \leq C\varphi(x) \quad (2)$$

( $C > 0$  sabit ədəddir) bərabərsizliyi ödənilirsə, onda

$$J_1 = \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$$

inteqralı yığılan olduqda

$$J_2 = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

İnteqralı dayığılır,  $J_2$  inteqralı dağılan olduqda inteqralı da dağılır.

**İsbatı.** Fərz edək ki,  $J_1$  inteqralı yığılır. Onda  $\varphi(x) \geq 0$  ( $0 \leq x < +\infty$ ) olduğundan

$$J_1(N) = \int_a^N \varphi(x) dx$$

inteqralı artaraq  $N \rightarrow +\infty$  şərtində sonlu limitə yaxınlaşır:

$$\int_a^N \varphi(x) dx \leq \int_a^{+\infty} \varphi(x) dx = J_1 \quad (3)$$

Buradan və (2) bərabərsizliyindən

$$J_2(N) = \int_a^N f(x) dx \leq C \int_a^N \varphi(x) dx \leq CJ_1 \quad (4)$$

alırıq.  $J_2(N)$  inteqralı yuxarıdan məhdud olduğundan 1-ci teoremə görə  $J_2$  inteqralı yığılır.

$J_2$  inteqralı dağılan olduqda (4) bərabərsizliyinə görə  $J_1$  inteqralı da dağılır.

**Teorem 3.**  $[a, +\infty)$  yarım intervalında kəsilməyən  $\varphi(x)$  və  $f(x) \geq 0$  funksiyaları üçün

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \gamma \quad (5)$$

limiti varsa, onda  $0 < \gamma < +\infty$  olduqda

$$J_1 = \int_a^{\infty} \varphi(x) dx \text{ və } J_2 = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralları eyni zamanda ya yığılır, ya da dağılır.

**İsbatı.** Limitin tərifinə görə istənilən  $0 < \varepsilon < \frac{\gamma}{2}$  ədədi üçün  $\varepsilon N_0 > 0$  var ki,  $x$ -in bütün  $x > N_0$  qiymətlərində

$$\left| \frac{f(x)}{\varphi(x)} - \gamma \right| < \varepsilon$$

və ya

$$(\gamma - \varepsilon)\varphi(x) < f(x) < (\gamma + \varepsilon)\varphi(x) \quad (N_0 \leq x < +\infty) \quad (6)$$

bərabərsizliyi ödənilir.

$J_1$  inteqralı yığılan olduqda

$$\int_N^{+\infty} \varphi(x) \, dx$$

İnteqralı da yığılır. Onda (6) bərabərsizliyinə görə

$$\int_N^{+\infty} f(x) \, dx$$

inteqralı yığılır, buradan da,  $J_2$  inteqralınının yığılan olması aydındır.

İsbatın ardı eyni mühakimə ilə tamamlanır.

**Nəticə.** Tutaq ki,  $[a, +\infty)$  yarımintervalında mənfi qiymətlər almayan  $f(x)$  funksiyası üçün

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\lambda f(x) = \gamma$$

münasibəti ödənilir. Onda 1)  $0 < \gamma < \infty$  və  $\lambda \leq 1$  olduqda

$$\int_a^{+\infty} f(x) \, dx \quad (7)$$

inteqralı dağılır, 2)  $0 \leq \gamma < \infty$  və  $\lambda > 1$  olduqda isə (7) inteqralı yığılır.

Nəticənin doğruluğuna inanmaq üçün

$$\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda}$$

inteqralının  $\lambda > 1$  olduqda yığılan,  $\lambda \leq 1$  olduqda isə dağılan olduğunu nəzərə almaq lazımdır.

Xüsusi halda,

$$f(x) \approx \frac{1}{x^\lambda}$$



olarsa, onda  $\lambda > 1$  olduqda (7) inteqralı yığılır,  $\lambda \leq 1$  olduqda isə dağılır.

### 17.3. Koşi kriterisi və Abel əlaməti

Tutaq ki,

$$J = \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

İnteqralı yığılır. Bu, o deməkdir ki,

$$F(N) = \int_a^N f(x) dx$$

funksiyasının  $N \rightarrow +\infty$  şərtində sonlu J limiti var. Koşi kriterisinə görə bu, aşağıdakı şərtin ödənilməsinə ekvivalentdir:

İstənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $N_0 = N_0(\varepsilon)$  var ki, istənilən  $N_1 > N_0$  və  $N_2 > N_0$  üçün

$$\left| \int_{N_1}^{N_2} f(x) dx \right| = \left| \int_a^{N_2} f(x) dx - \int_a^{N_1} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

bərabərsizliyi ödənilir.

Buradan  $f(x)$  funksiyasının  $[a, +\infty)$  yarımintervalında inteqrallanan olması üçün aşağıdakı zəruri və kafi şərt alınır.

**Teorem 1. (Koşi kriterisi).**

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralının yığılan olması üçün zəruri və kafi şərt: istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $N_0$  ədədinin olmasıdır ki, istənilən  $N_1 > N_0$  və  $N_2 > N_0$  üçün

$$\left| \int_{N_1}^{N_2} f(x) dx \right| < \varepsilon \quad (1)$$

bərabərsizliyi ödənilsin.

Fərz edək ki,

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

inteqralı yığılır. Onda Koşi kriterisinə görə istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $N_0$  var ki, istənilən  $N_1 > N_0$  və  $N_2 > N_0$  ədədləri üçün

$$\left| \int_{N_1}^{N_2} |f(x)| dx \right| < \varepsilon$$

bərabərsizliyi ödənilir. Buradan,

$$\left| \int_{N_1}^{N_2} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{N_1}^{N_2} |f(x)| dx \right|$$

bərabərsizliyinə əsasən,

$$\left| \int_{N_1}^{N_2} f(x) dx \right| < \varepsilon \quad (N_1 > N_0, N_2 > N_0)$$

alınır ki, bu da

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralının yığılan olduğunu göstərir.

Beləliklə, aşağıdakı teoremi isbat etmiş olduq:

**Teorem 2. Qeyri-məxsusi**

$$\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

inteqralı yığılırsa, onda

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralı da yığılır.

**Teorem 3. (Abel əlaməti).** Tutaq ki,  $\varphi(x)$  funksiyası  $[a, +\infty)$  yarımintervalında diferensiallanandır, monoton azalır,  $x \rightarrow +\infty$  şərtində isə sıfıra yaxınlaşır və istənilən  $N > a$  üçün

$$\left| \int_a^N f(x) dx \right| \leq M_0 < +\infty \quad (2)$$

bərabərsizliyi ödənilir. Onda qeyri-məxsusi

$$\int_a^{+\infty} f(x) \varphi(x) dx \quad (3)$$

inteqralı yığılır.

**İsbatı.**

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

olduqda istənilən  $N_1$  və  $N_2$  ədədləri üçün

$$\int_{N_1}^{N_2} f(x) \varphi(x) dx = [F(x) \varphi(x)]_{N_1}^{N_2} - \int_{N_1}^{N_2} F(x) \varphi'(x) dx \quad (4)$$

düsturunu alarıq.  $\varphi(x)$  funksiyası monoton azalan olduğundan  $\varphi'(x) < 0$  olar.

İndi

$$\int_{N_1}^{N_2} F(x)\varphi'(x)dx$$

inteqralına orta qiymət teoremini tətbiq edək:

$$\int_{N_1}^{N_2} F(x)\varphi'(x)dx = F(\varepsilon) \int_{N_1}^{N_2} \varphi'(x)dx = F(\varepsilon)[\varphi(N_2) - \varphi(N_1)],$$

$$[\varepsilon \in (N_1, N_2)].$$

Buradan (2) bərabərsizliyinə və (4) bərabərliyinə əsasən

$$\left| \int_{N_1}^{N_2} f(x)\varphi(x) dx \right| \leq 2 M_0 [|\varphi(N_1)| + |\varphi(N_2)|]$$

münasibəti alınır. Şərtə görə  $\varphi(x) \rightarrow 0$  ( $x \rightarrow +\infty$ ) olduğundan

$$\lim_{\substack{N_1 \rightarrow +\infty \\ N_2 \rightarrow +\infty}} \int_{N_1}^{N_2} f(x)\varphi(x) dx = 0$$

olar. Deməli, (3) inteqralı yığılır (Koşi kriterisinə görə).

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx$$

inteqralının yığılması haqqında söylədiyimiz bu təkliflər uyğun olaraq

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx \text{ və } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

inteqralları üçün də doğrudur.

**Misal 1.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin ax}{x^\lambda} dx \text{ və } \int_1^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^\lambda} dx$$

inteqralları olduqdamütləqyığılır.

Doğrudanda,

$$\left| \frac{\sin ax}{x^\lambda} \right| \leq \frac{1}{x^\lambda} \text{ və } \left| \frac{\cos ax}{x^\lambda} \right| \leq \frac{1}{x^\lambda} \quad (1 \leq x < +\infty)$$

bərabərsizlikləri ödənildiyindən və

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda} \quad (\lambda > 1)$$

inteqralı yığılanolduğunagörə

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin ax|}{x^\lambda} dx \text{ və } \int_1^{+\infty} \frac{|\cos ax|}{x^\lambda} dx$$

inteqralları yığılandır. Onda yuxarıda isbat etdiyimiz teoremə görə

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin ax}{x^\lambda} dx \text{ və } \int_1^{+\infty} \frac{\cos ax}{x^\lambda} dx \quad (5)$$

inteqralları mütləq yığılan olur.

**Misal 2.**

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x}$$

inteqralı şərtiyığılandır.

Bu inteqrala hissə-hissə inteqrallama düsturunu tətbiq etsək, alarıq:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = - \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} d(\cos x) = - \frac{\cos x}{x} \Big|_1^{+\infty} +$$

$$+ \int_1^{+\infty} \cos x d\left(\frac{1}{x}\right) = \cos 1 - \int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2} dx.$$

Sağ tərəfdəki hədlərin ikisi də sonludur (inteqralın yığılan olması 1-ci misaldan aydındır), buna görə də sol tərəfdəki inteqral yığılandır.

İndi göstərək ki,

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$$

inteqralı dağılındır.

Bu məqsədlə

$$|\sin x| \geq \sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

bərabərsizliyindən istifadə edək. Onda istənilən  $N > 0$  üçün

$$\int_1^N \frac{|\sin x|}{x} dx \geq \int_1^N \frac{1}{2x} dx - \int_1^N \frac{\cos 2x}{2x} dx \quad (6)$$

bərabərsizliyini yazmaq olar. Sağ tərəfdəki birinci inteqral  $N \rightarrow +\infty$  şərtində sonsuzluğa yaxınlaşır, yəni

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{2x}$$

inteqralı dağılındır:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x} dx = +\infty$$

ikinci inteqral isə yığılandır. Deməli,  $N \rightarrow +\infty$  şərtində (6) bərabərsizliyində limitə keçsək, sağ tərəf və buna görə də sol tərəf sonsuzluğa yaxınlaşır. Bu isə

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx$$

inteqralının dağılan olduğunu göstərir:

$$\int_1^{+\infty} \frac{|\sin x|}{x} dx = +\infty.$$


### 17.3.1. İkiqat inteqralın tərfi

Tutaq ki, ikidəyişənli  $z=f(x,y)$  funksiyası  $G$  oblastında təyin edilmişdir.  $G$  oblastını müəyyən əyrilər vasitəsilə kiçik  $G_1, G_2, \dots, G_n$  oblastlarına bölək (şəkil 1). Bu oblastların

sahələrini uyğun olaraq  $S_1, S_2, \dots, S_n$  ilə işarə edək. Hər bir  $G_i$  oblastında müəyyən bir  $(\xi_i, \eta_i)$  nöqtəsini düzəldək:

$$\sigma = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) S_i$$

Bu cəmə  $z=f(x,y)$  funksiyasının  $G$  oblastında *inteqral cəmə* deyilir.



Şəkil 1.

İndi təsəvvür edək ki,  $G$  oblastını əvvəl bir qayda ilə, sonra ikinci bir qayda ilə, daha sonra üçüncü bir qayda ilə və sair  $k$ -çı qayda ilə kiçik oblastlara bölməklə bu işi sonsuz olaraq davam etdiririk.  $G$  oblastını  $k$ -çı qayda ilə

böldükdə alınan oblastların diametlərinin ən böyüyünü  $\lambda_k$  ilə işarə edək. Əgər

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = 0$$

olarsa, G oblastının hər bir əsas bölünmə ardıcılığı üçün

$$\sigma = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) S_i$$

inteqral cəmləri ardıcılığı  $(\xi_i, \eta_i)$  nöqtələrinin seçilmə qaydasından asılı olmayaraq eyni bir  $I$  ədədinə yığılarsa, onda  $z=f(x,y)$  funksiyası G oblastında inteqrallanan funksiya  $I$  ədədi isə bu funksiyanın həmin oblastda *ikiqat inteqralı* adlanır.

$f(x,y)$  funksiyanın G oblastında ikiqat inteqralı

$$\iint_G f(x,y) dx dy \text{ vəə ya } \iint_G f(x,y) dS$$

kimi belə işarə edilir. Beləliklə, tərifə görə

$$\iint_G f(x,y) dx dy = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) S_i.$$

Əgər N nöqtəsinin istənilən ətrafında həm G oblastına daxil olan və həm də daxil olmayan nöqtələr varsa, həmin nöqtə G oblastının *sərhəd nöqtəsi* adlanır.

G oblastının bütün sərhəd nöqtələri çoxluğuna onun sərhədi deyilir.

G oblastı ilə onun sərhədinin birləşməsi qapalı oblast adlanır.

Aşağıdakı teorem doğrudur.

**T e o r e m .** *məhdud qapalı oblastda kəsilməz funksiya həmin oblastda inteqrallandır.*




### 17.3.2. İkiqat inteqralin həndəsi mənası

Tutaq ki, məhdud qapalı  $G$  oblastında təyin edilmiş mənfi qiymətlər almayan kəsilməz  $z=f(x,y)$  funksiyası verilmişdir. Belə bir məsələyə baxaq:  $OXYZ$  düzbucaqlı Dekart koordinat sistemində yuxarıdan tənliyi  $z=f(x, y)$ ,  $(x;y) \in G$  olan səthlə, yanlardan doğuranları  $OZ$  oxuna paralel olan silindrik səthlə və aşağıdan  $OXY$  müstəvisi üzərində yerləşən  $G$  fiquru ilə hüdudlanmış  $Q$  silindrik cisminin həcmi tapmaq tələb olunur (şəkil 1).

Bu məsələni həll etmək üçün  $G$  oblastını müəyyən əyriyə vasitəsilə kiçik  $G_1, G_2, \dots, G_n$  oblastlarına bölək.

Bu zaman baxdığımız  $Q$  silindrik cismi aşağı oturmaqları  $G_1, G_2, G_3, \dots, G_n$  müstəvi fiqurları olan  $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$  silindrik cisimlərinin birləşməsindən ibarət olur. Odur ki,  $Q$  cisminin  $V(Q)$  həcmi  $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$  cisimlərinin  $V(Q_1), V(Q_2), \dots, \dots, V(Q_n)$  həcmələrinin cəminə bərabər olacaq:



Şəkil 1

$$V(Q) = \sum_{i=1}^n V(Q_i) \quad (1).$$

$G_1, G_2, \dots, G_n$  fiqurlarının sahələrini uyğun olaraq  $S_1, S_2, \dots, S_n$  ilə işarə edək. Hər bir  $G_i$  oblastında müəyyən bir  $(\xi_i, \eta_i)$  nöqtəsi götürək.  $G_1, G_2, \dots, G_n$  oblastları çox kiçik olduqlarına görə hər bir  $Q_i$  silindrik cisminin həcmi təqribi olaraq oturacağıın sahəsi  $S_i$  və hündürlüyü  $f(\xi_i, \eta_i)$  olan silindrin həcminə bərabərdir.

$$V(Q_i) \approx f(\xi_i, \eta_i)S_i. \quad (2)$$

(1) və (2) – dən alırıq:

$$V(Q) \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)S_i$$

Bu düsturun sağ tərəfindəki cəm  $z=f(x,y)$  funksiyasının  $G$  oblastında inteqral cəmidir. Aydınır ki,  $G_1, G_2, \dots, G_n$  oblastları nə qədər kiçik olsa

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)S_i$$

cəmi də  $Q$  cisminin həcminə bir o qədər yaxın olar.

§ 1 – dəki teoremə görə  $z=f(x, y)$  funksiyasının  $G$  oblastında ikiqat inteqralı var. Odur ki,  $G$  oblastının hər bir əsas bölünmə ardıcılığı üçün  $(\xi_i, \eta_i)$  nöqtələrinin

seçilmə qaydasından asılı olmayaraq

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i)S_i$$

cəmləri ardıcılığı yığılır və yuxarıda deyilənlərdən aydındır ki, onun limiti  $Q$  cisminin həcminə bərabərdir:

$$V(Q) = \lim_{\lambda_k \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) S_i = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

Buradan ikiqat inteqralın həndəsi mənası alınır: məhdud qapalı  $G$  oblastında təyin edilmiş mənfə qiymətlər almayan  $z=f(x,y)$  kəsilməz funksiyasının ikiqat inteqralı

$$\iint_G f(x, y) dx dy.$$

yuxarıdan tənliyi  $z=f(x,y)$  ( $x,y$ )  $\in G$  olan səthlə, yanlardan doğuranları  $OZ$  oxuna paralel olan silindrik səthlə və aşağıdan  $OXY$  müstəvisi üzərində yerləşən  $G$  fiquru ilə həddəlanmış silindrik cismin həcminə bərabərdir.

Qeyd edək ki, məhdud qapalı  $G$  oblastında təyin edilmiş müsbət qiymətlər almayan kəsilməz  $z=f(x,y)$  funksiyası verildikdə uyğun silindrik  $Q$  cisminin həcmi üçün

$$V(Q) = - \iint_G f(x, y) dx dy.$$

düturu doğru olur.

### 17.3.3. İkiqat inteqralın hesablanması

Tutaq ki,  $[a; b]$  parçasında təyin edilmiş kəsilməz  $y=\varphi(x)$  və  $y=\psi(x)$  funksiyaları verilmişdir və

$$\varphi(x) \leq \psi(x), \quad x \in [a; b].$$

Fərz edək ki,


$$x=a, x=b, y=\varphi(x) \text{ və } y=\psi(x)$$

xətləri ilə hüdudlanmış  $G$  oblastında təyin edilmiş kəsilməz  $z=f(x,y)$  funksiyası verilmişdir (şəkil 1).


Əvvəlcə  $f(x,y)$  –in  $G$  oblastında mənfi qiymətlər olmayan funksiya olduğunu fərz edək. Bu halda bundan əvvəlki paraqrafda gördüyümüz kimi

$$\iint_G f(x,y) dx dy$$

ikiqat inteqralı



**Şəkil 1**



**Şəkil 2**

yuxarıdan tənliyi  $z=f(x,y)$  olan səthlə və aşağıdan  $G$  oblastı ilə hüdudlanmış silindrik cismin həcminə bərabərdir.

Həmin silindrik cismin  $V$  həcmi tapmaq üçün əvvəl istifadə etdiyimiz kəsiklər üsulunu tətbiq edək. Silindrik cismi  $x \in [a; b]$  nöqtəsində  $OX$  oxuna perpendikulyar müstəvi ilə kəsdikdə alınan kəsiyin sahəsini  $S(x)$ -lə işarə edək (şəkil 2). Onda  $S(x)$  kəsiyinin həcmi

$$V = \int_a^b S(x) dx. \quad (1)$$

olar.

Burada görünür ki,  $S(x)$ ,  $Oy$  oxuna paralel olan  $O'y'$  oxunun  $\varphi(x) \leq y \leq \psi(x)$  parçası,  $Oxy$  müstəvisinə onun  $A(x; \varphi(x))$  və  $B(x; \psi(x))$  nöqtələrində perpendikulyar olan  $AA_1$  və  $BB_1$  düz xətlərinin parçaları və  $z=f(x,y)$  ( $x$ -i sabit hesab etdikdə  $z=f(x,y)$  -ə  $y$ -dən asılı birdəyişənli funksiya kimi baxa bilərik) funksiyanın  $A_1B_1$  qrafiki ilə hüdudlanmış müstəvi fiqurun sahəsinə bərabərdir. Odur ki,

$$S(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy. \quad (2)$$

İsbat etmək olar ki,  $S(x)$  funksiyası  $[a; b]$  parçasında kəsilməzdir.

$S(x)$  -in (2) ifadəsini (1) düsturunda yerinə yazıb

$$V = \left( \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx$$

və ya

$$\iint_G f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \quad (3)$$

düsturunu alırıq. (3) düsturu ikiqat inteqralın hesablanması düsturudur.


Qeyd edək ki, (3) düsturu yalnız eyni işarəli qiymətlər alan funksiyalar üçün deyil, hər bir kəsilməz funksiya üçün doğrudur.

İndi tutaq ki,  $[c; d]$  parçasında təyin edilmiş  $x = \varphi_1(y)$  və  $x = \psi_1(y)$  funksiyaları verilmişdir və

$$\varphi_1(y) \leq \psi_1(y), y \in [c; d].$$

Bu dəfə belə fərz edək

ki, kəsilməz  $z=f(x,y)$  funksiyası  $y=c$ ,  $y=d$ ,  $x=\varphi_1(y)$  və  $x=\psi_1(y)$  xətləri ilə hüdudlanmış  $G$  oblastında təyin edilmişdir (şəkil 3).  
Bu halda ikiqat inteqral



**Şəkil 3**

$$\iint_G f(x,y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\psi_1(y)} f(x,y) dx \quad (4)$$

düsturu ilə hesablanır. Bu düstur (3) düsturuna analogi qayda ilə alınır.

Xüsusi halda əgər  $f(x,y)$  funksiyası

$$a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$$

düzbucaqlısında verilmişdirsə, onun ikiqat inteqralı

$$\iint_G f(x,y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y) dy$$

və yaxud


$$\iint_G f(x,y) dx dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x,y) dx \quad (5)$$

düsturu ilə hesablanır.

Əgər  $f(x,y)$  funksi-

yasının t y n oblastı  $G$  daha m r kk b formaya malikdirs , onda h min oblastın yuxarıda baxdığımız formalara malik olan  $G_1, G_2, \dots, G_n$  oblastlarına b l rl r ( ekil 4). Bu

halda ist diyimiz  $\iint_G f(x,y)dxdy$



 ekil 4

inteqralı  $f(x,y)$  funksiyanın  $G_1, G_2, \dots, G_n$  oblastları  zr  g t r lm ş ikiqat inteqrallarının c min  b rab r olur:

$$\iint_G f(x,y)dxdy = \iint_{G_1} f(x,y)dxdy + \dots + \iint_{G_n} f(x,y)dxdy.$$


**M i s a l 1.**  $G: 0 \leq x \leq 2, 0 < y < 1$  d zbucaqlısı  zr   $z = xy + x^2 + y^2$  funksiyanın ikiqat inteqralını hesablayın.

$$\begin{aligned} \text{H lli. (5) d sturuna g r  } \iint_G (xy + x^2 + y^2)dxdy &= \\ = \int_0^1 dy \int_0^2 (xy + x^2 + y^2) dx &= \int_0^1 \left[ \left( y \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \right. \right. \\ \left. \left. + y^2 x \right) \Big|_0^2 \right] dy &= \int_0^1 \left( 2y^2 + 2y + \frac{8}{3} \right) dy = \left( \frac{2}{3} y^3 + \right. \\ \left. + y^2 + \frac{8}{3} y \right) \Big|_0^1 &= 4 \frac{1}{3} \end{aligned}$$


Misal 2.  $y=x$ ,  $y=0$  və  $x=\pi$  düz xətləri ilə hüdudlanan  $G$  oblastında (şəkil 5)  $f(x, y) = \sin x + \cos x$  funksiyasının ikiqat intervalını hesablayın.

Həlli. Tələb olunan ikiqat intervalı (3) düsturu ilə hesablayaq:

$$\begin{aligned} \iint_G (\sin x + \cos y) dx dy &= \int_0^\pi dx \int_0^x (\sin x + \\ &+ \cos x) dy = \int_0^\pi [(y \sin x + \sin y)|_0^x] dx = \int_0^\pi (x + \\ &+ 1) \sin x dx = - \int_0^\pi (x + 1) d \cos x = -(x + 1) \cos x |_0^\pi + \\ &+ \int_0^\pi \cos x dx = -[\sin x - (x + 1) \cos x] |_0^\pi = -(\pi + 2) \end{aligned}$$



Şəkil 5



Şəkil 6

M i s a l 3.  $x=ln y$ ,  $x=0$  və  $y=2$  xətləri ilə hüdudlanmış  $G$  oblastında (şəkil 6)  $f(x, y) = e^x$  funksiyasının ikiqat inteqrallını hesablayın.

Həlli. Tələb olunan ikiqat inteqralı (4) düsturu ilə hesablayaq:



$$\iint_G e^x dx dy = \int_1^2 dy \int_0^{\ln y} e^x dx = \int_1^2 e^x \Big|_0^{\ln y} dy = \int_1^2 (y - 1) dy = \left( \frac{1}{2} y^2 - y \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{2}$$

Qeyd edək ki, bu misaldakı ikiqat inteqralı inteqrallama növbəsini dəyişib (3) düsturu ilə də hesablamaq olar:

$$\begin{aligned} \iint_G e^x dx dy &= \int_0^{\ln 2} dx \int_{e^x}^2 e^x dy = \int_0^{\ln 2} [(e^x - y) \Big|_{e^x}^0] dx \\ &= \int_0^{\ln 2} (2 - e^x) e^x dx = \left( 2e^x - \frac{1}{2} e^{2x} \right) \Big|_0^{\ln 2} = \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

M i s a l 4.  $x=0$ ,  $y=\pi$  və  $y=x$  xətləri ilə hüdudlanmış  $G$  oblastı  $f(x,y)=\cos(x+y)$  funksiyasının ikiqat inteqralını hesablayın.

*Həlli.* (3) düsturuna görə

$$\begin{aligned} \iint_G \cos(x+y) dx dy &= \int_0^\pi dx \int_x^\pi \cos(x+y) dy = \\ &= \int_0^\pi [\sin(x+y) \Big|_x^\pi] dx = \int_0^\pi [\sin(\pi+x) - \\ &- \sin 2x] dx = - \int_0^\pi (\sin x + \sin 2x) dx = \\ &= \left( \cos x + \frac{1}{2} \cos 2x \right) \Big|_0^\pi = -2 \end{aligned}$$

## 17.4. Qeyri-məhdud funksiyaların qeyri-məxsusi integralının xassələri və yığılma əlamətləri

Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası  $[a, b)$  yarımintervalında təyin olunmuş və  $x=b$  nöqtəsi ətrafında qeyri-məhdud olan funksiyadır. Onda onun

$$\int_a^b f(x) dx$$

qeyri-məxsusi integralından danışmaq olar.

Qeyri-məxsusi integralların, müəyyən integralın məlum xassələrinə (xəttilik, dəyişəni əvəzetmə və s.) oxşar xassələri vardır. Burada onların ancaq bir neçəsini verək.

**Xassə 1.**  $[a, b)$  yarım intervalında kəsilməyən  $f(x)$  funksiyasının ibtidai funksiyası  $F(x)$  olduqda

$$\int_a^b f(x) dx = F(b-0) - F(a) \quad (1)$$
$$(F(b-0) = \lim_{x \rightarrow b-0} F(x))$$

**bərabərliyi (Nyuton-Leybnis düsturu) doğrudur.**

Bu halda (1) bərabərliyi aşağıdakı kimi başa düşülür: ya bərabərliyin hər iki tərəfi sonludur və (1) doğrudur, ya da bərabərliyin hər iki tərəfinin mənası yoxdur.

(1) bərabərliyini isbat etmək üçün  $[a, b - \delta]$  parçası üçün

$$\int_a^{b-\delta} f(x) dx = F(b-\delta) - F(a)$$

Nyuton-Leybnis düsturunu yazmaq, sonra da axırını bərabərlikdə  $\delta \rightarrow +0$  şərtində limitə keçmək lazımdır.

**Xassə 2.**  $U=f(x)$  və  $V=\varphi(x)$  funksiya­larının  $[a,b]$  yarımintervalında kəsilməz törəmələri varsa və

$$\int_a^b Udv, UV \Big|_a^b, \int_a^b Vdu$$

ifadələrinin hər hansı ikisi sonludursa, onda

$$\int_a^b UdV = UV \Big|_a^b - \int_a^b vdu \quad (2)$$

düsturu doğrudur.

(2) bərabərliyi müəyyən inteqralın hissə-hissə inteqrallama düsturuna əsasən isbat olunur.

**Misal .**

$$J_n = \int_0^1 (\ln x)^n dx$$

inteqralını hesablamalı.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x (\ln x)^n = 0$$

olduğundan (2) düsturuna əsasən alarıq:

$$\begin{aligned} J_n &= \int_0^1 (\ln x)^n dx = x(\ln x)^n \Big|_0^1 - n \int_0^1 (\ln x)^{n-1} dx = \\ &= -nJ_{n-1}, \quad n = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

Buradan,

$$J_0 = \int_0^1 dx = 1 \text{ olduğuna görə}$$

$$J_n = -nJ_{n-1} = -n[-(n-1)J_{n-2}] = (-1)^2 n(n-1)J_{n-2} = \dots = (-1)^n n!$$

və ya

$$J_n = (-1)^n n!$$

alınır.

Qeyri-məxsusi inteqralın başqa xassələrini də eyni qayda ilə isbat etmək olar.

İndi inteqralın bir sıra yığılma əlamətlərini qeyd edək.

Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası  $[a, b)$  yarımintervalında təyin olunmuş, mənfi qiymətlər almayan və istənilən  $[a, b - \delta]$  ( $0 < \delta \leq b - a$ ) parçasında inteqrallanan funksiyadır. Onda

$$F(\delta) = \int_a^{b-\delta} f(x) dx \quad (3)$$

funksiyası  $\delta \rightarrow +0$  şərtində monoton artan olur. Buna görə də sonlu və ya sonsuz

$$\lim_{\delta \rightarrow +0} F(\delta)$$

limiti həmişə var. Bu limitin sonlu olması üçün (3) inteqralının bütün  $0 < \delta \leq b - a$  ədədləri üçün məhdud olması zəruri və kafi şərtidir:

$$|F(\delta)| \leq M \quad (0 < \delta \leq b - a). \quad (4)$$

Buradan aşağıdakı təklifi alırıq:

**Teorem 1.**  $F(x)$  funksiyası  $[a, b)$  yarımintervalında təyin olunmuş və mənfi qiymətlər almayan funksiya olduqda (4) münasibətinin ödənilməsi

$$\int_a^b f(x) dx$$

**Inteqralının yığılan olması üçün zəruri və kafi şərtidir.**

Deməli, (4) şərti ödənilmədikdə

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow +0} \int_a^{b-\delta} f(x) dx = \infty$$

olar.

Bu teoremdən istifadə edərək qeyri-məxsusi inteqral-  
ların yığılması üçün müqayisə əlamətini isbat etmək olar.

**Teorem 2.**  $[a, b)$  yarımintervalında təyin olunmuş  
və istənilən  $[a, b - \delta]$  ( $0 < \delta < b - a$ ) parçasında inteq-  
rallanan  $f(x)$  və  $\varphi(x)$  funksiyaları üçün

$$0 \leq f(x) \leq \varphi(x) \quad (5)$$

bərabərsizliyi ödənilirsə, onda

$$J_1 = \int_a^b \varphi(x) dx$$

inteqralı yığılan olduqda

$$J_2 = \int_a^b f(x) dx$$

inteqralı da yığılır.  $J_2$  inteqralı dağılan olduqda inteq-  
ralı da dağılır.

**İsbatı.** Tutaq ki, inteqralı yığılır. Onda 1-ci teoremə  
görə

$$\int_a^{b-\delta} \varphi(x) dx \leq M \quad (0 < \delta \leq b - a) \quad (6)$$

olar. Buradan, (5) bərabərsizliyinə əsasən,

$$\int_a^{b-\delta} f(x) dx \leq \int_a^{b-\delta} \varphi(x) dx \leq M \quad (0 < \delta \leq b - a)$$

alınır ki, bu da  $J_2$  inteqralının yığılan olduğunu göstərir.

$J_2$  inteqralı dağılan olduqda

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\delta \rightarrow +0} \int_a^{b-\delta} f(x) dx = +\infty$$

olar. Bu halda (5) bərabərsizliyinə görə

$$\int_a^{b-\delta} f(x) dx \leq \int_a^{b-\delta} \varphi(x) dx.$$

olduğundan

$$\begin{aligned} +\infty &= \lim_{\delta \rightarrow +0} \int_a^{b-\delta} f(x) dx \leq \lim_{\delta \rightarrow +0} \int_a^{b-\delta} \varphi(x) dx = \\ &= \int_a^b \varphi(x) dx = +\infty \end{aligned}$$

**Teorem 3.**  $[a, b)$  yarımintervalında təyin olunmuş, mənfi qiymətlər almayan və istənilən  $[a, b - \delta]$  parçasında inteqrallanan  $f(x)$  və  $\varphi(x) > 0$  funksiyaları üçün

$$\lim_{x \rightarrow b-0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} = \gamma (0 < \gamma < \infty) \quad (7)$$

limiti varsa, onda  $J_1$  və  $J_2$  inteqralları eyni zamanda ya yığılır, ya da dağılır.

**İsbatı.** Limitin tərifinə görə istənilən  $0 < \varepsilon < \gamma$  ədədi üçün elə  $\delta > 0$  var ki,  $x$ -in  $b - \delta < x < b$  bərabərsizliyini ödəyən bütün qiymətlərində

$$\gamma - \varepsilon < \frac{f(x)}{\varphi(x)} < \gamma + \varepsilon$$

və ya

$$\begin{aligned} (\gamma - \varepsilon)\varphi(x) &< f(x) < (\gamma + \varepsilon)\varphi(x) \\ (b - \delta < x < b) \end{aligned} \quad (8)$$

bərabərsizlikləri ödənilir.

$$J_1 = \int_a^b \varphi(x) dx$$

inteqralı yığılan olduqda

$$\int_{b-\delta}^b \varphi(x) dx$$

inteqralı da yığılır. Onda 2-ci teoremə və (8) bərabərsizliklərinin sağ tərəfinə görə

$$\int_a^b f(x) dx$$

inteqralı da yığılır. Buradan  $J_2$  inteqralınının yığılması aydındır.

$$J_2 = \int_a^b f(x) dx$$

inteqralı yığılan olduqda

$$\int_{b-\delta}^b f(x) dx$$

inteqralı və (8) bərabərsizliyinə görə

$$\int_{b-\delta}^b (\gamma - \varepsilon) \varphi(x) dx = (\gamma - \varepsilon) \int_{b-\delta}^b \varphi(x) dx$$

inteqralı yığılan olar. Buradan inteqralın yığılan olması aydındır.

**Nəticə.** Tutaq ki,  $[a, b)$  yarımintervalında təyin olunmuş və mənfi qiymətlər almayan  $f(x)$  funksiyası üçün

$$\lim_{x \rightarrow b-0} (b-x)^\mu f(x) = \gamma \quad (9)$$

ödənilir. Onda 1)  $0 < \gamma < +\infty$  və  $\mu < 1$  olduqda

$$\int_a^b f(x) dx \quad (10)$$

inteqralı yığılır, 2)  $0 < \gamma < +\infty$  və  $\mu \geq 1$  olduqda isə (10) inteqralı dağılır.

Nəticənin doğruluğuna inanmaq üçün

$$\int_a^b \frac{dx}{(b-x)^\mu} \quad (11)$$

inteqralının  $\mu < 1$  olduqda yığılan,  $\mu \geq 1$  olduqda isə dağılan olduğunu nəzərə almaq lazımdır.

Xüsusi halda,  $x \rightarrow b-0$  şərtində

$$f(x) \approx \frac{1}{(b-x)^\mu}$$

olarsa, onda  $\mu < 1$  olduqda (10) inteqralı yığılar,  $\mu \geq 1$  olduqda isə dağılar.

Burada isbat olunan təkliflər uyğun şəkildə başqa qeyri-məxsusi inteqrallar (inteqralaltı funksiya  $a$  nöqtəsi və ya başqa daxili  $c(a < c < b)$  nöqtəsi ətrafında qeyri-məhdud olduqda) üçün də doğrudur.

### Misal 1.

$$\int_0^1 \frac{x^2 dx}{1-x^2}$$

inteqralı dağılır.

Doğrudan da,

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} (1-x) \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{1}{2}$$

olduğundan 3-cü teoremin nəticəsinə görə inteqral dağılır.



**Misal 2.**

$$\int_0^1 \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}}$$

inteqralı yığılır.

Doğrudan da,

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} (1-x)^{\frac{1}{2}} \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

olduğundan nəticəyə görə inteqral yığılır.

**17.5. Koşi kriterisi və inteqralın mütləq yığılma əlaməti**

Fərz edək ki,  $f(x)$  funksiyası  $[a, b)$  yarımintervalında təyin olunmuş və istənilən  $[a, b')$  ( $a \leq b' < b$ ) parçasında inteqrallanan funksiyadır. Onda istənilən  $a \leq x < b$  üçün

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \tag{1}$$

inteqralı sonlu olar. Aydındır ki,  $x \rightarrow b - 0$  şərtində  $F(x)$  funksiyasının sonlu limitinin varlığı

$$\int_a^b f(x) dx \tag{2}$$

qeyri-məxsusi inteqralının yığılmasına ekvivalentdir.

Koşi kriterisinə görə isə  $F(x)$  funksiyasının  $x \rightarrow b - 0$  şərtində sonlu limitinin varlığı üçün zəruri və kafi şərt belədir: istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  var ki,  $x$ -in  $b - \delta < x' < b, b - \delta < x'' < b$  bərabərsizliklərini ödəyən ixtiyari  $x'$  və  $x''$  qiymətlərində

$$|F(x'') - F(x')| < \varepsilon \tag{3}$$

münasibəti ödənilir. Burada

$$F(x'') - F(x') = \int_a^{x''} f(t) dt - \int_a^{x'} f(t) dt = \int_{x'}^{x''} f(t) dt$$

olduğunu nəzərə alsaq, (3) bərabərsizliyini

$$\left| \int_{x'}^{x''} f(t) dt \right| < \varepsilon \quad (4)$$

kimi yazıla bilər.

Buradan (2) inteqralının varlığı üçün aşağıdakı teorem alınır.

**Teorem 1. (Koşi kriterisi).** (2) inteqralının yığılan olması üçün zərurivə kafi şərtbelədir: istənilən  $\varepsilon < 0$  ədədi üçün elə  $\delta = \delta(\varepsilon)$  ədədinin olmasıdır ki,  $x$ -in  $b - \delta < x' < b$  və  $b - \delta < x'' < b$  bərabərsizliklərini ödəyən ixtiyari  $x'$  və  $x''$  qiymətlərində

$$\left| \int_{x'}^{x''} f(t) dt \right| < \varepsilon$$

münasibəti ödənilsin.

İndi (2) inteqralının mütləq yığılması haqqında teoremi isbat edək.

**Teorem 2. Qeyri-məxsusi**

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

inteqralı yığılırsa, onda (2) inteqralı da yığılır.

Doğrudan da,

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

inteqralı yığılan olduğundan Koşi kriterisinə görə istənilən  $\varepsilon > 0$  ədədi üçün elə  $\delta = \delta_\varepsilon$  var ki,  $b - \delta < b' < b$  və  $-\delta < b'' < b$  bərabərsizliklərini ödəyən istənilən  $b'$  və  $b''$  ədədləri üçün

$$\left| \int_{b'}^{b''} |f(x)| dx \right| < \varepsilon$$

ödənilir. Onda

$$\left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| \leq \left| \int_{b'}^{b''} |f(x)| dx \right|$$

olduğundan göstərilən ixtiyari  $b'$  və  $b''$  ədədləri üçün

$$\left| \int_{b'}^{b''} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

bərabərsizliyi ödənilir. Buradan, Koşi Kriterisinə görə, (2) inteqralının yığılması aydındır.

Qeyd edək ki, (2) inteqralı yığıldıqda

$$\int_a^b |f(x)| dx$$

inteqralı dağılan da ola bilər. Bu halda (2) inteqralına **şərti yığılan inteqral** deyilir.

**Misal.**

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x}} dx$$

inteqralı yığılır.

Doğrudan da,  $0 \leq x < 1$  olduqda

$$0 \leq \left| \frac{\sin x}{\sqrt{1-x}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{1-x}}$$

bərabərsizliyi ödənilir. Sağ tərəfdəki funksiyanın

$$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x}}$$

inteqralı yığılan olduğundan,

$$\int_0^1 \left| \frac{\sin x}{\sqrt{1-x}} \right| dx$$

inteqralı da yığılandır. Onda, indi isbat etdiyimiz 2-ci teoremə görə

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x}} dx$$

inteqralı yığılır.

## XVIII FƏSİL.ÇOXDƏYİŞƏNLI FUNKSIYANIN DİFERENSİAL VƏİNTEQRAL HESABI

### 18.1.Əsas anlayışlar.Çoxdəyişənli funksiyanın tərif

İndiyə qədər ancaq bir dəyişəndən (bir arqumentdən) asılı funksiyaları nəzərdən keçirmişik.

Amma praktikada tez-tez çoxdəyişənli funksiyalar ilə rastlaşırıq. Məsələn, OM qanununda, yəni

$$I = \frac{E}{R}$$

( $I$  -cərəyan şiddəti,  $E$  -elektrik hərəkət qüvvəsi,  $R$  -isə müqavimətdir) düsturunda cərəyan şiddəti funksiya kimi iki  $E$  və  $R$  arqumentindən asılıdır. Bunun kimi də düzbucaqlı paralellipedin həcmi  $V = x \cdot y \cdot z$  üç dəyişəndən asılı olaraq dəyişir və s.

**Tərif 1.** Hər bir cüt  $x$  və  $y$  dəyişəninin mümkün qiymətlərinə,  $z$  dəyişəninin ancaq bir qiymətini qarşı qoyan qayda (və ya qanun) verilmişdirsə, onda  $z$  -ə  $x$  və  $y$  dəyişənlərinin ikidəyişənli funksiyası deyilir və aşağıdakı işarələrdən biri ilə yazılır:

$$z = f(x, y), z = \varphi(x, y), z = F(x, y), z = z(x, y) \text{ və s.}$$

Burada  $z$  asılı dəyişən və ya funksiya,  $x$ ,  $y$  isə sərbəst dəyişən və ya arqument adlanır.  $x = a$  və  $y = b$  olduqda  $z = f(x, y)$  funksiyasının xüsusi qiyməti  $f(a, b)$  şəklində yazılır.  $x$  və  $y$  dəyişənlərinin nizamlanmış cütü  $M(x, y)$  nöqtəsi, bu nöqtənin funksiyası isə  $z = f(M)$  kimi yazılır. İkidəyişənli funksiya həndəsi olaraq fəzada müəyyən bir səthi ifadə edir.

**Tərif 2.**  $x, y, z$  dəyişənlərinin hər bir nizamlanmış üçlüyünün qiymətinə,  $u$  dəyişəninin yeganə qiymətini qarşı qoyan qayda (və ya qanun) verilmişdirsə, ondau dəyişəninə  $x, y, z$  dəyişənlərinin üçdəyişənli funksiyası deyilir və  $u = f(x, y, z)$ ,  $u = F(x, y, z)$ ,  $u = \varphi(x, y, z)$  və s. kimi işarə olunur. Burada  $u$  -asılı dəyişən və ya funksiya  $x, y, z$  isə sərbəst dəyişən və ya argument adlanır.

Oxşar qayda ilə  $x_1, x_2, \dots, x_n$  argumentlərindən asılı  $n$  -dəyişənli funksiyaya tərif verilir və

$$w = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad w = F(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

$$w = w(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad \text{və s. kimi işarə olunur.}$$


$x_1, x_2, \dots, x_n$  argumentlərinin  $M$  nöqtəsinin koordinatları qəbul etsək,  $n$  -dəyişənli funksiyanı nöqtənin funksiyası, yəni  $w = f(M)$  kimi yazmaq olar.

Bir dəyişənli funksiya kimi çoxdəyişənli funksiyalar da analitik üsulla, cədvəl şəklində, qrafik üsulla, proqram vasitəsilə və s. şəklində verilə bilər.

**Tərif 3.** Verilmiş funksiyanın analitik ifadəsinin mənalı olduğu və funksiyanın sonlu həqiqi qiymətlər olduğu nöqtələr çoxluğuna həmin funksiyanın təyin oblastı deyilir.

Tutaq ki,  $x, y, z$  düzbucaqlı Dekart koordinat sistemi verilmişdir.  $Z = f(x, y)$  ikidəyişənli funksiyanın təyin olunduğu oblastın hər hansı  $P(x, y)$  nöqtəsini götürək və  $Z$  -in uyğun qiymətini hesablayaq.  $P(x, y)$  nöqtəsindən uzunluğu  $|Z|$  olan perpendikulyar qalldırağ ( $Z$  -in işarəsindən asılı olaraq bu və ya digər tərəfə). Nəticədə fəzada  $M(x, y, z)$  nöqtəsi alınır.  $P(x, y)$  nöqtəsi

və ona uyğun olaraq  $M(x, y, z)$  nöqtəsi də yerini dəyişərək hər hansı səth cızır.



**Şəkil 1.**

Həmin səth, verilən  $Z = f(x, y)$  ikidəyişənli funksiyayı həndəsi təsvir edir, yəni bu funksiyanın “qrafiki”dir (şəkil 1).

**Tərif 4.** Mərkəzi  $P(x, y)$  nöqtəsində və radiusu  $r$  olan dairənin daxili nöqtələrinə  $P$  nöqtəsinin  $r$  radiuslu ətrafı (qısa olaraq  $r$ -ətrafı) deyilir.

**Tərif 5.**  $P$  nöqtəsinin  $r$ -ətrafında  $P$  nöqtəsinin özü olmadıqda ( $P$ -nöqtəsi çıxarılıb atıldıqda və ya dəşilib çıxarıldıqda) bu ətrafa  $P$  nöqtəsinin  $r$  yaxınlığı deyilir.

Bu təriflərdən çıxır ki,  $P$  nöqtəsinin  $r$ -ətrafına  $P$ -nin özü daxil olduğu halda,  $P$  nöqtəsinin  $r$  yaxınlığına  $P$ -nin özü daxil deyil. Başqa sözlə,  $P$  nöqtəsinin  $r$  ətrafı bu nöqtədən  $d < r$  məsafədə olan nöqtələr çoxluğudur ( $0 \leq d < r$ ),  $P$  nöqtəsinin  $r$ -yaxınlığı  $0 < d < r$  şərtini ödəyən nöqtələr çoxluğudur.

**Tərif 6.** Qeyd olunmuş  $M(a_1, a_2, \dots, a_n)$  nöqtəsindən məsafəsi  $r$ -i aşmayan  $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$  nöqtələr çoxluğuna

**$n$  -ölçülü kürə (  $M$  -kürənin mərkəzi,  $r$  -isə onun radiusudur) deyilir.**

Aydın ki, belə kürənin nöqtələri

$$\sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2} \leq r \quad (1)$$

və yaxud da

$$(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2 \leq r^2 \quad (2)$$

şərtini ödəyir.

(1) və (2) şərtini ödəyən nöqtələr çoxluğuna  $n$  - ölçülü qapalı kürə deyilir. Belə ki, belə kürənin daxili nöqtələri

$$(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2 < r^2 \quad (3)$$

bərabərsizliyi, onun sərhəddi isə

$$(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2 = r^2 \quad (4)$$

tənliyi ilə təyin olunan  $(n-1)$  ölçülü sfera adlanır (kürə ilə əhatə olunmuş “səth”).(3) bərabərsizliyi açıq kürə təyin edir. Xüsusi halda  $n = 2$  olduqda

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 \leq r^2 \quad (5)$$

münasibəti alınır ki, ona  $oxy$  müstəvisində qapalı dairə (yəni onu əhatə edən çevrənin nöqtələri bura daxildir) adlanır. Bu dairənin çevrəsinin tənliyi

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \quad (6)$$

şəklindədir (şəkil 1). Açıq dairəni (bu çoxluğa çevrənin nöqtələri daxil deyildir)

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 < r^2 \quad (7)$$


bərabərsizliyi ifadə edir (şəkil 2.)

$n = 3$  olduqda (6) və (7) münasibətlərini




$$\begin{aligned} (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 &= r^2 \\ (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 &< r^2 \end{aligned} \quad (8)$$

şəklində yazmaq olar.



Şəkil 1.



Şəkil 2.

**Tərif 7. Müstəvisinin aşağıdakı iki şərti ödəyən  $G$  nöqtələr çoxluğuna oblast deyilir.**

a) hər bir  $M$  nöqtəsi özünün hər hansı ətrafı ilə  $G$  çoxluğuna daxildir (belə nöqtələr daxili nöqtələr adlanır).

b)  $G$  -yə daxil olan hər hansı  $M_1$  və  $M_2$  nöqtələrini ona daxil olan kəsilməz əyri ilə birləşdirmək mümkün olsun.


Qapalı və ya açıq  $G$  oblastının cüt-cüt götürülmüş nöqtələri arasındakı məsafənin dəqiq yuxarı sərhəddi bu oblastın diametri adlanır.

**Tərif 8.  $M$  nöqtəsi özünün hər hansı ətrafı ilə birlikdə çoxluğa daxil olarsa, belə nöqtəyə daxili nöqtə deyilir (şəkil 2).**


**Tərif 9.  $M$  nöqtəsinin istənilən ətrafında çoxluğa həm daxil olan və həm də daxil olmayan nöqtələr olarsa,**

onda bu nöqtəyə çoxluğun (oblastın) sərhəd nöqtəsi deyilir (şəkil 2).

Oblastın (çoxluğun) bütün sərhəd nöqtələri onun sərhəddi adlanır



Şəkil 2.



Şəkil 3.

### 18.2.1.Çoxdəyişənli funksiyanın limiti

**Tərif 1.** İxtiyari  $\varepsilon > 0$  görə elə  $\delta(\varepsilon)$  göstərmək mümkündürsə ki,  $M_1$  nöqtəsinin  $\delta$ -yaxınlığındakı bütün  $M$  nöqtələri üçün  $f(M)$  funksiyanın qiymətləri  $a$  ədədinin  $\varepsilon$ -ətrafına daxil olsun, onda  $a$ -ədədinə  $U = f(m)$  funksiyanın  $M \rightarrow M_1$  şərtində limiti deyilir və aşağıdakı şəkildə yazılır.

$$a = \lim_{M \rightarrow M_1} f(M) \text{ və ya } a = \lim_{\begin{cases} x_1 \rightarrow a_1 \\ x_2 \rightarrow a_2 \\ \dots \\ x_n \rightarrow a_n \end{cases}} f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (1)$$

Burada

$$|f(M) - a| < \varepsilon, \quad 0 < d(M, M_1) < \delta(\varepsilon)$$

$$M(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad M_1(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

$$d(M, M_1) = \sqrt{(x-a_1)^2 + (x-a_2)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2}$$

**Bu tərifə əsasən  $a$  limiti  $M$  nöqtəsinin  $M_1$  nöqtəsinə hansı üsulla yaxınlaşmasından asılı deyil.**

Bunu ikidəyişənli  $Z = f(x, y)$  funksiyası üçün həndəsi olaraq təsvir etmək olar (şəkil 3.). Burada  $M(x, y)$  nöqtəsinin  $M_1(a, b)$  nöqtəsinə üç müxtəlif üsul ilə yaxınlaşması göstərilmişdir.

### 18.2.2. Təkrar limit

Əvvəlki paraqrafda funksiya limitinə  $X \rightarrow X^{(0)}$  şərtində, yəni  $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)$  nöqtəsinin bütün  $x=x_i (i=1, 2, \dots, n)$  koordinatları  $X^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$  nöqtəsinin uyğun  $x_i^{(0)}$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) koordinatlarına eyni zamanda yaxınlaşdıqda ( $x_i \rightarrow x_i^{(0)}$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) tərif verilmişdir. Buna görə də həmin limitə bəzən  $n$ -qat limit ( $n=2$  olduqda ikiqat,  $n=3$  olduqda üçqat və s) deyilir.

Çoxdəyişənli funksiyaaların,  $x_1$  arqumentləri növbə ilə uyğun  $x_1^{(0)}$  ədədlərinə yaxınlaşdıqda da limitindən danışmaq olar. Belə alınan

$$\lim_{x_1 \rightarrow x_1^{(0)}} \lim_{x_2 \rightarrow x_2^{(0)}} \dots \lim_{x_n \rightarrow x_n^{(0)}} f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

limitinə  $f$  funksiyanın təkrar limiti deyilir. (1) ifadəsində limitlərin yerini dəyişməklə müxtəlif təkrar limitlər almaq olar.

İkidəyişənli funksiyaaların iki dənə təkrar limitivardır:

$$\lim_{x \rightarrow a} \lim_{y \rightarrow b} f(x, y) \quad \lim_{y \rightarrow b} \lim_{x \rightarrow a} f(x, y) \quad (2)$$

İkidəyişənli funksiyanın ikiqat və təkrar limitlərinin varlığı və bərabərliyi haqqında müxtəlif vəziyyətlər ola bilər .

**Misal.**

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & x^2 + y^2 \neq 0 \text{ olduqda ,} \\ 0 & x = y = 0 \text{ olduqda} \end{cases}$$

(3)

funksiyasının  $(0, 0)$  nöqtəsində limiti (ikiqat limiti) yoxdur, lakin nöqtədə təkrar limitləri var:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$$

### 18.2.3.Çoxdəyişənli funksiyanın kəsilməzliyi

**Tərif 1.**  $U = f(M)$  funksiyası üçün aşağıdakı üç şərt ödənildikdə  $M_0$  nöqtəsində kəsilməyən funksiya deyilir:

a)  $U = f(M)$  funksiyası  $M_0$  nöqtəsində təyin olunmuşdur;

b)  $\lim_{M \rightarrow M_0} f(M)$  limiti vardır;

c) Funksiyanın limit qiyməti onun  $M_0$  nöqtəsindəki xüsusi qiymətinə bərabərdir, yəni

$$\lim_{M \rightarrow M_0} f(M) = f(M_0) \quad (1)$$

Əgər  $M_0$  nöqtəsində yuxarıdakı üç şərtəndən biri pozularsa, onda funksiya həmin nöqtədə kəsilmən funksiya adlanır.

**Tərif 2.** Oblastın hər bir nöqtəsində kəsilməyən funksiya həmin oblastda kəsilməyən funksiya deyilir.

**Tərif 3.** Tutaq ki,  $U = f(M)$  funksiyası  $E$  çoxluğunda təyin olunmuşdur və  $\forall \varepsilon > 0$  ədədi üçün  $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$

$$0 < \rho(M, M_0) < \delta$$

$E$  çoxluğunun bərabərsizliyini ödəyən bütün  $M \in E$  nöqtələrində

$$|f(M) - f(M_0)| < \varepsilon \quad (2)$$


bərabərsizliyi ödənilir. Onda  $U = f(M)$  funksiyasına  $M_0 \in E$  nöqtəsində kəsilməyən funksiya deyilir.

Xüsusi halda, tutaq ki,  $Z = f(x, y) = f(M)$  ikidəyişənli funksiyası  $M_0(a, b)$  nöqtəsində kəsilməyəndir. Bu o deməkdir ki,  $M$  nöqtəsi  $M_0$  nöqtəsinə ixtiyari qayda ilə yaxınlaşa bilər, məsələn, bu yaxınlaşma koordinat oxlarına paralel olan düz xətlər boyunca ola bilər. Aydın ki, bu halda (1) bərabərliyi ödəniləcəkdir. Belə ki, birinci halda


$$Z = f(x, y) = F(x) \text{ və } \lim_{x \rightarrow a} F(x) = f(a, b) = F(a) ;$$

ikinci halda isə

$$Z = f(x, y) = \phi(y) \text{ və } \lim_{y \rightarrow b} \phi(y) = f(a, b) = \phi(b)$$



Şəkil 5.



Şəkil 6.

Göründüyü kimi  $F(x)$  və  $\phi(y)$  funksiyaları birdəyişənli funksiya kimi hər biri ayrılıqda kəsilməyəndir, yəni  $Z$  funksiyası hər bir arqumentə nəzərən ayrılıqda kəsilməyəndir. Lakin asanlıqla göstərmək olar ki, tərs təklif həmişə doğru olmaya da bilər. Kəsilməz funksiyalar üçün aşağıdakıları söyləmək olar.

1) Verilmiş nöqtədə kəsilməyən sonlu sayıda funksiyaların cəbri cəmi, hasili bu nöqtədə kəsilməyən iki funksiya nisbəti də həmin nöqtədə kəsilməyəndir.

2) Mürəkkəb funksiyanın kəsilməzliyi. Tutaq ki,  $x_1, x_2, \dots, x_n$  sərbəst dəyişənlərinin  $U_1 = \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $U_2 = \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, U_m = \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$  funksiyaları hər hansı  $M_0(x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \dots, x_n^{(0)})$  nöqtəsində kəsilməyən funksiyalardır və tutaq ki,  $V = f(u_1, u_2, \dots, u_m) = F(x_1, x_2, \dots, x_n)$  funksiyası  $m$ -dənə aralıq  $u_1, u_2, \dots, u_m$  arqumentlərindən asılıdır, yəni  $Q_0[u_1(M_0), u_2(M_0), \dots, u_m(M_0)]$  nöqtəsində kəsilməyən mürəkkəb funksiya. Onda belə təyin olunmuş  $V = f[\varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \varphi_2(\dots), \dots, \varphi_m(\dots)]$  mürəkkəb funksiyası  $M_0$  nöqtəsində kəsilməyəndir.

3) Tutaq ki,  $U = f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(M)$  funksiyası sonlu diametri olan  $G$  oblastında kəsilməyən funksiya-dır, onda

a) funksiya  $G$  oblastında məhduddur;

b)  $G$  oblastında funksiyanın aldığı ədədi qiymətlər çoxluğunun dəqiq aşağı və dəqiq yuxarı sərhədləri vardır, həm də bu ədədləri funksiya heç olmazsa oblastın bir nöqtəsində alır. Bu qiymətlər (dəqiq aşağı və dəqiq yuxarı sərhəd qiymətləri) uyğun olaraq funksiyanın  $G$  oblastında ən kiçik və ən böyük qiyməti adlanır. Bu qiymətlərin fərqi isə funksiyanın həmin oblastda rəqsi adlanır.

c) hər hansı  $\varepsilon > 0$  üçün  $G$  oblastının sonlu sayda elə kiçik oblastlara bölmək olar ki, funksiyanın rəqsi hər bir xüsusi oblastda  $\varepsilon$ -dan kiçik olar;

ç) hər bir  $\varepsilon > 0$  üçün elə  $\delta(\varepsilon) > 0$  ədədi tapmaq olar ki, istənilən iki  $M_1, M_2 \in G$  nöqtələri arasındakı məsafə  $\delta(\varepsilon)$ -dan kiçik olduqda,  $|f(M_1) - f(M_2)| < \varepsilon$  olar (funksiyanın  $G$  oblastında müntəzəm kəsilməzliyi).

d)  $G$  oblastının onun hər hansı nöqtəsinə qədər sıxdıqda funksiyanın rəqsi sifıra yaxınlaşır.

**Tərif 3.** Əgər  $U = f(M) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  funksiyası  $M_0$  nöqtəsinin yaxın ətrafında təyin olunub, bu nöqtənin özündə kəsiləndirsə, onda  $M_0$  nöqtəsinə funksiyanın kəsilmə nöqtəsi deyilir.  $f(M)$  funksiyanın kəsilmə nöqtələrinin yerləşdiyi xəttə bu funksiyanın kəsilmə xətti deyilir.

### 18.3.Çoxdəyişənli funksiyanın xüsusi törəməsi.

Əvvəlcə ikidəyişənli  $Z = f(x, y)$  funksiyanın xüsusi törəmələrinə baxaq. Bu funksiyanın xüsusi artımları uyğun olaraq

$$\Delta_x Z = f(x + \Delta x, y) - f(x, y) \quad (1)$$

$$\Delta_y Z = f(x, y + \Delta y) - f(x, y) \quad (2)$$

şəklində, tam artımı isə

$$\Delta Z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \quad (3)$$

şəklində təyin olunur.

Funksiyanın  $\Delta_x Z$  və  $\Delta_y Z$  xüsusi artımlarından düzəldilmiş  $\frac{\Delta_x Z}{\Delta x}$  və  $\frac{\Delta_y Z}{\Delta y}$  nisbətləri uyğun olaraq, bu funksiyanın  $x$  arqumentinə nəzərən  $MM_1$  düz xətt parçası,  $y$  arqumentinə nəzərən isə  $MM_2$  düz xətt parçası üzrə onun dəyişməsinin orta sürətini təyin edir.

**Tərif 1.** İkidəyişənli  $Z = f(x, y)$  funksiyanın xüsusi artımının uyğun arqument artımına olan nisbətinin, arqument artımı sıfıra yaxınlaşdıqda limiti varsa, bu limitə funksiyanın həmin arqumentə nəzərən bir-tərtibli xüsusi törəməsi deyilir və aşağıdakı şəkildə təyin olunur:

$$f'_x(x, y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x Z}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y) - f(x, y)}{\Delta x} \quad (4)$$

$$f'_y(x, y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y Z}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y}$$



Xüsusi törəmənin göstərilən  $f'_x(x, y)$  və  $f'_y(x, y)$  işarələrindən başqa  $Z'_x, \frac{\partial Z}{\partial x}$  və ya uyğun olaraq  $Z'_y, \frac{\partial Z}{\partial y}$  işarələrindən də istifadə olunur.

Oxşar qayda ilə üç və daha çox dəyişənli funksiyanın xüsusi törəmələrinə tərif vermək olar:

a)  $U = f(x, y, z)$  - üç dəyişənli funksiyanın xüsusi törəmələri:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = f'_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = f'_y(x, y, z) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta_y u}{\Delta y} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x, y + \Delta y, z) - f(x, y, z)}{\Delta y}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = f'_z(x, y, z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\Delta_z u}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z} \quad (5)$$

b)  $n$  - dəyişənli  $W = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  funksiyanın xüsusi törəmələri:

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial x_k} &= f'_{x_k}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\ &= \lim_{\Delta x_k \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_k + \Delta x_k, \dots, x_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\Delta x_k} \end{aligned} \quad (6)$$

Burada (4), (5) və (6) törəmələri funksiyanın bir-tərtibli xüsusi törəmələri adlanır.

Qeyd edək ki, çoxdəyişənli funksiyanın xüsusi törəmələrini taparkən adi törəmə alma qaydalarından və diferensiallama düsturlarından istifadə olunur (burada  $x_k$  -ya nəzərən törəmə aldıqda  $x_k$  -dan başqa o biri arqumentlər sabit hesab olunur).

**Tərif 4.** Əgər  $W = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  funksiyası üçün,  $t \neq 0$  olmaqla

$$f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^m f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

münasibəti ödənirsə, onda bu funksiya  $m$ -ölçülü (və ya  $m$  dərəcəli) bircins funksiya deyilir.

**Teorem 1.(Eylər).** Tutaq ki,  $W = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  funksiyası  $m$  ölçülü bircins funksiya olmaqla hər bir dəyişənə nəzərən xüsusi törəməyə malikdir. Onda aşağıdakı münasibət doğrudur:

$$\begin{aligned} x_1 f'_{x_1}(x_1, x_2, \dots, x_n) + x_2 f'_{x_2}(x_1, x_2, \dots, x_n) + \dots + \\ + \dots + x_n f'_{x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = mf(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{aligned} \quad (7)$$

#### 18.4.1.Funksiyanın nöqtədə diferensiallanan olması

Verilmiş  $\sigma \subset E_2$  oblastın da təyin olunmuş ikidəyişənli  $f$  funksiyasına baxaq.

Fərz edək ki,  $(x, y)$  bu oblastın hər hansı nöqtəsidir və  $x, y$  dəyişənləri uyğun olaraq elə  $\Delta x$  və  $\Delta y$  artımları alır ki,  $(x + \Delta x, y + \Delta y)$  nöqtəsi yenə də həmin oblasta daxil olur. Onda  $W = f(x, y)$  funksiyası

$$\Delta W = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \quad (1)$$

artımını alır.

(1) ifadəsinə  $f$  funksiyasının  $(x, y)$  nöqtəsində artımı (və ya tam artımı) deyilir.

**Tərif 1.**  $f$  funksiyasının  $(x, y)$  nöqtəsində artımını

$$\Delta W = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y \quad (2)$$

şəklində göstərmək mümkün olduqda, ona həmin nöqtədə diferensiallanan (və ya diferensiallana bilən) funksiya deyilir. A burada  $A = A(x, y)$  və  $B = B(x, y)$  ar-

qumentlərin  $\Delta x$  və  $\Delta y$  artımlarından asılı olmayan kəmiyyətlər,  $\alpha = \alpha(\Delta x, \Delta y)$  və  $\beta = \beta(\Delta x, \Delta y)$  isə  $(\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0)$  şərtində sonsuz kiçilən funksiyalardır:

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \alpha(\Delta x; \Delta y) = 0$$

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \beta(\Delta x; \Delta y) = 0$$

**Tərif 2.**  $\sigma$  oblastının istənilən nöqtəsində diferensiallanan funksiya həmin oblas da diferensiallanan funksiya deyilir.

İkidəyişənli funksiyanın diferensiallanan olması haqqında yuxarıda verilmiş təriflər uyğun şəkildə  $n$ -dəyişənli ( $n \geq 2$ ) funksiyalar üçün də doğrudur.  $n$ -dəyişənli  $f$  funksiyanın  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  nöqtəsində diferensiallanma şərti

$$\Delta W = A_1(X)\Delta x_1 + A_2(X)\Delta x_2 + \dots + A_n(X)\Delta x_n + \varepsilon p \quad (4)$$

kimi yazılır; burada  $p = \sqrt{\sum_{k=1}^n (\Delta x_k)^2}$  və  $\lim_{p \rightarrow 0} \varepsilon = 0$ .

### 18.4.2. Çoxdəyişənli funksiyanın diferensiallanan olması üçün zəruri şərtlər.

**Teorem 1.**  $(x, y)$  nöqtəsində diferensiallanan  $f$  funksiyası həmin nöqtədə kəsilməyəndir.

**İsbatı.**  $W = f(x, y)$  funksiyası  $(x, y)$  nöqtəsində diferensiallanan olduğundan həmin nöqtədə onun artımı

$\Delta W = A\Delta x + B\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y, \alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0$  (1) şəklində göstərilə bilər.

Buradan

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \Delta W = 0$$

alınır ki, bu da funksiyanın  $(x, y)$  nöqtəsində kəsilməz olduğunu göstərir .

**Nəticə 1. Funksiya kəsildiyi nöqtədə diferensiallanan ola bilməz .**

**Teorem 2. Verilmiş  $(x, y) \in \sigma$  nöqtəsində diferensiallanan  $f$  funksiyanın həmin nöqtədə sonlu  $f'_x(xy)$  və  $f'_y(xy)$  xüsusi törəmələri var.**

**İsbatı.**  $W = f(x, y)$  funksiyanın  $(x, y)$  nöqtəsində diferensiallanan olduğundan bu nöqtədə onun artımı üçün (1) göstəriləsi doğrudur Həmin bərabərlikdə  $\Delta x \neq 0$  və  $\Delta y = 0$  hesab etsək

$$\Delta_x W = A\Delta x + \alpha \cdot \Delta x, \quad \alpha \rightarrow 0 (\Delta x \rightarrow 0)$$

olar. Bu bərabərliyin hər iki tərəfini  $\Delta x$  artımına bölərək  $\Delta x \rightarrow 0$  şərtində limitə keçək:

$$\frac{\Delta_x W}{\Delta x} = A + \alpha, \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x W}{\Delta x} = A.$$

**Deməli** ,  $(x, y)$  nöqtəsində  $W'_x = f'_x(x, y)$  xüsusi törəməsi var və  $A = f'_x(x, y)$  bərabərliyi doğrudur.

Eyni qayda ilə  $(x, y)$  nöqtəsində  $f'_y(x, y)$  xüsusi törəməsinin varlığı və  $B = f'_y(x, y)$  bərabərliyinin doğruluğu isbat olunur.

**Nəticə 2. Verilmiş  $(x, y)$  nöqtəsində diferensiallanan  $f$  funksiyanın həmin nöqtədə artımı.**

$\Delta W = f'_x(x, y)\Delta x + f'_y(x, y)\Delta y + \varepsilon p, \varepsilon \rightarrow 0 (p \rightarrow 0)$  (2) şəklində göstərilə bilər.

**Nəticə 3.  $f$  funksiyanın  $f'_x(x, y)$  və  $f'_y(x, y)$  xüsusi törəmələrinin heç olmasa birinin olmadığı nöqtədə diferensiallanan deyildir.**

### 18.4.3. Çoxdəyişənli funksiyanın yüksək tərtibli xüsusi törəmələri.

Əvvəlcə  $\sigma$  oblastında təyin olunmuş ikidəyişənli  $W=f(x,y)$  funksiyanın yüksəktərtibli xüsusi törəmələrini təyin edək.

Aydındır ki, ikidəyişənli  $W=f(x,y)$  funksiyanın  $f_x(x,y)$  və  $f_y(x,y)$  xüsusi törəmələri də  $x$  və  $y$  dəyişənlərinin funksiyalarıdır. Buna görə onların da xüsusi törəmələrindən danışmaq olar.

$f(x,y)$  funksiyanın birtərtibli  $f'_x(x,y)$  və  $f'_y(x,y)$  xüsusi törəmələrinin  $x, y$  arqumentinə nəzərən törəmələrinə  $f$  funksiyanın ikitərtibli xüsusi törəmələri deyilir və

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f''_{xx}(x,y)$  (ardıcıl olaraq iki dəfə  $x$ -ə nəzərən törəmə alınır)

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f''_{xy}(x,y)$  (əvvəlcə  $x$ -ə nəzərən sonra isə  $y$ -ə nəzərən törəmə alınır)

$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f''_{yx}(x,y)$  (əvvəlcə  $y$ -ə nəzərən, sonra isə  $x$ -ə nəzərən törəmə alınır)

$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f''_{yy}(x,y)$  (ardıcıl olaraq  $y$ -ə nəzərən iki dəfə törəmə alınır) kimi işarə olunur.

Funksiyanın ikitərtibli xüsusi törəmələrinin  $x$  və  $y$  arqumentlərinə nəzərən törəmələrinə onun üçtərtibli xüsusi törəmələri deyilir və

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}, \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial x}, \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial x \partial y^2}, \dots,$$

kimi işarə olunur. Funksiyanın  $(m-1)$  tərtibli xüsusi törəməsinin törəməsi onun  $m$  tərtibli xüsusi törəməsi olar. Verilmiş funksiyanın əvvəlcə  $k$  dəfə ardıcıl olaraq  $x$ -ə

nəzərən, sonra isə (**m-k**) dəfə **y-ə** nəzərən törəməsi hesablandıqda onun **m** tərtibli xüsusi törəməsi alınar.

Eyni qayda ilə  $n$  dəyişənli  $W = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  funksiyasının birtərtibli  $\frac{\partial f}{\partial x_k}$ , ikitərtibli  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_i}$ , üçtərtibli  $\frac{\partial^3 f}{\partial x_k \partial x_i \partial x_j}$  ( $k, i, j=1, 2, \dots, n$ ) və s. xüsusi törəmələrindən danışmaq olar.

Verilmiş funksiyanın müxtəlif arqumentlərinə nəzərən alınmış yüksəktərtibli törəmələrinə onun qarışıq xüsusi törəmələri deyilir. İkidəyişənli  $f(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  funksiyasının iki ədəd ikitərtibli  $\frac{\partial^2 f}{\partial y_k \partial y}$  və  $\frac{\partial^2 f}{\partial y_k \partial x}$  qarışıq xüsusi törəmələri var.

**Misal.**  $W = x^2 e^{xy}$  funksiyasının ikitərtibli xüsusi törəmələrini hesablamalı.

$$\frac{\partial W}{\partial x} = 2xe^{xy} + yx^2 e^{xy} \quad \text{və} \quad \frac{\partial W}{\partial y} = x^3 e^{xy}$$

olduğundan

$$\frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 2e^{xy} + 4yxe^{xy} + y^2 x^2 e^{xy},$$

$$\frac{\partial^2 W}{\partial x \partial y} = 3x^2 e^{xy} + yx^3 e^{xy},$$

$$\frac{\partial^2 W}{\partial y \partial x} = 3x^2 e^{xy} + yx^3 e^{xy}$$

$$\frac{\partial^2 W}{\partial y^2} = x^4 e^{xy} \text{ olar.}$$

Buradan görünür ki,  $W = x^2 e^{xy}$  funksiyasının ikitərtibli qarışıq xüsusi törəmələri bərabərdir:

$$\frac{\partial^2 W}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 W}{\partial y \partial x} = 3x^2 e^{xy} + yx^3 e^{xy}.$$

Bununla əlaqədar olaraq belə bir sual qarşıya çıxır: çoxdəyişənli funksiyanın müxtəlif arqumentlərə nəzərən diferensiallanması nəticəsi diferensiallanmanın növbəsindən asılıdır mı? Bu suala aşağıdakı teoremlə cavab ver-

mək olar.

**Teorem (Şvars).**  $(x_0, y_0)$  nöqtəsinin müəyyən ətrafında  $W = f(x, y)$  funksiyanın ikitərtibli qarışıq xüsusi törəmələri  $f''_{xy}(x, y)$  və  $f''_{yx}(x, y)$  varsa və  $(x_0, y_0)$  nöqtəsində kəsilməyəndirsə, onda həmin nöqtədə onlar bir-birinə bərabərdir.

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0). \quad (1)$$

**İsbatı.** Arqumentlərə elə  $\Delta x$  və  $\Delta y$  artımları verək ki,  $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$  nöqtəsi  $(x_0, y_0)$  nöqtəsinin teoremdə göstərilən ətrafına daxil olsun. Bu halda

$$A = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0 + \Delta y) + f(x_0, y_0) \quad (2)$$

ifadəsini  $\varphi(x) = f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)$  funksiyası vasitəsilə

$$A = \varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0) \quad (3)$$

kimi yazmaq olar. (3) fərqinə Laqranjın sonlu artım haqqındakı teoremini tətbiq etsək

$$A = \varphi'(x_0 + \theta_1 \Delta x) \Delta x, \quad 0 < \theta_1 < 1 \text{ və ya}$$

$$A = [f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \Delta y) - f'_x(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0)] \Delta x \quad (4)$$

bərabərliyini alırıq. (4) fərqinə isə  $y$  dəyişəninə nəzərən Laqranj teoremini tətbiq etmək olar.

$$A = f''_{xy}(x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) \Delta x \Delta y, \quad 0 < \theta_1 < 1, \quad 0 < \theta_2 < 1 \quad (5)$$

(2) ifadəsi üzərində apardığımız əməliyyatı əvvəlcə  $y$ , sonra isə  $x$  dəyişəninə nəzərən aparsaq onda,

$$A = f''_{yx}(x_0 + \theta_3 \Delta x, y_0 + \theta_4 \Delta y) \Delta x \Delta y, \quad 0 < \theta_3 < 1, \quad 0 < \theta_4 < 1 \quad (6)$$

(5) və (6) bərabərliklərinə əsasən

$f''_{xy} (x_0 + \theta_1 \Delta x, y_0 + \theta_2 \Delta y) = f''_{xy} (x_0 + \theta_3 \Delta x, y_0 + \theta_4 \Delta y)$   
 alınar. Bu bərabərlikdə  $\Delta x \rightarrow 0, \Delta y \rightarrow 0$  şərtində limitə keçsək və ikitərtibli qarışıq xüsusi törəmələrin  $(x_0, y_0)$  nöqtəsində kəsilməz olduğunu nəzərə alsaq

$$f''_{xy}(x_0, y_0) = f''_{yx}(x_0, y_0)$$

alınar.

**Nəticə 1.**  $f(x, y)$  funksiyasının ikitərtibli qarışıq xüsusi törəmələri  $\sigma$  oblastında kəsilməyəndirsə onda həmin oblastda

$$f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$$

(7)

olar, yəni müxtəlif arqumentlərə nəzərən ardıcıl diferensiallanmanın nəticəsi diferensiallanmanın növbəsindən asılı deyildir.

**Nəticə 2.**  $f(x, y)$  funksiyasının  $\sigma$  oblastında  $n$  tərtibə qədər bütün xüsusi törəmələri varsa və həmin oblastda kəsilməyəndirsə onda onun  $m$  tərtibli ( $m \leq n$ ) qarışıq xüsusi törəmələrinin qiyməti müxtəlif arqumentlərə nəzərən ardıcıl diferensiallamanın növbəsindən asılı deyildir.

$$\frac{\partial^m f(x, y)}{\partial x^k \partial y^{m-k}} = \frac{\partial^m f(x, y)}{\partial y^{m-k} \partial x^k}$$

Belə təkliflər istənilən sayda dəyişənin funksiyası üçün də doğrudur.



# XIX FƏSİL. ÇOXDƏYİŞƏNLİ FUNKSIYANIN LOKAL EKSTREMUMU. İKİDƏYİŞƏNLİ FUNKSIYANIN LOKAL EKSTREMUMUNUN TAPILMASI

## 19.1.Çoxdəyişənli funksiyanın lokal ekstremum nöqtələri


Fərz edək ki,  $f(x, y)$  ikidəyişənli funksiyaadır.

$M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsi isə funksiyanın təyin oblastında qeyd olunmuş nöqtədir.

**Tərif 1.** Əgər  $M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsinin hər hansı ətrafında

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad (1)$$

şərti ödənilərsə, onda  $M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsinə  $Z = f(x, y)$  funksiyanın maksimum nöqtəsi, bu funksiyanın həmin nöqtədə aldığı  $f(x_0, y_0)$  qiymətinə isə onun maksimum qiyməti deyilir və  $Maxf(x, y)$  kimi yazılır.



Şəkil 1.

**Tərif 2.** Əgər  $M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsinin hər hansı ətrafında

$$f(x, y) \geq f(x_0, y_0) \quad (2)$$

şərti ödənilirsə, onda  $M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsinə  $Z = f(x, y)$  funksiyasının minimum nöqtəsi, bu funksiyanın həmin nöqtədə aldığı  $f(x_0, y_0)$  qiymətinə isə onun minimum qiyməti deyilir və  $M_{\inf}(x, y)$  kimi yazılır. (Şəkil 1)

Funksiyanın maksimum və minimum qiymətləri birlikdə, onun ekstremum qiymətləri adlanır.

## 19.2. Lokal ekstremumun varlığı üçün zəruri və kafi şərt

**Teorem 1.** (Lokal ekstremumun varlığı üçün zəruri şərt). Əgər  $Z = f(x, y)$  funksiyasının  $M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsində ekstremumu varsa, onda həmin nöqtədə funksiyanın ya birtərtibli xüsusi törəmələrinin hər ikisi sıfıra bərabərdir, yəni

$$f'_x(x_0, y_0) = 0, \quad f'_y(x_0, y_0) = 0 \quad (3)$$

yaxud da bu xüsusi törəmələrdən heç olmazsa biri (hər ikisi də ola bilər) yoxdur.

(3) münasibətini ödəyən nöqtələrə,  $Z = f(x, y)$  funksiyasının stasionar nöqtələri deyilir. Funksiyanın stasionar və xüsusi törəmələrinin olmadığı (və ya sonsuzluğa bərabər olduğu) nöqtələrə birlikdə bu funksiyanın böhran və ya kritik nöqtələri deyilir.

**Teorem 2.** (Lokal ekstremum varlığı üçün kafi şərt). Tutaq ki,  $M_0(x_0, y_0)$  kritik nöqtəsi ətrafında  $Z = f(x, y)$

**funksiyasının ikitərtibli (ikinci tərtib daxil olmaq şərti ilə) kəsilməz xüsusi törəmələri vardır.**

Aşağıdakı ifadəyə baxaq:

$$D(x, y) = f''_{xx}(x, y) \cdot f''_{yy}(x, y) - [f''_{xy}(x, y)]^2 \quad (4)$$

**Bu halda :**

**1)**  $D(x_0, y_0) > 0$  olduqda  $Z = f(x, y)$  funksiyanın  $M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsində ekstremumu vardır, həm də  $f''_{xx}(x_0, y_0) < 0$  olduqda həmin nöqtədə maksimum,  $f''_{yy}(x_0, y_0) > 0$  olduqda isə minimum vardır;

**2)**  $D(x_0, y_0) < 0$  olduqda  $M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsində  $Z=f(x, y)$  funksiyanın ekstremumu yoxdur;

**3)**  $D(x_0, y_0) = 0$  olduqda isə  $Z=f(x, y)$  funksiyanın ekstremumunun olma məsələsi açıq qalır (yəni ekstremum ola da bilər, olmaya da bilər).

Oxşar qayda ilə (3) və (4) şərtini iki və daha çox dəyişənli funksiyalar üçün də söyləmək olar. Məsələn, bunu üçdəyişənli  $U = u(x, y, z)$  funksiyası üçün göstərək.

Bu məqsədlə aşağıdakı kimi işarələmələr qəbul edək:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Big|_{m_0} &= a_{11}, & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \Big|_{m_0} &= a_{22}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \Big|_{m_0} &= a_{33}, & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{m_0} &= a_{12} = a_{21}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z} \Big|_{m_0} &= a_{13} = a_{31}, & \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \Big|_{m_0} &= a_{23} = a_{32}, \end{aligned}$$

$$\delta = \begin{vmatrix} a_{11}a_{12} \\ a_{21}a_{22} \end{vmatrix}, \quad \Delta = \begin{vmatrix} a_{11}a_{12}a_{13} \\ a_{21}a_{22}a_{23} \\ a_{31}a_{32}a_{33} \end{vmatrix}$$

1)  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  - böhrannöqtəsində  
 $a_{11} > 0, \delta > 0, \Delta > 0$  (5)

olduqda bu nöqtədə funksiyanın minimumu,

2)  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  - böhran nöqtəsində  
 $a_{11} < 0, \delta > 0, \Delta < 0$

olduqda isə bu nöqtədə funksiyanın maksimumu vardır.

Asanlıqla göstərmək olar ki, əgər  $Z = f(x, y)$  qapalı  $G$  oblastında təyin olunmuş və kəsilməyən funksiyadirsə, onda bu funksiya həmin oblastda özünün ən kiçik və ən böyük qiymətini alır. Bundan əlavə həmin şərtlər daxilində funksiya özünün ən böyük (ən kiçik) qiymətini ya stasionar nöqtələrdə, yaxud da oblastın sərhəd nöqtələrində alır.

Beləliklə,  $Z = f(x, y)$  funksiyanın  $G$  oblastında ən böyük və ən kiçik qiymətini tapmaq üçün:

**a) böhran nöqtələrini (oblasta daxil olan) tapıb, həmin nöqtələrdə funksiyanın qiymətini tapmaq;**

**b) bundan sonra funksiyanın sərhəd nöqtələrindəki ən böyük və ən kiçik qiymətini tapmaq (bu birdəyişənli funksiya olduğu kimi tapılır).**

**c) tapılmış bütün qiymətlərdən ən böyüyü və ən kiçiyini seçmək lazımdır.**

## XX FƏSİL. ÇOXDƏYİŞƏNLİ FUNKSIYANIN QLOBAL EKSTREMUMU. ŞƏRTİ EKSTREMUM

### 20.1. Çoxdəyişənli funksiyanın qlobal ekstremumu

Fərz edək ki,  $z = f(x, y)$  funksiyası qapalı məhdud  $\sigma$  oblastında təyin olunmuş kəsilməyən funksiyadır. Onda kəsilməyən funksiyasının xassəsinə görə onun həmin oblastda sonlu dəqiq aşağı sərhədi və sonlu dəqiq yuxarı sərhədi var və bu sərhədlərin hər birini həmin qapalı oblastın heç olmasa bir nöqtəsində alır.

Bu halda  $f$  funksiyasının dəqiq aşağı sərhədi onun  $\sigma$  oblastında ən kiçik qiyməti, dəqiq yuxarı sərhədi isə  $\sigma$  oblastında onun ən böyük qiyməti olar.  $f$  funksiyasının  $\sigma$  oblastında ən böyük qiyməti onun həmin oblastda maksimumu (və ya maksimal qiyməti), ən kiçik qiyməti isə həmin oblastda **minimumu** (və ya **minimal qiyməti**) adlanır.

**Funksiyanın qapalı  $\sigma$  oblastında maksimumuna və minimumuna birlikdə onun qlobal ekstremumu deyilir.** Funksiyanın lokal ekstremumu nöqtələrin yaxın ətrafına aid olduğu halda, onun qlobal ekstremumu bütün oblata aiddir, yəni qlobal ekstremum bütün oblata nəzərən götürülür.

Funksiya  $\sigma$  oblastındakı maksimal qiymətini ya oblastın daxili nöqtəsində, ya da oblastın sərhəd nöqtəsində (oblastın konturu üzərində) alır. Əgər funksiya  $\sigma$  oblastındakı maksimal qiymətini oblastın bir daxili nöqtəsində alırsa, onda həmin nöqtə onun **lokal maksimum** nöqtəsi olar.

Funksiya  $\sigma$  oblastundakı minimal qiymətini də ya oblastın sərhəd nöqtəsində, ya da lokal minimum nöqtəsi olan daxili nöqtədə alır.

Beləliklə, funksiyanın qapalı məhdud  $\sigma$  oblastında qlobal ekstremumunu tapmaq üçün aşağıdakı qayda alınır: funksiyanın  $\sigma$  oblastundakı bütün böhran nöqtələri tapılır, funksiyanın bu nöqtələrdəki qiymətləri və oblastın sərhədi üzərindəki ən böyük və ən kiçik qiyməti hesablanır. Bu qiymətlərin ən kiçiyi funksiyanın  $\sigma$  oblastında minimumu, ən böyüyü isə funksiyanın  $\sigma$  oblastında maksimumudur.

**Misal .**


$$z = x^2 + y^2 \text{ funksiyanın } \sigma = \left( \begin{array}{l} -1 \leq x \leq 1 \\ -2 \leq y \leq 2 \end{array} \right)$$

düzbucaqlısında qlobal ekstremumunu tapmalı.

Funksiyanın  $\sigma$  oblastının daxilində yerləşən yeganə böhran nöqtəsi vardır:  $0(0,0)$ . Bu nöqtədə funksiya lokal minimum qiymət alır:

$$z_{\min} = 0.$$

Funksiyanın AB, BC, CD və DA parçaları üzərində (şəkil 1) ən kiçik qiyməti uyğun olaraq 1, 16, 1 və 16-dır.



**Şəkil 1.**

Funksiyanın AB, BC, CD və DA parçaları üzərində ən böyük qiyməti isə 17-dir.

Deməli,  $\sigma$  oblastının ABCD konturu üzərində funksiyanın ən kiçik qiyməti 1 və ən böyük qiyməti isə 17-dir. Buradan aydındır ki, verilmiş funksiyanın AB, BC, CD və DA parçaları üzərində ən kiçik  $\sigma$  düzbucaqlısında minimumu 0, maksimumu isə 17 ədədinə bərabərdir:

$$z_{\min} = 0, \quad z_{\max} = 17.$$

## 20.2.Şərti ekstremum. Laqranjin qeyri-müəyyən vuruqlar üsulu

### Şərti ekstremum.

Çoxdəyişənli funksiyaların ekstremumunu taparkən, sərbəst dəyişənlərin (argumentlərin) üzərinə heç bir şərt qoyulmursa, funksiyanın belə ekstremumu onun şərtsiz ekstremumu adlanır. Lakin praktikada tez-tez elə məsələlərlə rastlaşırıq ki, funksiyanın ekstremumlarını araşdırarkən həmin sərbəst dəyişənlərin üzərinə müəyyən şərtlər qoymaq lazım gəlir.

Tutaq ki, hər hansı oblastda  $n$  - dəyişənli  $W = f(x, y, z, \dots, u, v)$  funksiyası və bu dəyişənlərlə əlaqəli  $m$  dənə ( $m < n$ )

$$F_1(x, y, z, \dots, u, v) = 0, F_2(x, y, z, \dots, u, v) = 0, \\ \dots, F_m(x, y, z, \dots, u, v) = 0$$

tənlik verilmişdir. Bu tənliklər əlaqə tənlikləri adlanır.

**Tərif1.** Tutaq ki,  $M_0(x_0, y_0, z_0, \dots, u_0, v_0)$  və onun hər hansı ətrafı olan  $M(x, y, z, \dots, u, v)$  nöqtəsinin koordinatları

**əlaqə tənliklərini ödəyir.** Əgər bütün  $M(x, y, z, \dots, u, v)$  nöqtələri üçün

$$f(x, y, z, \dots, u, v) \leq f(x_0, y_0, z_0, \dots, u_0, v_0)$$

vəya

$$f(x, y, z, \dots, u, v) \geq f(x_0, y_0, z_0, \dots, u_0, v_0)$$

Bərabərsizliyi ödənilirsə, onda  $W = f(x, y, z, \dots, u, v)$  funksiyasının  $M_0(x_0, y_0, z_0, \dots, u_0, v_0)$  nöqtəsində şərti maksimumu (şərti minimumu) vardırdeyilir.

Şərti ekstremumun tapılması adi Laqranj funksiyasının ekstremumunun tapılmasına gətirilir. Bunun üçün aşağıdakı kimi Loqranj funksiyası tərtib edilir.

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{k=1}^m \lambda_k \varphi_k(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

burada  $\lambda_k \left( k = \overline{1, m} \right)$  Laqranj vuruğu adlanır.

Şərti ekstremum üçün zəruri şərt  $m + n$  sayda

$$\frac{\partial L(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} = 0 \quad \left( i = \overline{1, n} \right)$$

$$\varphi_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \quad \left( k = \overline{1, m} \right) \quad (1)$$

tənliklər ilə ifadə olunur ki, buradan da

$$x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$$

dəyişənləri tapıla bilər.

Burada  $x_1, x_2, \dots, x_n$  şərti ekstremum ola biləcək nöqtənin koordinatlarıdır.

Şərti ekstremum üçün kafi şərt Laqranj funksiyasının ikitərtibli

$$d^2 L(x_1^\circ, x_2^\circ, \dots, x_n^\circ, \lambda_1^\circ, \lambda_2^\circ, \dots, \lambda_m^\circ, dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$$



diferensialının işarəsinin öyrənilməsi ilə bağlıdır. Alınan hər bir  $(x_1^\circ, x_2^\circ, \dots, x_n^\circ, \lambda_1^\circ, \lambda_2^\circ, \dots, \lambda_m^\circ)$  qiymətlər sistemi

$$\begin{aligned} dx_1^2 + dx_2^2 + \dots + dx_n^2 &\neq 0 \text{ olmaqla} \\ \sum_{j=1}^n \frac{\partial \varphi_k(x_1^\circ, x_2^\circ, \dots, x_n^\circ)}{\partial x_j} dx_j &= 0 \quad (k = 1, m) \end{aligned} \quad (2)$$

tənliyini ödəyir. Əgər  $dx_1, dx_2, \dots, dx_n$  - in bütün mümkün qiymətinin hamısı eyni zamanda sıfır deyilsə, onda

$$d^2L(x_1^\circ, x_2^\circ, \dots, x_n^\circ, \lambda_1^\circ, \lambda_2^\circ, \dots, \lambda_m^\circ, dx_1, dx_2, \dots, dx_n) < 0$$

bərabərsizliyi ödənildikdə həmin nöqtədə funksiyanın minimumu vardır.

Xüsusi halda  $n = 2$  olarsa,  $Z = f(x, y)$  funksiyanın əlaqə tənliyi  $\varphi(x, y) = 0$ , Lagranj funksiyası

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot \varphi(x, y)$$

şəklində olar.

Bu hal üçün (1) sistemi üç tənlikdən ibarət olur:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial y} = 0, \quad \varphi(x, y) = 0 \quad (3)$$

Tutaq ki,  $M_0(x_0, y_0), \lambda_0$  - bu sistemin istənilən həlli və aşağıdakı üç tərtibli determinant üçün

$$\Delta = - \begin{vmatrix} 0 & \varphi'_x(x_0, y_0) & \varphi'_y(x_0, y_0) \\ \varphi'_x(x_0, y_0) & L''_{xx}(x_0, y_0, \lambda_0) & L''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0) \\ \varphi'_y(x_0, y_0) & L''_{xy}(x_0, y_0, \lambda_0) & L''_{yy}(x_0, y_0, \lambda_0) \end{vmatrix}$$

1)  $\Delta < 0$  şərti ödənərsə,  $Z = f(x, y)$  funksiyanın  $M_0(x_0, y_0)$  nöqtəsində şərti maksimumu;

2)  $\Delta > 0$  şərti ödənildikdə isə, onun həmin nöqtədə şərti minimumu vardır.

### Xüsusi törəmələrin həndəsi tətbiqləri.

1. Tənliyi  $x = \varphi_1(t)$ ,  $y = \varphi_2(t)$ ,  $z = \varphi_3(t)$  kimi verilmiş xəttə,  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nöqtəsində ( $x_0 = \varphi_1(t_0)$ ,  $y_0 = \varphi_2(t_0)$ ,  $z_0 = \varphi_3(t_0)$ ) çəkilmiş toxunanın tənliyi

$$\frac{x - x_0}{\varphi_1'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\varphi_2'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\varphi_3'(t_0)} \quad (1)$$

şəklindədir. Burada  $\sum_{i=1}^3 \varphi_i'^2 \neq 0$  olmalıdır.

2. Tənliyi  $x = \varphi_1(t)$ ,  $y = \varphi_2(t)$ ,  $z = \varphi_3(t)$  olan xəttə  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nöqtəsində çəkilən normal müstəvinin tənliyi

$$\varphi_1'(t_0)(x - x_0) + \varphi_2'(t_0)(y - y_0) + \varphi_3'(t_0)(z - z_0) = 0 \quad (2)$$

kimidir.

3) Toxunma nöqtəsində toxunan müstəviyə perpendikulyar səthin norması adlanır.

Tutaq ki, səth

$$F(x, y, z) = 0 \quad (3)$$

tənliyi ilə verilmişdir. Bu səth üzərində  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nöqtəsi götürək. Onda  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nöqtəsində toxunan müstəvinin tənliyi aşağıdakı kimi

$$\begin{aligned} F'_x(x_0, y_0, z_0)(x - x_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)(y - y_0) + \\ + F'_z(x_0, y_0, z_0)(z - z_0) = 0 \end{aligned} \quad (4)$$

olar.

Həmin nöqtədə səthin normalın tənliyi isə

$$\frac{x - x_0}{F'_x(x_0, y_0, z_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(x_0, y_0, z_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(x_0, y_0, z_0)} \quad (5)$$

şəklində olur.

4)  $M_0$  nöqtəsində səthə toxunan müstəvinin və normalın tənliyi.

Səth özünün  $Z = f(x, y)$  aşkar tənliyi ilə verilmişdirsə, onda  $M_0(x_0, y_0, z_0)$  nöqtəsində toxunan müstəvinin tənliyi

$$z - z_0 = f'_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f'_y(x_0, y_0)(y - y_0) \quad (6)$$

şəklində, normalın tənliyi isə

$$\frac{x - x_0}{f'_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f'_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1} \quad (7)$$

şəklində olur.

5) Səviyyə xətti .

$Z = f(x, y)$  funksiyasının eyni bir  $C$  ( $C = const$ ) qiymət aldığı müstəvi nöqtələrinin həndəsi yerinə səviyyə xətti deyilir, yəni

$$f(x, y) = C, \quad C = const \quad (8)$$

### 20.3. Ən kiçik kvadratlar üsulu

Təbiətşünaslıqda, xüsusən də kimyada, fizikada və s. elmlərdə aparılan təcrübə və müşahidələrin nəticələri empirik düsturların (təcrübədən alınan) köməyi ilə öyrənilir. Bu tip düsturların alınması üçün tətbiq edilən “ən kiçik kvadratlar” üsulu ən yaxşı üsullardan biridir.

Bu üsulun mahiyyəti aşağıdakı kimidir. Ən kiçik kvadratlar üsulu alınan belə düsturların ən yaxşı üsullarından biridir.

Fərz edək ki, iki  $x$  və  $y$  kəmiyyətləri arasında asılılıq yaratmaq tələb olunur. Tutaq ki,  $n$  sayda təcrübə aparılmış,  $x$  və  $y$ -in aldığı qiymətlər arasındakı asılılıq cədvəl şəklində alınmışdır.


$x$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	...	$x_n$
$y$	$y_1$	$y_2$	$y_3$	...	$y_n$

$x_i$  və  $y_i$  -  $y_0$  ( $i = \overline{1, n}$ ) müstəvi üzərində düzbucaqlı dekart koordinat sistemində götürülmüş

$$M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2), \dots, M_n(x_n, y_n)$$

nöqtələrin koordinatları kimi baxacağıq.

Fərz edək ki, bu nöqtələr hər hansı düz xətt üzərində və ya ona çox yaxın yerləşmişdir (şəkil 1).



**Şəkil 1.**

Odur ki, təbii olaraq  $y$  və  $x$  arasındakı asılılığa xətti asılılıq kimi baxmaq olar, yəni  $y$ -ə  $x$ -in

$$y = ax + b \quad (1)$$

şəklində xətti funksiyası kimi baxmaq olar. Burada  $a$  və  $b$  tapılması lazım olan hər hansı sabitlərdir (parametrlərdir). Aydınır ki, (1) ifadəsini

$$ax + b - y = 0 \quad (2)$$

kimi yazmaq olar. Beləliklə, (2) bərabərliyində  $x_i$  və  $y_i$ -nin ( $i = \overline{1, n}$ ) cədvəl qiymətlərini nəzərə alsaq, aşağıdakı bərabərlikləri alarıq:

$$\left. \begin{array}{l} ax_1 + b - y_1 = \varepsilon_1 \\ ax_2 + b - y_2 = \varepsilon_2 \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ ax_n + b - y_n = \varepsilon_n \end{array} \right\} \quad (3)$$

Aydınır ki, təcrübə nəticəsində alınan  $y_i$  ( $i = \overline{1, n}$ ) qiymətləri ilə axtarılan (1) funksiyasının  $x_i$  ( $i = \overline{1, n}$ ) nöqtələrindəki aldığı qiymətlər üst-üstə düşür. Odur ki, həmin qiymətlərin meyli (kiçik xəta)  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  ilə işarə edilmişdir. **Belə tələb qoyulur:**  $a$  və  $b$  əmsallarını elə seçmək lazımdır ki, bu xətalər (meyllər) imkan daxilində mütləq qiymətcə kiçik olsun. Ən kiçik kvadratlar üsuluna əsasən  $a$  və  $b$  əmsallarını elə seçək ki, bu xətalərin kvadratları cəmi mümkün qədər kiçik olsun, yəni

$$U = \varepsilon_1^2 + \varepsilon_2^2 + \dots + \varepsilon_n^2 \quad (4)$$

ən kiçik olsun. (3) bərabərliklərini (4) bərabərliyində nəzərə alsaq, yazarıq:

$$U = (ax_1 + b - y_1)^2 + (ax_2 + b - y_2)^2 + \dots + (ax_n + b - y_n)^2 \quad (5)$$

Qoyulmuş tələbə görə  $U$  dəyişəni iki  $a$  və  $b$  dəyişənlərinin funksiyası olur.

Deməli, qoyulan məsələnin həlli (5) bərabərliyi ilə təyin olunan  $U(a,b)$  funksiyasının minimum qiymət aldığı nöqtələrin tapılmasına gətirilir. Bunun üçün

$$\frac{\partial u}{\partial a} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial b} = 0 \quad (6)$$

şərtlərinin ödənilməsi zəruridir.  $U(a,b)$  funksiyasının  $a$  və  $b$  -yə nəzərən xüsusi törəmələrini tapıb sifra bərabər etsək

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i + b \cdot n = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases} \quad (7)$$

alırıq. Bu sistem üçün  $\Delta = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{vmatrix} \neq 0$

olması aydındır. Deməli, sistemin yeganə həlli var və sistemin həlli

$$a = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad b = \frac{\Delta_2}{\Delta} \quad (8)$$

kimi tapılır. Burada  $\Delta_1$  və  $\Delta_2$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i y_i & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & n \end{vmatrix}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n y_i \end{vmatrix}$$

şəklindədir.

Qeyd etmək lazımdır ki, naməlum funksiya təkcə  $y = ax + b$  xətti funksiya şəklində deyil,

$y = ax^2 + bx + c$ ,  $y = \alpha x^\beta$ ,  $y = a_1 + a_2 \sin x + a_3 \cos x, \dots$   
və s. şəklində də ola bilər. Məsələn, naməlum funksiya kvadratin funksiya olduqda empirik düsturdan parametrlərin ən kiçik kvadratlar üsulu ilə təyin olunmasına baxaq.


Tutaq ki,  $x$  və  $y$  arasında təcrübə nəticəsində alınan asılılıq aşağıdakı cədvəl şəklində verilmişdir:

$x$	$x_1$	$x_2$	$x_3$	...	$x_n$
$y$	$y_1$	$y_2$	$y_3$	...	$y_n$

Fərz edək ki,  $(x_i, y_i) (i = \overline{1, n})$  cütlərinə müstəvi üzərində (Dekart koordinatlarda)  $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2), \dots, M_n(x_n, y_n)$  nöqtələri uyğundur. Bundan əlavə fərz edək ki, bu nöqtələr

$$y = ax^2 + bx + c$$

parabolası üzərində və ya onun yaxın ətrafında yerləşmişlər (şəkil 2). Burada  $a, b, c$  əmsalları tapılması lazım gələn parametrlərdir



**Şəkil 2.**

Yuxarıda olduğu kimi  $x$  və  $y$  dəyişənlərinin cədvəldəki qiymətlərini yazıb,  $a, b, c$  parametrlərini tapmaq üçün aşağıdakı tənliklər sistemini alarıq:

$$\left. \begin{aligned} a \sum_{i=1}^n x_i^4 + b \sum_{i=1}^n x_i^3 + c \sum_{i=1}^n x_i^2 &= \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 \\ a \sum_{i=1}^n x_i^3 + b \sum_{i=1}^n x_i^2 + c \sum_{i=1}^n x_i &= \sum_{i=1}^n y_i x_i \\ a \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i + c \cdot n &= \sum_{i=1}^n y_i \end{aligned} \right\} \quad (9)$$

Asanlıqla göstərmək olar ki, (9) sisteminin yeganə həlli vardır. Bu sistemdən  $a, b, c$  - ni tapıb, (8) bərabərliyində yerinə yazaraq, təcrübənin empirik düsturunu tapırıq.

### Nümunəvi misallar həlli

1. Aşağıdakı funksiyanın təyin oblastını tapın.

$$Z = \arcsin \frac{y-1}{x}$$

**Həlli:** Funksiyanın mənası olması üçün

$$-1 \leq \frac{y-1}{x} \leq 1$$

olmalıdır. Buradan da yazmaq olar:

- 1)  $1-x \leq y \leq 1+x$  olur,  $x > 0$  olduqda;
- 2)  $1+x \leq y \leq 1-x$  olur,  $x < 0$  olduqda (şəkil 1)

2. Funksiyanın təyin oblastını tapın:

$$Z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

**Həlli:**


Kvadrat kökün mənası olması üçün

$$9 - x^2 - y^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 \leq 9$$


olmalıdır. Bu mərkəzi koordinat başlanğıcında və



radiusu  $R = 3$  olan çevrə və onun dairə hissəsindən ibarətdir (şəkil 2).



**Şəkil 1.**



**Şəkil 2.**

3. Aşağıda funksiya üçün  $f(0,0)$ ,  $f(1,1)$ ,  $f(2,1)$ ,  $f(1,2)$  hesablayın.

$$f(x, y) = \frac{x + y - 2}{x^2 + 2y^2 + 5}$$

**Həlli:** Verilən funksiyanın xüsusi qiymətlərini tapıq:

$$f(0,0) = \frac{0 + 0 - 2}{0^2 + 2 \cdot 0^2 + 5} = -\frac{2}{5};$$

$$f(1,1) = \frac{1 + 1 - 2}{1^2 + 2 \cdot 1^2 + 5} = \frac{0}{8} = 0;$$

$$f(2,1) = \frac{2 + 1 - 2}{2^2 + 2 \cdot 1^2 + 5} = \frac{1}{11};$$

$$f(1,2) = \frac{1 + 2 - 2}{1^2 + 2 \cdot 2^2 + 5} = \frac{1}{14}.$$

4. Verilmiş  $f(x, y) = \frac{x^4 - y^4}{x^4 + y^4}$  -funksiyanın  $x \rightarrow 0$ ,  $y \rightarrow 0$  şərtində limiti varmı?

**Həlli:** Tutaq ki,  $M(x, y)$  nöqtəsi  $M_0(0,0)$  nöqtəsinə yaxınlaşır.  $x$  və  $y$ -in dəyişməsinə  $y = kx$  düz xətti boyunca götürək:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^4 - y^4}{x^4 + y^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - k^4 x^4}{x^4 + k^4 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - k^4}{1 + k^4} = \frac{1 - k^4}{1 + k^4}$$

Göründüyü kimi  $k$ -nın seçilməsindən asılı olaraq limitin nəticəsi müxtəlif ədədlər olacaqdır. Odur ki, verilmiş funksiyanın  $x \rightarrow 0$ ,  $y \rightarrow 0$  şərtində limiti yoxdur.

**5. Limiti hesablayın.**

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x - y}{x + y}$$

**Həlli:** Əvvəlcə aşağıdakı limitlərə baxaq:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x - y}{x + y} \right) = 1;$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - y}{x + y} \right) = -1.$$

Aydındır ki,  $n \rightarrow \infty$  şərtində

$$\{x_n, y_n\} = \left\{ \frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right\}, \quad \{x'_n, y'_n\} = \left\{ \frac{2}{n}, \frac{1}{n} \right\}$$

ardıcılıqları  $M_0(0,0)$  nöqtəsinə yığılır. Lakin funksiyanın uyğun qiymətlər ardıcılığı müxtəlif limitlərə yığılır:

$$\{f(x_n, y_n)\} = \{0\} \rightarrow 0, \quad \left\{f(x'_n, y'_n)\right\} = \left\{\frac{1}{\frac{n}{3}}\right\} \rightarrow \frac{1}{3}$$

Bu o deməkdir ki,  $n \rightarrow \infty$  şərtində  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$  limiti yoxdur.

**6. Limiti hesablayın.**

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sin xy}{x}$$

**Həlli:** Aydındır ki,  $f(x, y) = \frac{\sin xy}{x}$  funksiyası  $M_0(0,2)$  nöqtəsində təyin olunmamışdır.  $y \neq 0$  olmaqla bu funksiyanı  $y$ -ə vuraq və həm də bölək:

$$\frac{\sin xy}{x} = \frac{y \sin xy}{xy} = y \cdot \frac{\sin xy}{xy}$$

İndi limitə keçək:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} \frac{\sin xy}{x} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} y \cdot \frac{\sin xy}{xy} = 2 \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin xy}{xy} = 1 \right).$$

**7. Verilmiş**

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2}$$

funksiyası üçün  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$  limiti varmı?

**Həlli :** Əvvəlcə təkrar limitləri hesablayaq:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} \right) = 0,$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 y^2 + (x - y)^2} \right) = 0.$$

Deməli,  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left( \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right) = 0$  olur.

İndi ikiqat limitin olub olmadığını aydınlaşdıraraq. Bu məqsədlə  $\{x_n, y_n\} = \left\{ \frac{1}{n}, \frac{1}{n} \right\}$ ,  $\{x'_n, y'_n\} = \left\{ \frac{1}{n}, -\frac{1}{n} \right\}$  - ardıcılıqlarına baxaq. Bu ardıcılıqlar  $n \rightarrow \infty$  - şərtində  $M_0(0,0)$  nöqtəsinə yığıldığı halda, funksiyanın uyğun qiymətlər ardıcılığı müxtəlif limit qiymətləri alır:

$$f(x_n, y_n) = \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^4}} \rightarrow 1, \quad f \left( x'_n, y'_n = \frac{\frac{1}{n^4}}{\frac{1}{n^4} + \frac{1}{n^2}} \rightarrow 0 \right) \quad (n \rightarrow \infty)$$

Deməli,  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$  limiti yoxdur.

**8. Verilmiş funksiyalar üçün**

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \lim_{y \rightarrow \infty} f(x, y) \right)$  və  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \lim_{y \rightarrow \infty} f(x, y) \right)$  limitlərini hesablayın.

a)  $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4}$ ; b)  $f(x, y) = \sin \frac{\pi x}{3x + y}$

**Həlli :**

a)  $x \neq 0, y \neq 0$  olduqda yazarıq:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left( \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\frac{x^2}{y^2} + 1}{\frac{x^2}{y^2} + y^2} \right) = 0;$$

$$\lim_{y \rightarrow \infty} \left( \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4} \right) = \lim_{y \rightarrow \infty} \left( \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{y^2}{x^2}}{1 + \frac{y^4}{x^2}} \right) = 1;$$

b) Verilmiş funksiya hər bir qeyd olunmuş  $x$ -ə nəzərən  $y$ -in və hər bir qeyd olunmuş  $y$ -ə nəzərən isə  $x$ -in kəsilməz funksiyasıdır.

9. İkiqat limitin hesablayın:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2}$$

**Həlli:** Aydındır ki,

$$(x - y)^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 - xy + y^2 \geq xy$$

Odur ki,  $x \neq 0, y \neq 0$  olmaqla yazarıq:

$$0 \leq \left| \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2} \right| \leq \left| \frac{x + y}{xy} \right| \leq \frac{1}{|y|} + \frac{1}{|x|}$$

Buradan da çıxır ki,

$$0 \leq \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left| \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2} \right| \leq \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left( \frac{1}{|x|} + \frac{1}{|y|} \right) = 0$$

Beləliklə,  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x + y}{x^2 - xy + y^2} = 0$  olur.

## XXI FƏSİL. DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR . TƏRİF VƏ ANLAYIŞLAR. KOŞI MƏSƏLƏSİ

### 21.1.1.Tərif və ümumi anlayışlar

Naməlum funksiyanın törəməsi verildikdə onu inteqrallama vasitəsilə tapmaq olar. Bir çox hallarda isə funksiyanın törəməsi deyil, axtarılan  $y$  funksiyası,  $x$  arqumenti və  $y$  funksiyasının  $x$ -ə nəzərən  $y', y'', \dots \dots y^{(n)}$  törəmələri arasında müəyyən asılılıq verilir. Bu asılılıqdan həmin naməlum funksiyanı tapmaq tələb olunur. Belə məsələlərlə diferensial tənliklər nəzəriyyəsində məşğul olurlar.

**Tərif. İxtiyari  $x$  dəyişəni, onun  $y=y(x)$  funksiyası və bu funksiyanın həmin  $x$  dəyişəninə nəzərən  $y', y'', \dots \dots y^{(n)}$  törəmələri daxil olan tənliyə adi diferensial tənlik deyilir.**

İki və ya çox sayda dəyişəndən asılı olan funksiya və bu funksiyanın həmin dəyişənlərə nəzərən xüsusi törəmələri daxil olan tənliyə isə **xüsusi törəməli diferensial tənlik** deyilir.

Diferensial tənliyə daxil olan ən yüksəktərtibli törəmənin tərtibinə həmin diferensial tənliyin tərtibi deyilir.  $n$  tərtibli adi diferensial tənlik ümumi şəkildə

$$F(x, y, y', y'', \dots \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (1)$$

kimi yazılır. Məsələn,

$$y' + 4xy + 3 = 0$$

və

$$3y'' + 2y' + xy + 5 = 0$$

tənlikləri uyğun olaraq birtərtibli və ikitərtibli adi diferensial tənliklərdir.

(1) diferensial tənliyinin E çoxluğundakı bütün qiymətlərində ödəyən hər bir  $y = \varphi(x)$  funksiyasına həmin tənliyin E çoxluğunda həlli deyilir. Bu, o deməkdir ki,  $y = \varphi(x)$  funksiyasını və onun  $\varphi'(x)$ ,  $\varphi''(x)$ , ...  $\varphi^{(n)}(x)$  törəmələrini (1) tənliyində yerinə yazdıqda həmin tənlik E çoxluğunda  $x$ -ə nəzərən eyniliyə çevrilir:

$$F[x, \varphi(x), \varphi'(x), \varphi''(x), \dots, \varphi^{(n)}(x)] \equiv 0.$$

Verilmiş diferensial tənliyi ödəyən funksiya qeyri-aşkar və parametrik şəkildə də verilə bilər. Bu halda həmin funksiya bəzən **diferensial tənliyin inteqralı** deyilir.

Biz gələcəkdə diferensial tənliyin həlli və inteqralı istilahlarnın ikisini də (heç bir fərq qoymadan) işlədəcəyik.

**Məsələn**,  $y = e^x$  və  $y = e^{-x}$  funksiyalarının hər biri bütün ədəd oxunda

$$y^n - y = 0 \quad (2)$$

Diferensial tənliyinin həllidir:

$$(e^x)'' - e^x \equiv 0, \quad (e^{-x})'' - e^{-x} \equiv 0.$$

Ümumiyyətlə,  $C_1$  və  $C_2$  sabitlərinin istənilən qiymətlərində

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$$

funksiyası bütün ədəd oxunda (2) tənliyinin həllidir:

$$(C_1 e^x + C_2 e^{-x})'' - (C_1 e^x + C_2 e^{-x}) \equiv 0.$$

Buradan aydındır ki, verilmiş diferensial tənliyin bir neçə və hətta sonsuz sayda həlli ola bilər.

Verilmiş diferensial tənliyin bütün həllərini tapmaq və onların xassələrini öyrənmək diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin əsas məsələsidir. Diferensial tənliklərin həlli çox zaman funksiyaların inteqrallanması vasitəsilə tapılır. Buna görə də diferensial tənliyin həllərinin tapılması əməlinə çox zaman **diferensial tənliyin inteqrallanması** deyilir.

Diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin böyük elmi və praktik əhəmiyyəti vardır. Fizika, mexanika və s. bu kimi müxtəlif elm sahələrinin və texnikanın bir çox mühüm məsələlərinin həlli diferensial tənliklərə gətirilir.

Bunu iki misal üzərində izah edək.

**Misal 1.** Kütləsi  $m$  olan maddi nöqtə müəyyən yüksəklikdən ağırlıq qüvvəsinin təsiri ilə sərbəst düşür. Havanın müqavimətini nəzərə almadan nöqtənin hərəkət qanununu tapmalı.

**Həlli.** Hərəkət edən nöqtəyə təsir edən  $F$  qüvvəsi onun hərəkətinin  $a$  təcili vasitəsilə

$$F = ma \quad (3)$$

kimi tapılır (Nyutonun ikinci qanunu). Nöqtəyə ancaq ağırlıq qüvvəsi təsir etdiyindən  $F = P = mg$  olar. Hərəkət edən cismin təcili isə gedilən məsafənin zamana görə iki-tərtibli törəməsi

$$a = \frac{d^2S(t)}{dt^2} = S''(t).$$

olduğundan (3) bərabərliyini

$$m \cdot S''(t) = mg$$

və ya

$$S''(t) = g \quad (4)$$

kimi yazmaq olar.

(4) bərabərliyi axtarılan  $S(t)$  funksiyasına nəzərən ikitərtibli diferensial tənlikdir. Yoxlamaq olar ki, bu tənliyin həlli

$$S(t) = \frac{gt^2}{2} + C_1t + C_2 \quad (5)$$

funksiyasıdır. Hərəkət edən nöqtənin başlanğıc sürəti  $S'(0) = V_0$  və başlanğıc məsafəsi  $S(0) = S_0$  məlum ol-



duqda (5) funksiyasına daxil olan ixtiyari  $C_1$  və  $C_2$  sabitlərini tapmaq olar:

$$C_1 = V_0 v \text{ və } C_2 = S_0$$

Bu halda maddi nöqtənin hərəkət qanunu aşağıdakı kimi yazılır:

$$S(t) = \frac{gt^2}{2} + V_0 t + S_0.$$

### 21.1.2. Birtərtibli diferensial tənlikər və onların həndəsi mənası

Birtərtibli diferensial tənlik ümumi şəkildə

$$F(x, y, y') = 0 \quad (1)$$

kimi yazılır. Bu tənliyi axtarılan funksiyanın  $y'$  törəməsinə nəzərən həll etmək mümkün olduqda

$$y' = f(x, y) \quad (2)$$

şəklində **törəməyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli diferensial tənlik** alınır.

Törəməyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli diferensial tənliyi, həmişə

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0 \quad (3)$$

diferensial şəklində yazmaq olar. Doğrudanda, (2) tənliyini

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad f(x, y)dx - dy = 0$$

kimi yazmaq olar. Burada  $M(x, y)=f(x, y)$  və  $N(x, y)=-1$  qəbul etməklə (3) şəklində diferensial tənlik alınır.

Tərsinə, (3) şəklində diferensial tənliyi  $N(x, y) \neq 0$  olduqda

$$y' = -\frac{M(x,y)}{N(x,y)} \quad (4)$$

$M(x, y) \neq 0$  olduqda isə

$$\frac{dx}{dy} = -\frac{N(x, y)}{M(x, y)} \quad (5)$$

şəklində yazmaq olar.

Beləliklə,  $N(x, y) \neq 0$  olduqda (2) və (3) tənlikləri eynigüclü olar. Ümumi halda isə (3) tənliyi iki tənliklə: (4) və (5) tənlikləri ilə eynigüclüdür.

Birtərtibli diferensial tənliyin (3) diferensial şəklinin üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, orada  $x$  və  $y$  dəyişənləri eyni hüququludur, onların hər birini argument və ya funksiya hesab etmək olar.

Məlumdur ki, diferensial tənliyin həlli  $y = \varphi(x)$  aşkar şəkildən başqa qeyri-aşkar və parametrik şəkillərdə də verilə bilər.

Əgər

$$\phi(x, y) = 0 \quad (6)$$

tənliyi vasitəsilə təyin olunan qeyri-aşkar  $y=y(x)$  funksiya-sı (1) tənliyini ödəyirsə, yəni  $x$ -in müəyyən  $E$  çoxluğundakı bütün qiymətlərində  $F[x, y(x), y'(x)] = 0$  eyniliyi ödənilirsə, onda deyilər ki, (2) tənliyinin həlli (6) tənliyi vasitəsilə qeyri-aşkar şəkildə verilmişdir.

(1) tənliyi həllinin

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t)$$

parametrik şəkildə verilməsi o deməkdir ki,  $t$ -nin müəyyən  $(\alpha, \beta)$  intervalındakı bütün qiymətlərində

$$F \left[ \varphi(t), \psi(t), \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right] = 0$$

eyniliyi ödənilir.

## 21.2. İnteqral əyrisi. İzoklin əyriləri

İndi


$$y' = f(x, y) \quad (1)$$

tənliyinin həndəsi mənasını izah edək. Bu məqsədlə fərz edək ki,  $x$  və  $y$  müstəvi nöqtəsinin koordinatları və  $y = \varphi(x)$  funksiyası (1) tənliyinin həllidir.  $y = \varphi(x)$  funksiyasının qrafiki müstəvi üzərində bir əyri olar. Bu əyriyə (və həm də (1) tənliyinin inteqralının qrafikinə) (1) tənliyinin **inteqral əyrisi** deyilir.


Aydındır ki, inteqral əyrisi kəsilməyəndir və onun hər bir nöqtəsində toxunanı var.

Fərz edək ki, (1) tənliyinin sağ tərəfindəki  $f(x, y)$  funksiyası hər hansı  $\sigma$  oblastında təyin olunmuşdur və onun bütün nöqtələrində sonlu qiymətlər alır. Əgər  $(x, y) \in \sigma$  nöqtəsi (1) tənliyinin inteqral əyrisi üzərində yerləşirsə, onda həmin nöqtədə inteqral əyrisinə çəkilmiş toxunanın bucaq əmsalı  $y'$  və ya (1) bərabərliyinə görə  $f(x, y)$  olar:  $\operatorname{tg} \alpha = f(x, y)$ . Buradan inteqral əyrisinə  $(x, y)$  nöqtəsində çəkilmiş toxunanın absis oxundan meyl bucağı tapılır:  $\alpha = \operatorname{arc} \operatorname{tg} f(x, y)$ .

İndi hər bir  $(x, y) \in \sigma$  nöqtəsindən absis oxu ilə  $\alpha = \operatorname{arc} \operatorname{tg} f(x, y)$  bucağı əmələ gətirən ox işarəsi çəkək. Beləliklə, (1) tənliyinin sağ tərəfi vasitəsilə  $\sigma$  oblastında



**Şəkil 1.**



**Şəkil 2.**


istiqamətlər meydanı təyin olunur (şəkil 1.). (1) tənliyi göstərir ki, inteqral əyrisinin hər bir nöqtəsində toxunanın istiqaməti uyğun nöqtədə meydanın istiqaməti ilə üst-üstə düşür. İnteqral əyriləri bütün başqa əyriyərdən elə bu xassə ilə fərqlənir. Deməli, diferensial tənliyi həll etmək, hündəsi olaraq elə əyri tapmaq deməkdir ki, bu əyrinin istənilən nöqtəsində toxunanının istiqaməti uyğun nöqtədə meydanın istiqaməti ilə üst-üstə düşsün (şəkil 2.). Belə əyrilər çox olur. Onlar müəyyən əyrilər ailəsini (inteqral əyriləri ailəsini) təşkil edir. Bu ailədən müəyyən əyri ayırmaq

üçün həmin əyrinin keçdiyi bir  $(x_0, y_0)$  nöqtəsi verilməlidir.

**Misal 1.**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} (x \neq 0). \quad (2)$$

Bu tənlik vasitəsilə təyin olunan istiqamətlər meydanını 3-cü şəkildə göstərilir.



**Şəkil 3.**

Aydındır ki, koordinat başlanğıcından çıxan vektorların  $(x, y)$  nöqtəsindən keçən hər bir düz xəttin istiqaməti həmin nöqtədə meydanın istiqaməti ilə üst-üstə düşür. Bu göstərir ki,  $y=Cx$  düz xətləri (2) diferensial tənliyinin inteqral əyriləridir.

Verilmiş diferensial tənliyin inteqral əyrilərinin necə yerləşdiyini təsəvvür etmək və həm də inteqral əyrilərini təqribi qurmaq üçün izoklinlər (bərabər meyilli xətlər) üsulundan istifadə etmək olar.


İnteqral əyrilərinin eyniistiqamətli nöqtələri çoxluğuna **istiqamətlər meydanının izoklini** deyilir. (2) tənliyinin inteqral əyrisinin istiqamətini (yəni, toxunanın bucaq

əmsalını)  $y'=k$  ilə təyin etsək, onda belə istiqaməti olan nöqtələr


$$f(x, y) = k \quad (3)$$

şərtini ödəyən nöqtələr olar. Deməli, (3) tənliyi istiqamətlər meydanının  $y'=k$  istiqamətinə uyğun olan izoklinin tənliyidir. Burada  $k$ -ya müxtəlif qiymətlər verdikdə müxtəlif izoklinlər, yəni (1) tənliyi üçün **izoklinlər ailəsi** alınır.

Tutaq ki,  $k$ -nın bir-birinə çox yaxın  $k_1, k_2, \dots, k_n$  qiymətlərinə uyğun izoklinlər qurulmuşdur (şəkil 4).



Şəkil 4.



Şəkil 5.

$K \equiv k_1$  - ə uyğun olan izoklin üzərində bir neçə nöqtə götürək, bu nöqtələrdən bucaq əmsalları  $k_1$  olan və  $k = k_2$

izoklininə qədər uzadılmış düz xətt parçaları çəkək. Sonra isə bu düz xətt parçalarının  $k = k_2$  izoklinini kəsdiyi nöqtələrdən bucaq əmsalları  $k_2$  olan və  $k = k_3$  izoklinini kəsənə qədər uzadılmış yeni düz xətt parçaları çəkilir.

Beləliklə, bu proses nəticəsində qurulmuş düz xətt parçaları verilmiş diferensial tənliyin inteqral əyrisini təqribi ifadə edən (və ona çox yaxın olan) sınıq xətti təşkil edir. Aydındır ki, ( $k_{i+1} - k_{1_i} = 1, 2, 3, \dots, n - 1$ ) fərqləri çox kiçik olduqda qurulan düz xətt parçaları çox qısa olar və onların əmələ gətirdiyi sınıq xətt tənliyin inteqral əyrisinə daha yaxın olur.

**Misal 2.**

$$y' = 2x \quad (4)$$

Diferensial tənliyin izoklinlər ailəsinin tənliyi

$2x = k$  və ya  $x = \frac{k}{2}$  olar. Burada  $k$ -ya  $k=0, k=1, k=2, \dots$

vəs. kimi qiymətlər verdikdə tənlikləri

$$x = 0, \quad x = \frac{1}{2}, \quad x = -\frac{1}{2}, \quad x = 1, \dots$$

olan izoklinlər alınır. Bu izoklinlər ordinat oxuna paralel olan düz xətdir (şəkil 5.) Oy oxundan ibarət olan  $x=0$  izoklininin bütün nöqtələrində meydanın istiqaməti absis oxuna paraleldir  $y' = 0 = \operatorname{tg}\alpha, \alpha = 0$ ).  $x = \frac{1}{2}$  izoklininin bütün nöqtələrində meydanın istiqaməti absis oxu ilə  $\alpha = 45^\circ$  bucaq əmələ gətirir ( $y' = \operatorname{tg}\alpha = 1, \alpha = 45^\circ$ ).

$x = \frac{1}{2}$  izoklininin bütün nöqtələrində meydanın istiqaməti absis oxu ilə  $\alpha = -45^\circ$  ( $y' = \operatorname{tg}\alpha = -1, \alpha = -45^\circ$ ) bucaq əmələ gətirir və s.

Yuxarıda dediyimiz qayda ilə qurulmuş  $M_1 M_2 M_3 M_4 M_5 \dots$  sınıq xətti (4) tənliyinin inteqral əyrisini təqribi

ifadə edir. Bu sınıq xətt  $y = x^2 + C$  parabolasına çox yaxındır. (4) tənliyinin həlli isə  $y = x^2 + C$  funksiyalarıdır. Burada  $C$  parametrinə müxtəlif qiymətlər verməklə alınan parabolalar (4) tənliyinin inteqral əyriləri olar.

### 21.3.1. Koşi məsələsi və birtərtibli diferensial tənliklərin ümumi həlli

Birtərtibli diferensial tənliklərin həndəsi izahı və indiyə kimi həll olunmuş misallar göstərir ki, diferensial tənliklərin, ümumiyyətlə, çox və hətta sonsuz sayda həlli vardır. Bu həllərin qrafikləri verilmiş diferensial tənliyin inteqral əyriləri ailəsini təşkil edir.

Törəməyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli

$$y' = f(x, y) \quad (1)$$

diferensial tənliyi üçün belə bir məsələ qoyulur: bu tənliyin göstərilən həlləri içərisindən eləsini tapmalı ki, arqumentin  $x = x_0$  qiymətində verilmiş  $y = y_0$  qiymətini alsın. Bunu belə yazırlar:

$$y_{x=x_0} = y_0 \quad (2)$$

Verilmiş  $x_0$  ədədinə arqumentin başlanğıc qiyməti,  $y_0$  ədədinə isə axtarılan funksiyanın başlanğıc qiyməti deyilir. Ümumiyyətlə,  $x_0, y_0$  ədədləri həllin başlanğıc qiymətləri və ya başlanğıc şərtləri adlanır.

Həllin  $x_0, y_0$  başlanğıc qiymətlərinin verilməsi həndəsi olaraq müstəvi üzərində bir  $(x_0, y_0)$  nöqtəsinin və ya  $(x_0, y_0)$  başlanğıc nöqtəsinin verilməsi deməkdir.



(1) tənliyinin  $y = \varphi(x)$  həlli (2) şərtini və ya  $\varphi(x_0) = y_0$  bərabərliyini ödədildə deyirlər ki, həmin həll verilmiş  $x_0, y_0$  başlanğıc şərtlərini (və ya başlanğıc qiymətlərini) ödəyir.

Diferensial tənliklər nəzəriyyəsinin əsas məsələlərindən biri (1) tənliyinin verilmiş  $x_0, y_0$  başlanğıc şərtlərini ödəyən həllinin axtarılmasıdır. Buna (1) tənliyi üçün Koşi məsələsi deyilir.

### 21.3.2. Birtərtibli diferensial tənliyin həllinin varlığı və yeganəliyi haqqında teorem

Fərz edək ki, törəməyə nəzərən həll olunmuş birtərtibli

$$\dot{y} = f(x, y) \quad (1)$$

diferensial tənliyin

$$y_{x=x_0} = y_0 \quad (2)$$

(2) başlanğıc şərtini ödəyən həllini tapmaq tələb olunur. Məsələnin həlli ilə əlaqədar aşağıdakı teorem vardır.

**Koşi teoremi (birtərtibli diferensial tənliyin həllinin varlığı və yeganəliyi):**  $f(x, y)$  funksiyası  $(Oxy)$  müstəvisinin  $\sigma$  oblastında kəsilməyəndirsə və bu oblastda kəsilməyən  $f_y''(x, y)$  xüsusi törəməsi varsa, onda həmin oblastın hər bir  $(x_0, y_0) \in \sigma$  nöqtəsi üçün (1) tənliyinin (2) başlanğıc şərtini ödəyən yeganə  $y = \varphi(x)$  həlli var.

Bu, həndəsi olaraq o deməkdir ki, teoremin şərtləri ödənildikdə  $\sigma$  oblastın hər bir  $(x_0, y_0)$  nöqtəsindən (1) tənliyinin yeganə inteqral əyrisi keçir.

Teoremin isbatının əsas ideyası aşağıdakı kimidir.

(1) diferensial tənliyinin (2) başlanğıc şərtini ödəyən həllinin axarılması

$$\mathbf{y} = \mathbf{y}_0 + \int_{x_0}^x \mathbf{f}(\mathbf{t}, \mathbf{y}) d\mathbf{t} \quad (3)$$

tənliyinin həllinə ekvivalentdir. Axtarılan  $y$  funksiyası inteqral işarəsi altında olduğu üçün (3) tənliyinə **inteqral tənlik** deyilir.

(1) diferensial tənliyinin (3) inteqral tənliyi ilə eyni-güclü olması asanlıqla isbat olunur. (1) tənliyinin (2) başlanğıc şərtini ödəyən hər bir həlli (3) inteqral tənliyinin həllidir. (3) inteqral tənliyinin hər bir həlli isə (1) tənliyini və (2) başlanğıc şərtini ödəyir.

$y$  dəyişəninin  $t$ -dən asılılığı məlum olmadığı üçün (3) tənliyinin sağ tərəfindəki inteqralı hesablamaq mümkün deyildir. Buna görə də bilavasitə inteqrallanma vasitəsilə (3) bərabərliyindən həmin tənliyin həllini tapmaq olmaz.

(3) tənliyinin təqribi və dəqiq həllini ardıcıl yaxınlaşma üsulu vasitəsilə aşağıdakı kimi tapmaq olar:

Əvvəlcə  $y = y_0$  ədədi (3) tənliyinin sıfırıncı yaxınlaşması hesab olunur. Sonra isə

$$\mathbf{y}_1 = \mathbf{y}_0 + \int_{x_0}^x \mathbf{f}(\mathbf{t}, \mathbf{y}_0) d\mathbf{t}$$

bərabərliyi vasitəsilə tənliyin birinci yaxınlaşması tapılır. Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki inteqral altında  $t$ -nin məlum funksiyası ( $y_0$  həqiqi ədəd olub  $t$ -dən asılı deyildir) yazıldığından həmin inteqralı hesablamaq mümkündür. Tənliyin ikinci yaxınlaşması

$$\mathbf{y}_2 = \mathbf{y}_0 + \int_{x_0}^x \mathbf{f}(\mathbf{t}, \mathbf{y}_1) d\mathbf{t}$$

bərabərliyi vasitəsilə və nəhayət,  $n$ -ci yaxınlaşması

$$y_n = y_0 + \int_{x_0}^x f(t, y_{n-1}) dt \quad (4)$$

bərabərliyi vasitəsilə tapılır.

Teoremin şərtləri ödənildikdə, belə qurulan  $\{y_n\}$  ( $y_n = y_n(x)$ ) ardıcılığı müəyyən  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  ( $\delta > 0$ ) intervalında müntəzəm yığılıdır. Ardıcılığın

$$y(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x)$$

limiti (3) inteqraltənliyinin yeganə həllidir. Onda həmin funksiya (1) tənliyində (2) başlanğıc şərtini ödəyən yeganə həlli olar.

Qeyd edək ki,  $y_n(x)$  funksiyalarının hər birini (1) tənliyinin təqribi həlli hesab etmək olar.

Koşi teoremindən aydındır ki, (1) tənliyinin sonsuz sayda həlli var. Doğrudanda, teoremin şərtləri ödənildikdə hər bir  $(x_0, y_0) \in \sigma$  nöqtəsi üçün (1) tənliyinin  $\varphi(x_0) = y_0$  başlanğıc şərtini ödəyən yeganə  $y = \varphi(x)$  həlli var. İndi həmin oblastın başqa bir  $(x_0, y_1)$  nöqtəsini ( $y_1 \neq y_0$ ) götürək. Teoremə görə (1) tənliyinin  $\varphi_1(x_0) = y_1$  başlanğıc şərtini ödəyən  $y = \varphi_1(x)$ ə həlli də var. Bu həll əvvəlki,  $y = \varphi(x)$  həllindən fərqlidir (çünki bir  $x = x_0$  nöqtəsində  $y = \varphi(x)$  funksiyası iki müxtəlif  $y_0$  və  $y_1$  qiymətlərini ala bilməz). Yeni  $(x_0, y_2)$  başlanğıc şərti ( $y_2 \neq y_0, y_2 \neq y_1$ ) başqa bir  $y = \varphi_2(x)$  həllini təyin edər (şəkil 6.) və s.


Beləliklə,  $x_0, y_0$  başlanğıc qiymətlərinin birincisini, yəni  $x_0$ -ı, sabit hesab edərək, ikincisini, yəni  $y_0$ -ı müəyyən intervalda dəyişdirsək, onda  $y_0$ -ın hər bir qiymətinə

(1) tənliyinin bir həlli uyğun olar. Aydındır ki, bu həllər çoxluğu  $y_0$ -dan asılıdır:  $y = \varphi(x, y_0)$ .

Burada  $y_0$  ədədi  $C$  (parametric ilə əvəzedildikdə (1) tənliyinin

$$y = \varphi(x, C) \quad (5)$$

həlli alınır. Buna (1) tənliyinin **ümumi həlli** deyilir.



**Şəkil 6.**

**Tərif.** (1) diferensial tənliyinin ixtiyari  $C$  parametrindən asılı olan  $y = \varphi(x, C)$  həllinə o zaman həmin tənliyin ümumi həlli deyilir ki, həmin həlldən  $C$  parametrinə müəyyən  $C_0$  qiyməti verməklə istənilən  $y_{x=x_0} = y_0$  başlanğıc şərti ödəyən  $y = \varphi(x, C_0)$  həllini almaq mümkün olsun. Burada  $(x_0, y_0)$  nöqtəsi (1) tənliyinin həllinin varlığı və yeganəliyi teoremi şərtlərinin ödənildiyi  $\sigma$  oblastına daxildir.

(1) diferensial tənliyinin ümumi həlli

$$F(x, y, C) = 0 \quad (6)$$

tənliyi vasitəsilə qeyri-aşkar şəkildə də verilə bilər. Bu halda, (6) bərabərliyinə (1) diferensial **tənliyinin ümumi inteqralı** deyilir.

(1) diferensial tənliyinin ümumi həlli

$$x = \varphi(t, C), \quad y = \psi(t, C)$$

parametrik şəkildə də verilə bilər.

(1) diferensial tənliyinin (5) ümumi həllindən  $C$  parametrinə müəyyən  $C=C_0$  qiyməti verməklə alınan  $y = \varphi(x, C_0)$  funksiyasına həmin **tənliyin xüsusi həlli** deyilir.  $F(x, y, C_0) = 0$  münasibəti isə **diferensial tənliyin xüsusi inteqralı** adlanır.

Həndəsi olaraq ümumi həll (və ya ümumi inteqral) bir ixtiyari sabitdən (və ya bir parametrdən) asılı olan inteqral əyriləri ailəsindən ibarətdir. Xüsusi həll (və ya xüsusi inteqral) isə müstəvinin verilmiş  $(x_0, y_0)$  nöqtəsindən keçən inteqral əyridir.

Diferensial tənliyin (2) başlanğıc şərtini ödəyən (xüsusi) həllini və ya  $(x_0, y_0)$  nöqtəsindən keçən inteqral əyrisini tapmaq üçün (5) ümumi həllində  $x=x_0$  və  $y=y_0$  götürərək, alınan

$$y_0 = \varphi(x_0, C) \quad (F(x_0, y_0, C) = 0) \quad (7)$$

bərabərliyini  $C$ -yə nəzərən həll etmək lazımdır. Buradan tapılan  $C=C_0$  ədədini (5) bərabərliyində (və ya (6) bərabərliyində)  $C$  əvəzinə yazmaqla (2) başlanğıc şərtini ödəyən

$$y = \varphi(x, C_0)$$

həlli (və ya  $F(x, y, C_0) = 0$  inteqralı) alınır.

Tutaq ki, (1) diferensial tənliyinin sağ tərəfi  $y$ -dən asılı deyildir, yəni həmin tənlik

$$y' = f(x) \quad (8)$$

şəklindədir və  $f(x)$  funksiyası hər hansı  $(a, b)$  intervalında kəsilməyəndir. Onda inteqral hesabından məlumdur ki, axtarılan  $y$  funksiyası aşağıdakı kimi tapılır:

$$\begin{aligned} y &= \int f(x) dx \\ &+ C \end{aligned} \quad (9)$$

Bir  $C$  parametrindən asılı olan (9) bərabərliyi (8) tənliyinin ümumi həllini (və ya inteqralını) təyin edir. Ola bilər ki, (9) bərabərliyinin sağ tərəfindəki inteqral hesablanır və nəticəsi elementar funksiyalarla ifadə olunur. Ola da bilər ki, həmin inteqralı elementar funksiyalarla ifadə etmək mümkün deyildir.

Bu halların hər ikisində (8) tənliyi həll olunmuş hesab olunur.

Ümumiyyətlə, verilmiş diferensial tənliyin həllinin tapılması bir və ya bir neçə qeyri-müəyyən inteqralın hesablanmasına gətirildikdə həmin diferensial tənlik həll olunmuş hesab olunur. Bu halda, bəzən deyirlər ki, verilmiş diferensial tənlik kvadratura ilə həll olunur.

### Misal.

$$y' = y \quad (10)$$

Tənliyin sağ tərəfindəki  $f(x, y) = y$  funksiyası üçün bütün ( $Oxy$ ) müstəvisində Koşi teoreminin şərtləri ödənilir. Buna görə də müstəvinin istənilən  $(x_0, y_0)$  nöqtəsindən verilmiş tənliyin yeganə inteqral əyrisi keçir.

Tənliyin ümumi həlli bir parametrdən asılı

$$y = Ce^x \quad (11)$$

funksiyasıdır. Doğrudan da, (11) funksiyası ixtiyari  $C$  üçün (10) tənliyini ödəyir:

$$(Ce^x)' = Ce^x, \quad Ce^x \equiv Ce^x.$$


Verilmiş ixtiyari  $(x_0, y_0)$  başlanğıc qiymətləri üçün isə  $C$  parametrinin elə  $C_0$  qiymətini tapmaq olar ki,

$$y = C_0 e^x.$$

həlli

$$y_{x=x_0} = y_0$$

başlanğıc şərtini ödəsin



**Şəkil 7.**

Bu məqsədlə  $C$ -nin  $C_0$  qiymətini

$$y_0 = Ce^{x_0}$$

bərabərliyindən tapmaq lazımdır:  $C = C_0 = y_0e^{-x_0}$ .

Alınan

$$y = y_0e^{-x_0} \cdot e^x \text{ və ya } y = y_0e^{x-x_0}$$

həlli (2) başlanğıc şərtini ödəyir.

$C$  parametrinin müxtəlif qiymətlərinə uyğun inteqral ayrıları 7-ci şəkildə göstərilmişdir.  $y = y_0e^{-x_0} \cdot e^x$  həllinin qrafiki  $(x_0, y_0)$  nöqtəsindən keçir.

## XXII FƏSİL. DİFERENSİAL TƏNLİKLƏR VƏ HƏLL ÜSULLARI

### 22.1.1. Dəyişənlərinə ayrılan diferensial tənliklər

1. Tutaq ki,  $M(x)$  və  $N(y)$  funksiyaları uyğun olaraq  $(a,b)$  və  $(l,d)$  intervalında kəsilməyəndir. Bu halda

$$M(x)dx + N(y)dy = 0 \quad (1)$$

tənliyinə **dəyişənlərinə ayrılmış diferensial tənlik** deyirlər. (1) tənliyində  $dx$ -in əmsalı ancaq  $x$ -dən,  $dy$ -in əmsalı ancaq  $y$ -dən asılıdır.

Fərz edək ki,  $y(x)$  funksiyası (1) tənliyinin həllidir. Onda həmin funksiya  $(a,b)$  intervalında (1) tənliyini eyniliyə çevirir:

$$M(x)dx + N(y(x))dy(x) = 0 \quad (2)$$

Bu eyniliyi inteqralladıqda

$$\int M(x)dx + \int N(y)dy = C \quad (3)$$

münasibəti alınır; burada  $C$  ixtiyari sabitdir.

Deməli, (1) tənliyinin hər bir həlli (3) tənliyini də ödəyir. Tərsinə, əgər  $y(x)$  funksiyası (3) tənliyini ödəyirsə, onda həmin eyniliyi diferensialladıqda (2) münasibəti alınır. Bu da həmin funksiyanın (1) tənliyini ödədiyini göstərir.

Buradan aydındır ki, (3) tənliyi (və ya bərabərliyi) (1) tənliyinin bütün həllərini təyin edir. Buna görə də (3) münasibəti (1) tənliyinin ümumi inteqralı olar. Ola bilər ki, (3) bərabərliyində iştirak edən inteqralların biri və ya hər ikisi elementar funksiyalarla ifadə oluna bilmir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu halda da (1) diferensial tənliyi həll olunmuş hesab olunur və (3) bərabərliyi onun ümumi inteqralını (həllini) təyin edir.  $N(y) \neq 0$  olduqda (3) bə-



rabərliyindən (1) tənliyinin  $y$  həlli  $x$ -in qeyri-aşkar funksiyası kimi təyin oluna bilər.

(1) tənliyinin ümumi inteqralını müəyyən inteqral vasitəsilə

$$\int_{x_0}^x \mathbf{M}(\mathbf{x})d\mathbf{x} + \int_{y_0}^y \mathbf{N}(\mathbf{y})d\mathbf{y} = \mathbf{C} \quad (4)$$

şəklində yazmaq olar. Buradan (1) tənliyinin  $y(x_0) = y_0$  başlanğıc şərtini ödəyən həlli

$$\int_{x_0}^x \mathbf{M}(\mathbf{x})d\mathbf{x} + \int_{y_0}^y \mathbf{N}(\mathbf{y})d\mathbf{y} = 0$$

kimi tapılır.

**Misal 1.**  $e^x dx + y dy = 0$  tənliyini həll etməli.

Burada  $M(x) = e^x$  və  $N(y) = y$  funksiyalarının hər ikisi  $(-\infty, \infty)$  intervalında kəsilməzdir. Buna görə də həmin tənliyin ümumi həlli (3) bərabərliyindən

$$\int e^x dx + \int y dy = C \text{ və ya } e^x + \frac{y^2}{2} = C$$

şəklində tapılır.

2. Fərz edək ki,  $M_i(x)$  və  $N_i(y)$  ( $i = 1, 2$ ) funksiyaları uyğun olaraq  $(a, b)$  və  $(l, d)$  intervalında kəsilməyəndir. Bu halda

$$M_1(x)N_1(y)dx + M_2(x)N_2(y)dy = 0 \quad (5)$$

tənliyinə **dəyişənlərinə ayrılan tənlik** deyilir. (5) tənliyi dəyişənlərinə ayrılmış tənliyə gətirilir. Bu məqsədlə həmin tənliyin hər iki tərəfini  $N_1(y) M_2(x) \neq 0$  hasilinə bölmək lazımdır:

$$\frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = 0$$

Dəyişənlərinə ayrılmış bu tənliyin ümumi inteqralı

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = C \quad (6)$$

olar. (5) tənliyinin (6) ümumi inteqralından alınma bilməyən başqa həlləri də ola bilər. Belə həllər  $N_1(y)M_2(x) = 0$  bərabərliyinin ödənilməyi nöqtələr içərisində olar.

Tutaq ki,  $y = y_1$  ədədi  $N_1(y) = 0$  tənliyinin həllidir:  $N_1(y_1) = 0$  ( $l < y_1 < d$ ).  $dy_1 = 0$  və  $N_1(y_1) = 0$  olmasından aydındır ki,  $y = y_1$  funksiyası (5) tənliyinin həllidir.

$M_2(x_1) = 0$  ( $a < x_1 < b$ ) bərabərliyi ödənildikdə isə  $x = x_1$  funksiyası (5) tənliyinin həlli olar.

**Misal 2.**  $xydx + (1 + x^2)dy = 0$  tənliyini həll etməli.

Bu tənliyin hər iki tərəfini  $y(1 + x^2) \neq 0$  hasilinə böldükdə dəyişənlərinə ayrılmış

$$\frac{x}{1 + x^2} dx + \frac{dy}{y} = 0$$

tənliyi alınır. Bunun ümumi inteqralı

$$\frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + \ln|y| = \ln C, \quad C > 0$$

(burada  $C$  sabiti  $\ln C$  ilə işarə olunur),

$$\sqrt{1 + x^2}|y| = C$$

olar.

**Misal 3.**  $e^y \sin x dx + x dy = 0$  tənliyinin ümumi inteqralı aşağıdakı kimitapılar:

$$\frac{\sin x}{x} dx + \frac{dy}{e^y} = 0,$$

$$\int \frac{\sin x}{x} dx + \int \frac{dy}{e^y} = C,$$

$$\int \frac{\sin x}{x} dx - e^{-y} = C.$$

### 22.1.2. Bircinsli diferensial tənliklər

Bircinsli tənliklərə gətirilən bir neçə halı nəzərdən keçirək. Əvvəlcə bircinsli funksiya haqqında məlumat verək.

1. Tutaq ki, müəyyən  $\sigma$  oblastında təyin olunmuş ikidəyişənli  $f(x, y)$  funksiyası verilmişdir. İstənilən  $(x, y) \in \sigma$  nöqtəsi və  $(tx, ty) \in \sigma$  şərtini ödəyən hər bir  $t$  ədədi üçün

$$f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y) \quad (1)$$

eyniliyi ödənildikdə  $f(x, y)$  funksiyasına  $\sigma$  oblastında  $\alpha$  dərəcəli **bircinsli funksiya** deyilir. Məsələn,

$$f_1(x, y) = xy + x^2, \quad f_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}},$$

$$f_3(x, y) = \frac{x + y}{\sqrt{xy}}.$$

funksiyaları uyğun olaraq 2, -1 və 0 dərəcəli bircinsli funksiyalardır:

$$f_1(tx, ty) = tx \cdot ty + (tx)^2 = t^2(xy + x^2) = t^2 f_1(x, y),$$

$$f_2(tx, ty) = \frac{1}{\sqrt{(tx)^2 + (ty)^2}} = \frac{1}{t\sqrt{x^2 + y^2}} = t^{-1} f_2(x, y),$$

$$f_3(tx, ty) = \frac{tx + ty}{\sqrt{tx \cdot ty}} = \frac{t(x + y)}{t\sqrt{xy}} = t^0 f_3(x, y).$$

2.  $f(x, y)$  funksiyası  $x$  və  $y$  dəyişənlərinə nəzərən sıfır dərəcəli bircinsli funksiya olduqda

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (2)$$

tənliyinə bircinsli diferensial tənlik deyilir.

Bu tənliyi həll etmək üçün  $f(x, y)$  funksiyasının sıfır dərəcəli bircinsli funksiya olmasını, yəni həmin funksiyanın

$$f(tx, ty) = t^0 f(x, y) = f(x, y) \quad (3)$$

bərabərliyini ödəməsini nəzərə alaraq. (3) bərabərliyində  $t = \frac{1}{x}$  qəbul etsək,

$$f(x, y) = f\left(1, \frac{y}{x}\right)$$

olar. Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki  $f\left(1, \frac{y}{x}\right)$  ifadəsi  $\frac{y}{x}$  nisbətinin müəyyən funksiyasıdır. Həmin funksiyanı  $\varphi\left(\frac{y}{x}\right)$  ilə işarə etdikdə, (2) tənliyi

$$\frac{dy}{dx} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) \quad (4)$$

şəklində yazılır. (2) və (4) tənliklərinin ekvivalent olması üçün  $x \neq 0$  hesab etmək lazımdır.

(4) tənliyi  $\frac{y}{x} = z$  əvəzləməsi vasitəsilə dəyişənlərinə ayrılan tənliyə gətirilir.

Doğrudan da,

$$y = xz, \quad \frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}$$

olar və (4) tənliyi

$$z + x \frac{dz}{dx} = \varphi(z), \quad x \frac{dz}{dx} = \varphi(z) - z$$

kimi yazılır. Buradan

$$\frac{dz}{\varphi(z) - z} = \frac{dx}{x}, \quad \varphi(z) - z \neq 0,$$

$$\ln C + \int \frac{dz}{\varphi(z) - z} = \ln x, \quad x = Ce^{\int \frac{dz}{\varphi(z) - z}}$$

alınır.  $\int \frac{dz}{\varphi(z) - z} = \psi(z)$  qəbul etsək, (4) tənliyinin ümumi inteqralı

$$x = Ce^{\psi\left(\frac{y}{x}\right)} \quad (5)$$

şəklində yazılar.

**Qeyd.** Xüsusi halda,  $\varphi(z) = z$  olduqda (4) tənliyi dəyişənlərinə ayrılan  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x}$  tənliyinə çevrilir. Bu tənliyin ümumi həlli  $y=Cx$  ( $x \neq 0$ ) funksiyasıdır. Əgər  $\varphi(z) - z \neq 0$  ödənilirsə, lakin müəyyən  $z = z_1$  qiymətində  $\varphi(z_1) - z_1 = 0$  bərabərliyi doğrudursa, onda  $z = z_1$  funksiyası  $x dz = [\varphi(z) - z] dx$  tənliyinin həlli olar. Buna (4) tənliyinin  $y = z_1 x$  həlli uyğundur. Həmin həlli, bəzən (5) ümumi inteqralından (həllindən) almaq mümkün olmur.

**Misal 1.** Bircinsli  $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2$  tənliyini həll etməli.  $\frac{y}{x} = z$  və ya  $y = xz$  əvəzləməsini aparsaq,  $\frac{dy}{dx} = z + x \frac{dz}{dx}$  olar. Onda

$$z + x \frac{dz}{dx} = z + z^2, \quad x \frac{dz}{dx} = z^2$$

(dəyişənlərinə ayrılan tənlik),

$$\frac{dx}{x} = \frac{dz}{z^2}, \quad \ln x = \ln C - \frac{1}{z}, \quad x = Ce^{-\frac{1}{z}},$$

$$x = Ce^{-\frac{x}{y}}$$

olar. Sonuncu ifadə verilmiş tənliyin ümumi inteqralıdır.

3.  $M(x,y)$  və  $N(x,y)$  funksiyaları eyni dərəcəli bircinsli funksiyalar olduqda

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 \quad (6)$$

tənliyi də bircinsli tənlik adlanır. Bu tənliyi (2) bircinsli tənlik şəklinə gətirmək olur:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x,y)}{N(x,y)} = f(x,y), \quad (N(x,y) \neq 0).$$

Qeyd edək ki, bircinsli (6) tənliyini (2) şəklinə gətirmədən də həll etmək olar. Bu məqsədlə  $y=xz$  ( $dy=x dz + z dx$ ) əvəzləməsindən istifadə etmək lazımdır.

**Misal 2.** Bircinsli  $(x+y)dx - (y-x)dy = 0$  tənliyini həll etməli.

$y=xz$  əvəzləməsini aparsaq,  $dy=x dz + z dx$  olar. Onda verilmiş tənlik

$$(x+xz)dx - (xz-x)(xdz+zdx) = 0$$

və ya

$$(1+2z-z^2)dx + x(1-z)dz = 0$$

şəklində yazılar. Buradan tənliyin ümumi inteqralı alınır:

$$\frac{1-z}{1+2z-z^2} dz + \frac{dx}{x} = 0,$$

$$\frac{1}{2} \ln|1+2z-z^2| + \ln|x| = \ln C,$$

$$(1+2z-z^2)x^2 = C^2, \quad x^2 + 2yx - y^2 = C^2.$$

4.  $f$  müəyyən kəsilməyən funksiya olduqda

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax+by+c}{a_1x+b_1y+c_1}\right) \quad (7)$$

şəklində tənliklər bircinsli tənliyə gətirilir.  $c=c_1=0$  olduqda (7) tənliyinin bircinsli olması aydındır. Buna görə də  $c$  və

$c_1$  ədədlərinin heç olmasa birinin sıfırdan fərqli olduğu halda baxaq.

Tutaq ki,  $ab_1 - a_1b \neq 0$ . Bu halda (7) tənliyində

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{\alpha}, \quad \mathbf{by} = \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\beta}$$

əvəzləməsini aparmaq lazımdır:

$$\frac{d\boldsymbol{\eta}}{d\boldsymbol{\xi}} = f\left(\frac{\mathbf{a}\boldsymbol{\xi} + \mathbf{b}\boldsymbol{\eta} + \mathbf{a}\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{b}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{c}}{\mathbf{a}_1\boldsymbol{\xi} + \mathbf{b}_1\boldsymbol{\eta} + \mathbf{a}_1\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{b}_1\boldsymbol{\beta} + \mathbf{c}_1}\right) \quad (8)$$

Əgər  $\alpha$  və  $\beta$  ədədlərini

$$\begin{cases} \mathbf{a}\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{b}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{c} = \mathbf{0}, \\ \mathbf{a}_1\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{b}_1\boldsymbol{\beta} + \mathbf{c}_1 = \mathbf{0} \end{cases}$$

sisteminin həlli kimi təyin etsək, onda (8) tənliyi bircinsli

$$\frac{d\boldsymbol{\eta}}{d\boldsymbol{\xi}} = f\left(\frac{\mathbf{a}\boldsymbol{\xi} + \mathbf{b}\boldsymbol{\eta}}{\mathbf{a}_1\boldsymbol{\xi} + \mathbf{b}_1\boldsymbol{\eta}}\right)$$

tənliyinə çevrilər.

$$ab_1 - a_1b = 0 \text{ olduqda isə } \frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \lambda$$

münasibətində  $a_1 = \lambda a$ ,  $b_1 = \lambda b$  alınır. Bu qiymətləri (7) tənliyində yerinə yazsaq və  $z = ax + by$  əvəzləməsini aparsaq, onda (7) tənliyi dəyişənlərinə ayrılan tənliyə çevrilər.

## 22.2. Birtərtibli xətti diferensial tənliklər

Axtarılan funksiya və onun törəməsinə nəzərən xətti olan tənliyə birtərtibli xətti diferensial tənlik deyilir. Birtərtibli xətti diferensial tənliyi

$$y' + p(x)y = f(x) \quad (1)$$

şəklində yazmaq olar.  $f(x) \equiv 0$  olduqda alınan

$$y' + p(x)y = 0 \quad (2)$$

tənliyinə (1) tənliyinə uyğun olan **xətti bircinsli tənlik** deyilir.  $f(x) \neq 0$  olduqda (1) tənliyi **xətti bircinsli olmayan diferensial tənlik** adlanır.

Fərz edək ki,  $p(x)$  və  $f(x)$  funksiyaları müəyyən  $(a, b)$  intervalında kəsilməzdir. (1) tənliyini aşağıdakı kimi yazaq.

$$y' = -p(x)y + f(x).$$

Aydındır ki, bu halda  $f(x, y) = -p(x)y + f(x)$  funksiyası  $\sigma = (a < x < b, -\infty < y < \infty)$  oblastında kəsilməzdir və həmin oblastda kəsilməyən  $f'_y(x, y) = -p(x)$  xüsusi törəməsi var. Buna görə də diferensial tənliyin həllinin varlığı və yeganəliyi teoreminə görə (1) tənliyinin istənilən  $x_0, y_0$  ( $(x_0, y_0) \in \sigma$ ) başlanğıc şərtini ödəyən yeganə həlli var:

**$y' + p(x)y = 0$  tənliyinin həlli.** Bu tənlik dəyişənlərinə ayrılır.

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0, \quad \frac{dy}{y} = -p(x)dx.$$

Axırıncı tənliyi inteqrallasaq,

$$\ln|y| = -\int p(x)dx + \ln|C|$$

$$y = Ce^{-\int p(x)dx} \quad (3)$$

alırıq. Bu (2) tənliyinin ümumi həllidir.

**$y' + p(x)y = f(x)$  tənliyinin həlli.** Bu tənliyi müxtəlif üsullarla həll etmək olar. Burada həmin tənlik sabitin variasiyası üsulu ilə həll edilir.

(1) tənliyinə uyğun olan (2) xətti bircinsli tənliyinin (3) ümumi həllindəki ixtiyari  $C$  sabitini  $x$ -dən asılı elə  $C=C(x)$  funksiyası hesab edək ki, alınan

$$y = C(x)e^{-\int p(x)dx} \quad (4)$$

funksiyası (1) tənliyinin həlli olsun. Onda



$$\begin{aligned}
& [C(x)e^{-\int p(x)dx}]' + p(x)[C(x)e^{-\int p(x)dx}] = f(x), \\
& C'(x)e^{-\int p(x)dx} - C(x)p(x)e^{-\int p(x)dx} + \\
& \quad + C(x)p(x)e^{-\int p(x)dx} = f(x), \\
& \quad C'(x)e^{-\int p(x)dx} = f(x), \\
& \quad C'(x) = f(x)e^{\int p(x)dx}.
\end{aligned}$$

Buradan naməlum  $C(x)$  funksiyası tapılır:

$$C(x) = \int f(x)e^{\int p(x)dx} dx + C.$$

Bu qiyməti (4) bərabərliyində yerinə yazdıqda (1) tənliyinin ümumi həlli alınır:

$$y = e^{-\int p(x)dx} [\int f(x)e^{\int p(x)dx} dx + C] \quad (5)$$

Aydındır ki, (1) tənliyinin (5) ümumi həlli inteqrallama (kvadratura) vasitəsilə tapılır və iki toplananın cəmindən ibarətdir: birinci toplanan (2) bircinsli tənliyinin ümumi həlli

$$Ce^{-\int p(x)dx}$$

ikinci toplanan isə (1) tənliyinin bir xüsusi həlli

$$e^{-\int p(x)dx} \int f(x)e^{\int p(x)dx} dx$$

(bu xüsusi həll (5) ümumi həllindən  $C=0$  olduqda alınır)

**Misal.**  $y' + \frac{y}{x} = x^2$  xətti tənliyini həll etməli.

Bu tənliyə uyğun olan bircinsli

$$y' + \frac{y}{x} = 0$$

tənliyinin ümumi həlli

$$y = \frac{C}{x}$$

olar. İndi elə  $C(x)$  funksiyası tapaq ki,

$$y = \frac{C(x)}{x} \quad (6)$$

funksiyası verilmiş tənliyin həlli olsun. Bu məqsədlə (6) funksiyasını verilmiş tənlikdə yerinə yazaq:

$$\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2} + \frac{C(x)}{x^2} = x^2,$$

$$C'(x) = x^3$$

$$C(x) = \frac{x^4}{4} + C_1.$$

Buradan aydındır ki, verilmiş tənliyin ümumi həlli

$$y = \frac{x^3}{4} + \frac{C_1}{x}.$$

olar.

### 22.3.1. Bernulli tənliyi

Tutaq ki,  $p(x)$  və  $f(x)$  hər hansı  $(a,b)$  intervalında kəsilməyən funksiyalar və  $m$  istənilən həqiqi ədəddir. Bu halda

$$y' + p(x)y = f(x)y^m \quad (1)$$

şəklində tənliyə **Bernulli tənliyi** deyilir.  $m=0$  və  $m=1$  olduqda (1) tənliyi uyğun olaraq xətti və dəyişənlərinə ayrılan tənliyə çevrilir.

Bernulli tənliyi  $m \neq 1$  olduqda əvəzləmə vasitəsilə xətti tənliyə gətirilir. Buna inanmaq üçün (1) tənliyinin hər iki tərəfini  $y^m (y \neq 0)$  ifadəsinə bölək və alınan

$$y^{-m}y' + p(x)y^{1-m} = f(x)$$

tənliyində  $y^{1-m} = z$  əvəzləməsini apararaq. Onda

$$(1 - m)y^{-m} \cdot y = z, \quad y^{-m} \cdot y' = \frac{z'}{1 - m}$$

və  $z$  dəyişəninə nəzərən

$$z' + (1 - m)p(x)z = f(x)(1 - m) \quad (2)$$

xətti tənliyi alınır. Bu xətti tənliyin ümumi həlli

$$z = e^{-\int(1-m)p(x)dx} \left[ C + \int (1-m)f(x)e^{\int(1-m)p(x)dx} dx \right]$$

olar. Buradan  $y = z^{\frac{1}{1-m}}$  olduğundan (1) tənliyinin ümumi həlli aşağıdakı şəkildə alınır:  $y = \left\{ e^{-\int(1-m)p(x)dx} \left[ C + \int (1-m)f(x)e^{\int(1-m)p(x)dx} dx \right] \right\}^{\frac{1}{1-m}}$  (3)

Aydındır ki,  $y=0$  funksiyası  $m > 0$  olduqda Bernulli tənliyinin həllidir. Bu həll  $m > 1$  olduqda (3) ümumi həllindən  $C = \infty (C \rightarrow \infty)$  götürməklə alınır,  $0 < m < 1$  olduqda isə bu həll ümumi həldən  $C$  sabitinin heç bir qiymətində alınmır.

**Misal.**  $y' + xy = xy^3$  ( $m = 3$ ) tənliyini həll etməli.

Tənliyin hər iki tərəfini  $y^3$  funksiyasına bölərək,  $y^{-2} = z$  zəvəzləməsini apardıqda

$$\frac{z'}{-2} + xz = x, \quad z' - 2xz = -2x$$

xətti tənliyi alınır. Bu tənliyin ümumi həlli

$$z = Ce^{x^2} + 1$$

funksiyasıdır. Buradan verilmiş tənliyin

$$y^{-2} = Ce^{x^2} + 1$$

ümumi həlli alınır.

### 22.3.2. Tam diferensiallı tənliklər

Aşağıdakı hallara baxaq.

1. Tutaq ki,  $M(x,y)$  və  $N(x,y)$  funksiyaları birrabitəli  $\sigma$  oblastında təyin olunmuş kəsilməyən funksiyalardır. Diferensial şəklində yazılmış

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 \quad (1)$$

tənliyinin sol tərəfi hər hansı ikidəyişənli  $U(x, y)$  funksiyasının tam diferensialı olarsa, yəni

$$dU(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy \quad (2)$$

ödənilirsə, onda həmin tənliyə  $\sigma$  oblastında **tam diferensiallı tənlik** deyilir.

(1) tənliyi tam diferensiallı tənlik olduqda onu

$$dU(x, y) = 0$$

şəklində yazmaq olar. Bu bərabərliyin hər iki tərəfini inteqrallamaqla (1) tənliyinin ümumi inteqralı tapılır:

$$U(x, y) = C.$$

**Misal 1.**  $\left(2x + \frac{y}{x}\right) dx + \ln x dy = 0$  tənliyinin sol tərəfi  $U(x, y) = x^2 + y \ln x$  tərəfi funksiyanın tam diferensialıdır. Yəni

$$dU(x, y) = \left(2x + \frac{y}{x}\right) dx + \ln x dy.$$

Buna görə də verilmiş tənliyin ümumi inteqralı

$$x^2 + y \ln x = C$$

olar.

Buradan aydındır ki, tam diferensiallı tənliklər kvadratura ilə çox asan həll olunur. Ona görə də verilmiş diferensial tənliyin tam diferensiallı olmasını bilməyin böyük əhəmiyyəti vardır. Bunu necə bilmək olar?

**2. Teorem. Tutaq ki,  $M(x, y)$  və  $N(x, y)$  funksiyaları birrabitəli  $\sigma$  oblastında təyin olumuşdur, kəsilməyəndir və kəsilməyən  $\frac{\partial M(x, y)}{\partial y}, \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$  xüsusi törəmələri var. Bu halda (1) tənliyinin  $\sigma$  oblastında tam diferensiallı tənlik olması üçün həmin oblastın bütün nöqtələrində**

$$\frac{\partial M(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x} \quad (3)$$

**bərabərliyinin ödənilməsi zəruri və kafi şərtidir.**

**Şərtin zəruriliyi.** Tutaq ki, (1) tənliyi tam diferensiallandıdır və (2) bərabərliyi ödənilir. Onda  $\sigma$  oblastının bütün nöqtələrində

$$\frac{\partial U(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} dy = M(x, y) dx + N(x, y) dy$$

olar. Buradan

$$\frac{\partial U(x, y)}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial u(x, y)}{\partial y} = N(x, y)$$

eynilikləri alınır. Bu bərabərliklərin birincisini  $y$ -ə nəzərən, ikincisini isə  $x$ -ə nəzərən diferensialladıqda

$$\frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial M(x, y)}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial y \partial x} = \frac{\partial N(x, y)}{\partial x}$$

münasibətləri, buradan isə ikitərtibli qarışıq törəmələrin bərabərliyi haqqında Şvars teoreminə əsasən (3) bərabərliyi alınır.

**Şərtin kafiliyi.** Tutaq ki,  $\sigma$  oblastının bütün nöqtələrində (3) bərabərliyi ödənilir. Onda elə  $U(x, y)$  funksiyası tapmaq olar ki,

$$\frac{\partial U(x, y)}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial U(x, y)}{\partial y} = N(x, y) \quad (4)$$

bərabərlikləri  $\sigma$  oblastında ödənilsin. Bu funksiyanı tapmaq üçün  $\sigma$  oblastının istənilən  $(x_0, y_0)$  nöqtəsini götürək və (4) bərabərliklərinin birincisindən  $U(x, y)$  funksiyasını tapaq:

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y) dx + \varphi(y) \quad (5)$$

(5) bərabərliyində inteqrallama  $x$ -ə nəzərən aparıldığı üçün ixtiyari  $C$  sabiti əvəzinə diferensiallanan ixtiyari

$\varphi(y)$  funksiyası götürülmüşdür. İndi bu  $\varphi(y)$  funksiyasını elə seçək ki, (5) bərabərliyi ilə təyin olunan  $U(x,y)$  funksiyası (4) bərabərliklərinin ikincisini də ödəsin. Onda

$$\frac{U(x,y)}{\partial y} = N(x,y) = \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x M(x,y) dx + \varphi'(y)$$

olar. Burada

$$\frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x M(x,y) dx = \int_{x_0}^x \frac{\partial M(x,y)}{\partial y} dx$$

bərabərliyini və (3) şərtinə görə

$$\frac{\partial M(x,y)}{\partial y} = \frac{\partial N(x,y)}{\partial x}$$

olduğunu nəzərə alsaq,

$$N(x,y) = \int_{x_0}^x \frac{\partial N(x,y)}{\partial x} dx + \varphi'(y)$$

və ya

$$\varphi'(y) = N(x_0, y)$$

münasibəti alınır. Sonuncu bərabərlikdən axtarılan  $\varphi(y)$  funksiyası tapılır:

$$\varphi(y) = \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy + C$$

( $C$  ixtiyari sabitdir).  $\varphi(y)$  funksiyasının bu qiymətini (5) bərabərliyində yerinə yazsaq, tələb olunan  $U(x,y)$  funksiyasını alarıq:

$$U(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy + C \quad (6)$$

Aydındır ki, (6) bərabərliyi ilə təyin olunan  $U(x, y)$  funksiyası (4) bərabərliklərinin ikisini də ödəyir, yəni (1) tənliyi tam diferensiallı tənlikdir.

Beləliklə, şərtin kafiliyi isbat olunarkən, həm də axtarılan  $U(x, y)$  funksiyasının tapılma qaydası (yəni (6) düsturu) göstərildi. Aparılan mühakimədən aydındır ki, tam diferensiallı tənliyin ümumi inteqralı

$$\int_{x_0}^x M(x, y) dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy = C \quad (7)$$

olar.

**Misal 2.**  $(3x^2 + y)dx + (x + 4y^3)dy = 0$  tənliyini həll etməli. Bu tənlik üçün

$$M(x, y) = 3x^2 + y \text{ və } N(x, y) = x + 4y^3$$

olduğundan bütün (Oxy) müstəvisində teoremin

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 1$$

şerti ödənilir. Deməli, verilmiş tənlik tam diferensiallı tənlikdir. Bu tənliyin ümumi inteqralı (7) düsturu ilə tapılır:

$$\int_0^x (3x^2 + y) dx + \int_0^y 4y^3 dy = C, \quad (x_0 = y_0 = 0),$$

$$x^3 + yx + y^4 = C.$$

3. (1) tənliyi tam diferensiallı olmadıqda onu bəzən tam diferensiallı tənliyə gətirmək mümkün olur. Bu məq-

sədlə (1) tənliyinin hər iki tərəfini elə  $\mu = \mu(x, y)$  funksiyasına vururlar ki, alınan

$$\mu M(x, y) dx + \mu N(x, y) dy = 0 \quad (8)$$

tənliyi tam diferensiallı olsun. Belə  $\mu(x, y)$  funksiyasına (1) tənliyinin **inteqrallayıcı vuruğu** deyilir.

Verilmiş tənliyin inteqrallayıcı vuruğunu necə tapırlar?

$\mu(x, y)$  funksiyası (1) tənliyinin inteqrallayıcı vuruğu olması üçün (8) tənliyi tam diferensiallı olmalıdır. Bunun üçün isə

$$\frac{\partial(\mu, M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu, N)}{\partial x}$$

və ya

$$N \frac{\partial \mu}{\partial x} - M \frac{\partial \mu}{\partial y} = \mu \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) \quad (9)$$

şerti ödənilməlidir. (9) tənliyinə axtarılan  $\mu(x, y)$  funksiyasının xüsusi törəmələri daxildir.

Deməli, (1) tənliyinin  $\mu(x, y)$  inteqrallayıcı vuruğunu tapmaq üçün (9) xüsusi törəməli diferensial tənliyini həll etmək lazımdır. Bu məsələ, ümumi halda, (1) tənliyini inteqrallamaq məsələsindən çətindir.

Bir sıra xüsusi hallarda inteqrallayıcı vuruğu tapmaq mümkün olur. Burada  $\mu = \mu(x)$  funksiyasının  $x, y$  dəyişənlərinin ancaq birindən asılı olduqda bu halda tapılma qaydası verilir.

$\mu = \mu(x)$ . Bu halda (9) tənliyi

$$N \frac{\partial \mu(x)}{\partial x} = \mu(x) \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

və ya



$$\frac{d\mu(x)}{\mu(x)} = \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx$$

şəklində yazılır. Buradan inteqrallayıcı vuruq tapılır:

$$\ln \mu(x) = \int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx + C$$

və ya

$$\mu(x) = e^{\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} dx}, (C = 0) \quad (10)$$

Aydındır ki, bu halda  $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N}$  nisbəti y-dən asılı deyildir.

$\mu = \mu(y)$ . Bu halda (9) tənliyi

$$M \frac{\partial \mu(y)}{\partial y} = -\mu \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right)$$

və ya

$$\frac{d\mu(y)}{\mu(y)} = -\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M} dy$$

şəklində yazılır. Buradan  $\mu(y)$  inteqrallayıcı vuruğu tapılır:

$$\mu(y) = e^{-\int \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M} dy} \quad (11)$$

Bu halda  $\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{M}$  nisbəti x-dən asılı olmur.

**Misal 3.**  $3(1 + y^2)dx + 2xydy = 0$  tənliyini həll etməli.

Burada  $M(x, y) = 3(1 + y^2)$  və  $N(x, y) = 2xy$  olduğundan

$$\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} = 6y - 2y = 4y$$

olar və aydındır ki,

$$\frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} = \frac{4y}{2xy} = \frac{2}{x}$$

nisbəti  $y$ -dən asılı deyildir. Deməli, verilmiş tənliyin inteqrallayıcı vuruğu ancaq  $x$ -dən asılıdır:  $\mu = \mu(x)$ . Onda (10) düsturuna əsasən inteqrallayıcı vuruğu tapmaq olar:

$$\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = e^{\ln x^2} = x^2.$$

tənliyin hər iki tərəfini tapdığımız  $\mu = x^2$  funksiyasına vurduqda tam diferensiallı tənlik alınır:

$$3x^2(1 + y^2)dx + 2x^3ydy = 0.$$

Bu tənliyin ümumi inteqralı (7) düsturu ilə tapılır:

$$\int_0^x 3x^2(1 + y^2)dx + \int_0^y 0 \cdot dy = C(x_0 = y_0 = 0),$$

$$x^3(1 + y^2) = C.$$

### 22.3.3. İkitərtibli diferensial tənliklər

Yüksək tərtib törəməyə nəzərən həll edilmiş ikitərtibli diferensial tənliyin ümumi şəkli aşağıdakı kimidir:

$$y'' = f(x, y, y'). \quad (1)$$


Bu tənliyin  $y = \varphi(x, C_1, C_2)$  ümumi həllində iki sərbəst sabit iştirak edir. Həndəsi olaraq ümumi həll iki parametrdən asılı inteqral əyriləri ailəsini təsvir edir. Ümumiyyətlə,  $Oxy$  müstəvisinin hər bir  $M_0(x_0; y_0)$  nöqtəsindən inteqral əyriləri dəstəsi keçir (şəkil 1). Ona görə də bu inteqral əyriləri ailəsindən konkret bir əyrini seçmək üçün onun keçdiyi nöqtə ilə yanaşı həmin nöqtədən keçdiyi istiqamət də göstərməlidir. Bu o deməkdir ki, (1) tənliyinin konkret bir həllini ümumi həldən

$$y(x_0) = y_0 \vee \vartheta \quad y'(x_0) = y_1 \quad (2)$$

başlangıç şərtləri daxilində almaq olar. Başqa sözlə,

$$\begin{cases} \varphi(x_0, C_1, C_2) = y_0, \\ \varphi'_x(x_0, C_1, C_2) = y_1 \end{cases}$$

tənliklər sistemini  $C_1$  və  $C_2$  –yə nəzərən həll edib, verilən tənliyin bir xüsusi həllini tapa bilərik.



**Şəkil 1**

(1) tənliyinin (2) başlanğıc şərtlərini ödəyən  $y=y(x)$  həllinin tapılması məsələsi həmin tənlik üçün Koşi məsələsi adlanır.

#### **22.3.4. İkitərtibli diferensial tənliklərin inteqrallanan bəzi növləri.**

Ümumi halda ikitərtibli diferensial tənliyin dəqiq həllini tapmaq mümkün deyil. Bu paragrafda biz inteqrallana bilən müəyyən tənliklərə baxacağıq.

I. Tutaq ki,

$$y'' = f(x) \quad (1)$$

şəklində tənlik verilmişdir. Bu tənliyi inteqrallasaq alarıq:

$$y' = \int f(x)dx = F_1(x) + C_1. \quad (2)$$

Burada  $F_1(x)$  funksiyası  $f(x)$ -in hər hansı bir ibtidai funksiyası,  $C_1$  isə ixtiyari sabitdir. Tutaq ki,  $F_2(x)$  funksiyası da öz növbəsində  $F_1(x)$ -in müəyyən bir ibtidai funksiyasıdır. Onda (2) bərabərliyini inteqrallayıb (1) tənliyinin aşağıdakı şəkildə ümumi həllini taparıq:

$$y = F_2(x) + C_1x + C_2.$$

II. Aşağıdakı tənliyə baxaq:

$$y'' = f(y). \quad (3)$$

Onu həll etmək üçün

$$y' = p$$

əvəzləməsi aparaq. Burada  $p$ -yə  $y$ -dən asılı bir funksiya kimi baxsaq, alırıq:

$$y'' = \frac{dy'}{dx} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \cdot \frac{dp}{dy}$$

Bu halda (3) tənliyi

$$p \frac{dp}{dy} = f(y)$$

şəklinə düşər. Onu dəyişənlərinə ayırıq:  $pdp = f(y)dy$ . Bu tənliyi inteqrallayıb

$$\frac{p^2}{2} = \int f(y)dy$$

və ya

$$p = \pm \sqrt{2 \int f(y)dy}$$

alırıq. Burada  $p = \frac{dy}{dx}$  olduğunu nəzərə alsaq,

$$\frac{dy}{dx} = \pm \sqrt{2 \int f(y) dy}$$

tənliyinə gələrik. Bu tənliyi də dəyişənlərinə ayıraraq inteqrallasaq

$$\int \frac{dy}{\sqrt{2 \int f(y) dy}} = \pm x \quad (4)$$

alırıq. Burada qeyri-əşkar şəkildə iki sərbəst sabit iştirak edir. (4) düsturunu yadda saxlamaq əvəzinə (3) tənliyinin yuxarıda verilən həll üsulunu öyrənmək daha məqsədə uyğundur.

III. İndi də

$$y'' = f(y') \quad (5)$$

şəklində olan tənliyə baxaq. Onu həll etmək üçün  $y' = p$  əvəzləməsi aparaq. Bu halda  $y'' = \frac{dp}{dx}$  olduğundan verilən tənlik

$$\frac{dp}{dx} = f(p)$$

şəklinə düşər. Onu dəyişənlərinə ayıraraq inteqrallasaq

$$\int \frac{dp}{f(p)} = x$$

tənliyi alınar. Bu tənlikdən  $p = \frac{dy}{dx}$  - i tapıb təkrar inteqrallama ilə (5) tənliyinin ümumi həllini tapa bilərik.

Misal 1. Tənliyin ümumi həllini tapın:

$$y'' = x - \cos x.$$

Həlli. Verilən tənliyi inteqrallayıb

$$y' = \frac{x^2}{2} - \sin x + C_1$$

tənliyini alırıq. Onu yenidən inteqrallayaraq verilən tənliyin ümumi həllini alırıq:

$$y = \frac{x^3}{6} + \cos x + C_1x + C_2.$$

Misal 2. Tənliyin ümumi həllini tapın:  $y'' = \frac{1}{4\sqrt{y}}$ .

Həlli. Verilən tənliyi həll etmək üçün  $y' = p$  əvəzləməsi aparaq. Onda

$$y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot p.$$

Bunu tənlikdə yerinə yazsaq

$$p \frac{dp}{dy} = \frac{1}{4\sqrt{y}}$$

tənliyini alarıq. Onu dəyişənlərinə ayırıb inteqrallayaraq:

$$pdp = \frac{dy}{4\sqrt{y}}, \frac{p^2}{2} = \frac{1}{4}(2\sqrt{y} + 2C_1).$$

Buradan

$$p = \pm\sqrt{\sqrt{y} + C_1}$$

və ya

$$\frac{dy}{dx} = \pm\sqrt{\sqrt{y} + C_1}$$

tənliyinə gəlirik. Bu tənliyi də öz növbəsində dəyişənlərinə ayırıb inteqrallayaq:

$$\int \frac{dy}{\sqrt{\sqrt{y} + C_1}} = \pm(x + C_2).$$

Sol tərəfdəki inteqralı hesablamaq üçün  $\sqrt{y} + C_1 = t$  əvəzləməsi aparaq. Bu halda  $y = (t - C_1)^2$ ,  $dy = 2(t - C_1)dt$  və



$$\int \frac{dy}{\sqrt{\sqrt{y} + C_1}} = \int \frac{2(t - C_1)}{\sqrt{t}} dt = 2 \int \sqrt{t} dt - 2C_1 \int \frac{dt}{\sqrt{t}} = \frac{4}{3} t^{\frac{3}{2}} - 4C_1 t^{\frac{1}{2}} =$$

$$= \frac{4}{3} \sqrt{t}(t - 3C_1) = \frac{4}{3} \sqrt{\sqrt{y} + C_1} (\sqrt{y} - 2C_1)$$

Beləliklə,

$$x = \pm \frac{4}{3} (\sqrt{y} - 2C_1) \sqrt{\sqrt{y} + C_1} - C_2.$$

Misal 3. tənliyin ümumi həllini tapın:

$$(y'')^2 = y'.$$

Həlli.  $y' = p$  əvəzləməsi aparaq. Onda verilən tənlik

$$\left( \frac{dp}{dx} \right)^2 = p \quad \text{və ya}$$

$$\frac{dp}{dx} = \pm \sqrt{p}$$

şəklinə gələr. Onu dəyişənlərinə ayırıb inteqrallasaq

$$\int \frac{dp}{\sqrt{p}} = \pm \int dx, \quad 2\sqrt{p} = \pm(x + C_1)$$

və ya

$$p = \frac{(x + C_1)^2}{4}$$

bərabərliyini alırıq.  $p = \frac{dy}{dx}$  olduğuna görə buradan

$$\frac{dy}{dx} = \frac{(x + C_1)^2}{4}$$

tənliyi alınır. Bu tənliyi də dəyişənlərinə ayırıb inteqrallasaq alırıq:

$$y = \frac{1}{4} \int (x + C_1)^2 dx,$$

$$y = \frac{1}{12} (x + C_1)^3 + C_2$$

### **22.4.1. Riyazi fizikanın əsas tənlikləri (Dalğa, Furiye, Laplas) İlkin anlayışlar.**

Aşağıdakı ikitərtibli xüsusi törəməli diferensial tənliklər (ikidəyişənli funksiyalar üçün) riyazi fizikanın əsas tənlikləri adlanır.

#### **I. Dalğa tənliyi:**

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad (1)$$

Aşağıdakı proseslərin öyrənilməsi (1) tənliyinin tədqiqinə gətirir: telin eninə rəqsi, çubuğun uzununa rəqsi, sim-

də elektrik rəqsləri, valın burulma rəqsləri, qazların rəqsləri və s. Bu tənlik, **hiperbolik tip** tənliklərin ən sadəsidir.

## II. İstilikkeçirmə tənliyi (yaxud Furiye tənliyi)

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}. \quad (2)$$

Aşağıdakı proseslərin öyrənilməsi (2) tənliyinin tədqiqinə gətirilir. İstiliyin yayılması, məsaməli mühitdə maye və qazların süzülməsi (məsələn, neftin və qazın yeraltı qumsallıqdan süzülməsi), ehtimal nəzəriyyəsinin bəzi məsələləri və s. Bu tənlik **parabolik tip** tənliklərin ən sadəsidir.

## III. Laplas tənliyi:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0. \quad (3)$$

Aşağıdakı məsələlərin öyrənilməsi (3) tənliyinin tədqiqinə gətirir: elektrik və maqnit sahələri haqqında məsələlər qərarlaşmış (stasionar) istilik halı haqqında məsələ hidrodinamika, diffuziya məsələləri və s. Bu tənlik **eliptik tip** tənliklərin ən sadəsidir.

(1), (2) və (3) tənliklərində axtarılan  $u$  (funksiyası) iki dəyişəndən asılıdır. Funksiya çoxdəyişənli olduqda da uyğun tənliklərə baxılır. Belə ki, üç ixtiyari dəyişən üçün dalgə tənliyi, istilikkeçirmə tənliyi və Laplas tənliyi uyğun olaraq, aşağıdakı şəkilləri alır.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad (1')$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right), \quad (2')$$


$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0. \quad (3')$$

### 22.4.2. Simin rəqs tənliyinin çıxarılışı. Sərhəd və başlanğıc şərtləri. Məftildə elektrik rəqsi tənliyinin çıxarılışı.

Riyazi fizikada sim dedikdə çevik elastiki tel düşünülür. İstənilən anda simdə yaranan gərginlik onun (bir əyri kimi) toxunamı istiqamətdə olur.

Tutaq ki, uzunluğu  $l$  olan sim başlanğıc anda  $Ox$  oxu istiqamətdə  $0$ -dan  $l$ -dək yönəlmişdir. Fərz edək ki, simin ucları  $x=0$  və  $x=l$  nöqtələrində bərkidilmişdir. Simi başlanğıc vəziyyətindən çıxarıb, sonra isə özbaşına

buraxsaq, yaxud teli inhiraf etdirmədən başlanğıc anda onun nöqtələrinə müəyyən sürət versək və yaxud simi inhiraf etdirməklə bərabər başlanğıc anda onun nöqtələrinə müəyyən sürət versək,



Şəkil 1.


onda simin nöqtələri müəyyən şəkildə hərəkət edər.

Bu halda deyirlər ki, sim rəqs etməyə başlayır. Burada məsələ, simin istənilən anda şəklini və onun hər bir nöqtəsinin zamandan asılı olan hərəkət qanununu təyin etməkdən ibarətdir.

Simin nöqtələrinin başlanğıc vəziyyətdən kiçik inhirafına baxacağıq. Buna görə simin nöqtələrinin  $Ox$  oxuna perpendikulyar istiqamətdə və bir müstəvi üzərində hərəkət etdiyini qəbul edəcəyik. Bu şərt daxilində simin rəqs prosesi bir  $u(x,t)$  funksiyası vasitəsi ilə təsvir edilir. Bu funksiya  $t$  anında telin absisi  $x$  olan nöqtəsinin yerdəyişməsinin qiymətini göstərir (**Şəkil 1**).

Biz  $(x,u)$  müstəvisində simin kiçik inhirafına baxdığımız üçün fərz edəcəyik ki, simin  $\cup M_1M_2$  ünsürünün uzunluğu onun  $Ox$  oxu üzərinə proyeksiyasına bərabərdir, yəni  $\cup M_1M_2 = x_2 - x_1$ . Bundan başqa fərz edəcəyik ki, dartılma simin bütün nöqtələrində eynidir, onu  $T$  ilə işarə edək.  $MM'$  ünsürünə (**şəkil 2**) baxaq. Bu ünsürün uclarına simə toxunan istiqamətdə  $T$

qüvvələri təsir edir. Tutaq ki, toxunanlar  $Ox$  oxu ilə  $\varphi$  və  $\varphi + \Delta\varphi$  bucaqları əmələ gətirir.



**Şəkil 2**

Onda  $MM'$  ünsürünə təsir edən qüvvələrin  $Ou$  oxuna proyeksiyası  $T \sin(\varphi + \Delta\varphi) - T \sin \varphi$  ifadəsinə bərabər olar.

$\varphi$  bucağı kiçik olduğundan  $\operatorname{tg} \varphi \approx \sin \varphi$  qəbul etmək olar və biz

$$\begin{aligned} T \sin(\varphi + \Delta\varphi) - T \sin \varphi &\approx T \operatorname{tg}(\varphi + \Delta\varphi) - T \operatorname{tg} \varphi = \\ &= T \left[ \frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right] = T \frac{\partial^2 u(x + \theta \Delta x, t)}{\partial x^2} \Delta x \approx \\ &\approx T \frac{\partial^2 u(x, y)}{\partial x^2} \Delta x, \end{aligned}$$

$$0 < \theta < 1$$

alarıq (orta mötərizə daxilində olan ifadələrə Laqranj teoremi tətbiq edilmişdir).

Hərəkətin tənliyini almaq üçün, ünsürə tətbiq edilən, xarici qüvvələri ətalət qüvvəsinə bərabər etmək lazımdır. Tutaq ki,  $\rho$  simin xətti sıxlığıdır. Onda simin ünsürünün kütləsi  $\rho \Delta x$  olar. Ünsürün təcili  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$  kəmiyyətinə bərabərdir. Dalamber prinsipinə əsasən

$$\rho \Delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x$$

alarıq.  $\Delta x$  - ə ixtisar edib və  $\frac{T}{\rho} = a^2$  qəbul etsək, hərəkətin tənliyini

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (1)$$

şəklində alırıq. Bu isə **dalğa tənliyi** və ya simin rəqs tənliyidir. Simin hərəkət tənliyini tam təyin etmək üçün təkcə (1) tənliyi kifayət deyildir. Məchul funksiya  $u(x,t)$  əlavə olaraq **sərhəd şərtlərini və başlanğıc şərtlərini** ödəməlidir. Sərhəd şərtləri simin uclarının ( $x=0$  və  $x=l$ ) necə hərəkət etməsini, başlanğıc şərtləri isə başlanğıc anda ( $t=0$ ) simin vəziyyətini göstərir.

Tutaq ki, məsələn, bizim fərz etdiyimiz kimi, simin ucları ( $x=0$  və  $x=l$ ) tərpənməzdir. Onda ixtiyari  $t$  üçün

$$u(0, t)=0 \quad (2')$$

$$u(l, t)=0 \quad (2'')$$

şərtləri ödənməlidir. Bu bərabərsizliklər bizim məsələ üçün **sərhəd şərtləridir**.

Başlanğıc anda ( $t=0$ ) sim, bizim ona verdiyimiz müəyyən formaya malikdir. Tutaq ki, bu forma  $f(x)$  funksiyası vasitəsilə təyin edilir. Beləliklə,

$$u(x, 0)=u|_{t=0} = f(x) \quad (3')$$

olmalıdır. Bundan başqa, başlanğıc anda simin hər bir nöqtəsində  $\varphi(x)$  funksiyası ilə təyin edilən sürət də verilməlidir. Beləliklə,

$$\frac{\partial u}{\partial t}|_{t=0} = \varphi(x) \quad (3'')$$

olmalıdır. (3') və (3'') şərtləri **başlanğıc şərtləridir**.

**Qeyd** .Xüsusi halda,  $f(x)=0$  və  $\varphi(x)=0$  ola bilər.  $f(x)=0$  və  $\varphi(x)=0$  olarsa, sim sükunətdə olacaqdır, deməli,  $u(x, t)=0$ .

Yuxarıda qeyd etdik ki, məftildə elektrik rəqsi məsələsi də (1) tənliyinə gətirilir. Bunu isbat edək. Tutaq ki, məftildə elektrik cərəyanı  $i(x, t)$  və gərginlik  $v(x, t)$  ilə xarakterizə olunur;  $i$  və  $v$  funksiyaları məftil üzərində götürülmüş nöqtənin  $x$  koordinatından və  $t$  zamanından asılıdır. Məftilin  $\Delta x$  ünsüründə gərginliyin düşməsi

$v(x, t) - v(x + \Delta x, t) \approx -\frac{\partial v}{\partial x} \Delta x$  olur. Bu kəmiyyət  $iR\Delta x$  hasilinə

bərabər olan omik gərginlik və  $\frac{\partial i}{\partial t} L\Delta x$  hasilinə

bərabər olan induktiv gərginliyin cəminə bərabərdir. Beləliklə,

$$-\frac{\partial v}{\partial x} \Delta x = iR\Delta x + \frac{\partial i}{\partial t} L\Delta x, \quad (4)$$

Burada  $R$  və  $L$  – məftilin vahid uzunluğuna düşən müqavimət və öz-özünə induksiya əmsalıdır. Cərəyan,  $v$ -nin artmasının əks istiqamətində axdığı üçün işarə mənfi götürülmüşdür.  $\Delta x$  -ə ixtisar edərək

$$\frac{\partial v}{\partial x} + iR + L\frac{\partial i}{\partial t} = 0 \quad (5)$$

alırıq.



Digər tərəfdən,  $\Delta t$  zaman fasiləsində  $\Delta x$  ünsüründən çıxan və ona daxil olan cərəyanlar fərqi

$$i(x, t) - i(x + \Delta x, t) \approx -\frac{\partial i}{\partial x} \Delta x \Delta t$$

ifadəsinə bərabərdir. Bu fərq ünsürün  $C \Delta x \frac{\partial v}{\partial t} \Delta t$  yükü ilə yüklənməsinə və məftilin yan səthindən itkiyə sərf olunur. Çünki məftilin izolyatoru ideal izolyator deyil, bu itki  $A v \Delta x \Delta t$  kəmiyyətinə bərabərdir (burada  $A$  itki əmsəlidir). Cərəyanlar fərqi bu göstərilən kəmiyyətlərin cəminə bərabər edib və  $\Delta x \Delta t$  hasilinə ixtisar etsək,

$$\frac{\partial i}{\partial x} + C \frac{\partial v}{\partial t} + A v = 0 \quad (6)$$

tənliyini alırıq. (5) və (6) tənliklərinə **teleqraf tənlikləri** demək qəbul olunmuşdur.

(5) və (6) tənlikləri sistemindən elə bir tənlik almaq olar ki, bura yalnız  $i(x, t)$  funksiyası daxil olar və elə bir digər tənlik almaq olar ki, ona ikinci məchul funksiya olan  $v(x, t)$  daxil olar. (6) tənliyinin hər tərəfini  $x$  -ə nəzərən differensiallayaq; (5) tənliyinin hədlərini isə  $t$  -ə nəzərən differensiallayıb  $C$  -ə vuraq. Alınan bərabərlikləri tərəf-tərəfə çıxaraq:

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} + A \frac{\partial v}{\partial x} - CR \frac{\partial i}{\partial x} - CL \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = 0.$$

(5) tənliyindən  $\frac{\partial v}{\partial x}$  -in ifadəsini bu tənlikdə yerinə yazsaq,

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} + A(-iR - L \frac{\partial i}{\partial t}) - CR \frac{\partial i}{\partial x} - CL \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} = 0$$

və ya

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = CL \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + (CR + AL) \frac{\partial i}{\partial t} + ARi \quad (7)$$

alırıq.  $v(x,t)$  -ni tapmaq üçün də oxşar qayda ilə tənlik alınır:

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = CL \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + (CR + AL) \frac{\partial v}{\partial t} + ARv. \quad (8)$$

Izolyatordan itkini və müqaviməti nəzərə almamaq mümkün olarsa ( $A=0$  və  $R=0$  olarsa), (7) və (8) tənlikləri dalğa tənliklərinə çevrilər:


$$a^2 \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 i}{\partial t^2}, \quad a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial t^2},$$

burada  $a^2 = \frac{1}{CL}$  qəbul edilmişdir. Fiziki şərtlərdən istifadə etməklə məsələnin sərhəd və başlanğıc şərtlərini göstərmək olur.

### 22.4.3. Çubuqda istiliyin yayılma tənliyi. I sərhəd məsələsi.

Uzunluğu  $l$  olan bircinsli çubuğa baxaq. Fərz edəcəyik ki, çubuğun eninə kəsiyinin ixtiyari nöqtəsində temperatur eynidir və onun yan səthindən istilik nüfuz edə bilməz. Çubuqda istiliyin yayılma prosesini öyrənək.

$Ox$  oxunu elə götürək ki, çubuğun bir ucu  $x=0$  nöqtəsi ilə, digər ucu isə  $x=l$  nöqtəsi ilə üst-üstə düşsün (şəkil 1). Tutaq ki,  $u(x, t)$  funksiyası çubuğun  $x$  absisli kəsiyinin  $t$  anındakı temperaturunu göstərir.



Şəkil 1

Təcrübi üsulla müəyyən edilmişdir ki, istiliyin yayılma sürəti, yəni zaman vahidində absisi  $x$  olan kəsikdən keçən istiliyin miqdarı

$$q = -k \frac{\partial u}{\partial x} S \quad (1)$$

düsturu ilə təyin edilir.; burada  $S$  –baxılan çubuq kəsiyinin sahəsi,  $k$  isə istilikkeçirmə əmsəlidir.

Absisləri  $x_1$  və  $x_2$  olan kəsiklərin arasında qalan çubuq ünsürünə baxaq. Absisi  $x_1$  olan kəsikdən  $\Delta t$  zamanında keçən istiliyin miqdarı aşağıdakı düsturla təyin edilir:

$$\Delta Q_1 = -k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=x_1} S \Delta t . \quad (2)$$

$x_2$  absisli kəsikdən keçən istilik miqdarı

$$\Delta Q_2 = -k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=x_2} S \Delta t \quad (3)$$

olur.  $\Delta t$  zamanında çubuq ünsürü daxilində qalıq istilik miqdarı, yəni  $\Delta Q_1 - \Delta Q_2$  aşağıdakı düsturla təyin edilir:

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 - \Delta Q_2 &= \left[ -k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=x_1} S \Delta t \right] - \left[ -k \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=x_2} S \Delta t \right] \approx \\ &\approx k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta x S \Delta t \end{aligned} \quad (4)$$

(burada  $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=x_1} - \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=x_2}$  fərqiñə Laqranj düsturunu tətbiq etdik).  $\Delta t$  zaman fasiləsində əmələ gəlmiş bu istilik artımı çubuq ünsürü temperaturunun  $\Delta u$  qədər yüksəlməsinə sərf edilmişdir.

$$\Delta Q_1 - \Delta Q_2 = c \rho \Delta x S \Delta u$$

yaxud

$$\Delta Q_1 - \Delta Q_2 \approx c\rho\Delta xS \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t, \quad (5)$$

burada  $c$  – çubuq maddəsinin istilik tutumu,  $\rho$  – çubuq maddəsinin sıxlığıdır ( $\rho\Delta xS$  çubuq üsürünün kütləsidir).

Eyni istilik miqdarı olan  $\Delta Q_1 - \Delta Q_2$  fərqinin (4) və (5) ifadələrinin bir-birinə bərabər götürsək,

$$k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \Delta xS\Delta t = c\rho\Delta xS \frac{\partial u}{\partial t} \Delta t$$

yaxud

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{k}{c\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

alırıq, burada  $\frac{k}{c\rho} = a^2$  qəbul edib, son nəticə olaraq

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad (6)$$

alırıq. Bu isə bircinsli çubuqda **istiliyin yayılma tənliyidir (istilikkeçirmə tənliyidir)**.

(6) tənliyi həllinin tamamilə təyin olunması üçün  $u(x, t)$  funksiyası məsələnin fiziki şərtlərinə uyğun olan hüdud şərtlərini ödəməlidir. (6) tənliyinin həlli üçün verilən şərt-

lär müxtəlif ola bilər. **Birinci sərhəd məsələsi** adlanan məsələyə uyğun şərtlər aşağıdakılardır:

$$u(x,0) = \varphi(x), \quad 0 \leq x \leq L, \quad (7)$$

$$u(0,t) = \psi_1(t), \quad 0 \leq t \leq T \quad (8)$$

$$u(l,t) = \psi_2(t), \quad 0 \leq t \leq T \quad (9)$$

(7) şərtinin (**başlangıç şərti**) fiziki mənası ondan ibarətdir ki,  $t=0$  olduqda çubuğun müxtəlif kəsiklərində temperatur verilmiş  $\varphi(x)$ -ə bərabərdir. (8) və (9) şərtləri (**sərhəd şərtləri**) o deməkdir ki, çubuğun  $x=0$  və  $x=l$  uclarında temperatur uyğun olaraq  $\psi_1(t)$  və  $\psi_2(t)$ -ə bərabərdir.

İsbat edilir ki, (6) tənliyinin  $0 \leq x \leq l$ ,  $0 \leq t \leq T$  oblastında (7), (8), (9) şərtlərini ödəyən yeganə həlli vardır.

## XXIII FƏSİL. ƏDƏDİ SIRALAR

### 23.1.1. Ədədi sıra haqqında anlayış

Tutaq ki,

$\mathbf{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots}$   
sonsuz ədədi ardıcılığı verilmişdir. Bu ardıcılığın hədlərindən düzəldilmiş

$$\mathbf{a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots} \quad (1)$$

və ya

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{a_n} \quad (2)$$

Ifadəsi **ədədi sıra** adlanır.  $\mathbf{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots}$  ədədləri sıranın hədləri,  $\mathbf{a_1}$  ədədi sıranın birinci həddi,  $\mathbf{a_2}$  ədədi ikinci həddi,  $\mathbf{a_n}$  isə  $\mathbf{n}$ -ci həddi adlanır.

(1) sırasının hədlərindən aşağıdakı kimi cəmlər düzəldək:

$$\begin{aligned} \mathbf{S_1} &= \mathbf{a_1} \\ \mathbf{S_2} &= \mathbf{a_1 + a_2} \\ \mathbf{S_3} &= \mathbf{a_1 + a_2 + a_3} \\ &\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ \mathbf{S_n} &= \mathbf{a_1 + a_2 + \dots + a_n}. \end{aligned}$$

Bu cəmlərə ədədi sıranın **xüsusi cəmləri** deyilir.

$$\mathbf{S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n} \quad (3)$$

cəmi (1) sırasının  $\mathbf{n}$ -ci xüsusi cəmi adlanır. (1) sırasının xüsusi cəmlər ardıcılığını düzəldək:

$$\mathbf{S_1, S_2, \dots, S_n, \dots} \quad (4)$$

**Tərif.** (1) sırasının xüsusi cəmlər ardıcılığının sonlu

$$\mathbf{\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S}$$

limiti varsa, onda bu sıraya **yığılan sıra**, S-ə isə həmin sıranın **cəmi** deyilir.

S ədəddinin (1) sırasının cəmi olması faktı belə yazılır:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S. \quad (5)$$

Əgər sıranın xüsusi cəmlər ardıcılığı dağılırsa, onda belə sıra **dağılan sıra** adlanır.

**Misal 1.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$$

sırasının yığılan və ya dağılan olmasını tədqiq edək.

**Həlli.**  $q=1$  olduqda verilən sıra dağılır. Belə ki, bu sıranın xüsusi cəmlər ardıcılığı

$$S_n = n, \quad n \in \mathbf{N}$$

dağılan ardıcılıqdır.  $q=-1$  olduqda isə

$$S_1 = -1, S_2 = 0, S_3 = -1, S_4 = 0, \dots$$

olduğuna görə  $\{s_n\}$  ardıcılığı və deməli, verilən sıra dağılır.

$q \neq 1$  olduqda verilən sıranın ilk  $n$  həddinin cəmi

$$S_n = \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

1) Əgər  $|q| < 1$  olarsa,  $q^n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$ -da, onda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{1 - q} - \frac{1}{1 - q} q^n \right) = \frac{1}{1 - q}.$$

Deməli,  $|q| < 1$  olduqda

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$$



sırası yığılır.

2)  $|q| > 1$  olduqda  $q^n \rightarrow \infty, n \rightarrow \infty$ -da. Onda  $S_n$  xüsusi cəmi sonlu limitə malik deyil, yəni

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$$

sırası dağılır.

### 23.1.2. Yığılan ədədi sıralar və onların sadə xassələri

Yığılan ədədi sıraların aşağıdakı xassələri vardır:

1°. (1) sırası yığılırsa, istənilən  $C$  ədədi üçün

$$\sum_{k=1}^{\infty} C a_k$$

sırası da yığılır və

$$\sum_{k=1}^{\infty} C a_k = C \sum_{k=1}^{\infty} a_k. \quad (6)$$

**İsbatı.** (1) sırasının xüsusi cəmi  $S_n$  –dirsə, onda

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n C a_k = C \sum_{k=1}^n a_k = C S_n$$

olar və buradan

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (C S_n) = C \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = C S$$

alınır. Yəni (1) düsturu doğrudur.

2°. Yəni (6) doğrudur.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{və} \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

sıraları yığılırsa, onda bu sıraların cəmi və fərqi də yığılan sıradır, və

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{a}_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{b}_n = \sum_{n=1}^{\infty} (\mathbf{a}_n \pm \mathbf{b}_n) \quad (7)$$

bərabərliyi doğrudur.

**İsbatı.**  $\sum \mathbf{a}_n$  və  $\sum \mathbf{b}_n$  sıralarının xüsusi cəmlərini uyğun olaraq  $A_n$  və  $B_n$  onların cəmlərini isə  $A$  və  $B$  ilə işarə edək.

(7) bərabərliyinin sağ tərəfindəki sıranın xüsusi cəminin  $\sigma_n = A_n + B_n$  sonlu limiti var və bu limit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n + \lim_{n \rightarrow \infty} B_n = A + B$$

ədədinə bərabərdir. Yəni (7) sırası yığılıdır.

**3°.** Yığılan (1) sırasının hədlərini, düzülüş sırasını pozmadan, istənilən şəkildə qruplaşdırdıqda alınan sıra da yığılıdır və onun cəmi verilmiş (1) sırasının cəminə bərabərdir.

Verilmiş (1) sırasının birinci  $n$  sayda həddini atdıqdan sonra alınan

$$\mathbf{a}_{n+1} + \mathbf{a}_{n+2} + \dots \quad (9)$$

sırasına (1) sırasının  **$n$ -ci qalıq sırası** və ya  **$n$ -ci qalığı** deyilir.

(9) sırasının cəmini  $r_n$  ilə işarə edək:

$$\mathbf{r}_n = \mathbf{a}_{n+1} + \mathbf{a}_{n+2} + \dots + \mathbf{a}_{n+m} + \dots \quad (10)$$

Onda alınır ki,

$$\mathbf{S} - \mathbf{S}_n = \mathbf{r}_n \quad (11)$$

Deməli, (1) sırasının  $s$  ədədinə yığılan olması üçün

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{r}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbf{S} - \mathbf{S}_n) = \mathbf{0}$$

münasibəti ödənilməlidir.

**4.** (1) və (9) sıraları eyni zamanda ya yığılıdır, ya

da dağılındır.

**İsbati.** (1) və (9) sıralarının xüsusi cəmlərini uyğun olaraq  $S_n$  və  $\sigma_m$  ilə işarə edək:

$$\sigma_m = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+m}.$$

Onda

$$S_{n+m} - S_n = \sigma_m \text{ və ya } S_{n+m} = S_n + \sigma_m \quad (12)$$

bərabərliyi doğrudur.

Tutaq ki, (1) sırası yığılındır. Onda

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = S$$

limiti və buna görə də

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{n+m} = S$$

limiti sonlu olar. Buna görə (12) bərabərliyindən

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m = \lim_{m \rightarrow \infty} (S_{n+m} - S_n) = S - S_n$$

münasibəti alınır. Bu da (9) sırasının yığılan və cəminin  $S - S_n$  olduğunu ifadə edir.

Fərz edək ki, (9) sırası yığılındır:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m = r_n.$$

Onda (12) bərabərliyindən

$$\lim_{m \rightarrow \infty} S_{n+m} = \lim_{m \rightarrow \infty} (S_n + \sigma_m) = S_n + r_n$$

alınır ki, bu da (1) sırasının yığılan olduğunu göstərir.

Deməli, (1) və (9) sıralarının hər ikisi eyni zamanda ya yığılır, ya da dağılır.

Beləliklə, belə bir nəticə alırıq.

**Nəticə.** Verilmiş sıraya sonlu sayda hədd əlavə etmək və ya sonlu sayda həddini atmaq, həmin sıranın yığılan və ya dağılan olmasına təsir etmir.

**5°.** Yığılan sıranın ümumi həddinin limiti sıfıra bərabərdir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad (13)$$

**İsbatı.**  $a_n = S_n - S_{n-1}$  olduğundan və (1) sırasının yığılan olmasından

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

alırıq.

Qeyd etmək lazımdır ki, sıranın ümumi həddinin limitinin sıfıra bərabər olması sıranın yığılan olması üçün zəruri şərtidir, kafi şərt deyildir. Məsələn, **harmonik sıra** adlanan

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots \quad (14)$$

sırasının ümumi həddinin limiti sıfıra bərabərdir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

lakin bu sıra dağılındır.

**İsbatı.** Doğrudan da istənilən  $n \geq 1$  ədədi üçün

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} - \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S - S = 0.$$

Bu bərabərlik, aşağıdakı bərabərsizliklə

$$S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} > n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$$

ziddiyyət təşkil edir. Odur ki, harmonik sıra dağılan sıradır.

### 23.2.1. Müsbət hədlı sıraların yığılma əlamətləri

Hədləri müsbət ədədlərdən ibarət olan sıraya baxaq:

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots \quad (1)$$

**Teorem 1.** (1) sırasının yığılan olması üçün bu sıranın xüsusi cəmlər ardıcılığının məhdud olması zəruri və kafi şərtidir.

**Zərurilik.** Tutaq ki, müsbət hədlı (1) sırası yığılandır:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

Yığılan ardıcılıq isə məhduddur.

Onda

$$S_n \leq M \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (2)$$

münasibətinalırıq.

**Kafilik.** (1) sırasının hədləri müsbət olduğundan ( $a_{n+1} \geq 0, n \in \mathbb{N}$ )

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n.$$

Deməli, verilmiş sıranın xüsusi cəmləri ardıcılığı azalmayan ardıcılıqdır. Monoton artan və yuxarıdan məhdud ardıcılıq yığılandır. Buradan (1) sırasının yığılan olması alınır.

**Misal 1.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

sırasının yığılan və dağılan olmasını araşdırın.

**Həlli.** Tutaq ki,  $\alpha > 1$ . Onda istənilən  $k \geq 2$  üçün

$$\begin{aligned} S_k &= \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^\alpha} = 1 + \sum_{n=2}^k \frac{1}{n^\alpha} \int_{n-1}^n dx < 1 + \sum_{n=2}^k \int_{n-1}^n \frac{dx}{x^\alpha} = \\ &= 1 + \int_1^k \frac{dx}{x^\alpha} = 1 + \left. \frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right|_1^k < 1 + \frac{1}{\alpha-1} = \frac{\alpha}{\alpha-1} \end{aligned}$$

Deməli,  $\alpha > 1$  olduqda müsbət hədlı

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\alpha}}$$

sırasının xüsusi cəmlər ardıcılığı məhduddur. Onda teorem 1-ə görə həmin sıra yığılır.

İndi tutaq ki,  $\alpha \leq 1$ . Onda

$$S_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^{\alpha}} \int_n^{n+1} dx > \sum_{n=1}^k \int_n^{n+1} \frac{dx}{x^{\alpha}} = \int_1^{k+1} \frac{dx}{x^{\alpha}}.$$

Buradan alırıq ki,

$$\begin{cases} \ln(k+1), \alpha = 1 \text{ olduqda,} \\ S_k > \frac{(k+1)^{1-\alpha} - 1}{1-\alpha}, \alpha < 1 \text{ olduqda.} \end{cases}$$

Onda  $\alpha \leq 1$  olduqda,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_k = +\infty$$

başqa sözlə, bu halda sıra dağılır.

**Teorem 2.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ v} \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

sıralarının müəyyən bir  $N$  nömrəsindən başlayaraq bütün hədləri üçün

$$0 \leq a_n \leq b_n, \quad n \geq N + 1 \quad (3)$$

bərabərsizlikləri ödənersə,

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

sırasının yığılmasından

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{a}_n$$

sırasının yığılması,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{a}_n$$

sırasının dağılmasından isə

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{b}_n$$

sırasının dağılması alınır.

**İsbatı:** Tutaq ki,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{b}_n = \mathbf{B}.$$

Bu halda (3) bərabərsizliklərindən istənilən  $k \geq N$  üçün

$$\sum_{n=N}^k \mathbf{a}_n \leq \sum_{n=N}^k \mathbf{b}_n \leq \sum_{n=N}^{\infty} \mathbf{b}_n = \mathbf{B}$$

bərabərsizlikləri alınır. Bu o deməkdir ki, mənfi olmayan

$$\sum_{n=N}^{\infty} \mathbf{a}_n$$

sırasının xüsusi cəmlər ardıcılığı məhduddur. Onda teorem 1-ə görə

$$\sum_{n=N}^{\infty} \mathbf{a}_n$$

sırası yığılır. Buradan isə

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırasının yığılması alınır(xassə 4°).

Əgər

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası dağılırsa, onda

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

sırası yığıla bilməz, çünki onun yığılmasından

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırasının da yığılması alınardı.

**Misal 2.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{2^n}$$

sırasının yığılan və ya dağılan olmasını araşdırın.

**Həlli.** İstənilən  $n \in \mathbb{N}$  üçün

$$c < \frac{|\sin n|}{2^n} < \frac{1}{2^n}$$

bərabərsizlikləri doğrudur. Digər tərəfdən

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

sırası yığılan sıradır . Onda xassə 4-ə görə



$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n|}{2^n}$$

sırası da yığılan sıradır.

**Misal 3.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

sırasının yığılan və ya dağılan olmasını araşdırın.

**Həlli.** Bütün  $n \geq 3$  qiymətləri üçün

$$0 < \frac{1}{\sqrt{n}} < \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

bərabərsizlikləri ödəyir. Bundan başqa

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

sırası dağılır . Bu halda yığılan (dağılan) ədədi sıralar və onların xassələrinə görə

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$$

sırası da dağılır.

### 23.2.2. Dəlamber və Koşi əlamətləri. Müqayisə əlaməti

**Lemma 1.** Müsbət həddli

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırasının bütün hədləri üçün

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1, n \in \mathbb{N} \quad (1)$$

bərabərsizliklərini ödəyən  $q$  ədədi varsa, həmin sıra yığılır.  $n$ -in bütün qiymətləri üçün

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1, \quad n \in \mathbb{N} \quad (2)$$

bərabərsizlikləri ödənersə, bu sıra dağılır.

**İsbatı:**(1) bərabərsizliklərindən

$$a_{n+1} \leq qa_n \leq q^2 a_{n-1} \leq \dots \leq a_1 q^n$$

bərabərsizlikləri alınır. Buradan isə

$$a_n \leq a_1 q^{n-1}, \quad n \in \mathbb{N}$$

bərabərsizlikləri alınır.  $0 < q < 1$  olduğu üçün

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \frac{a_1}{q} \sum_{n=1}^{\infty} q^n$$

sırası yığılır. Onda, müsbət hədlı sıraların yığılması (dağılması) haqqında teoremə görə

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası da yığılır.

Tutaq ki, (2) bərabərsizlikləri ödəyir. Onda

$$a_{n+1} \geq a_n \geq a_{n-1} \geq \dots > a_1$$

Deməli, hər bir  $n \in \mathbb{N}$  üçün  $a_n \geq a_1 > 0$ . Buradan alırıq ki, sıranın hədləri ardıcılığı sıfıra yaxınlaşmır, başqa sözlə, sıranın yığılması üçün zəruri şərt ödənmir, yəni sıra dağılır.

**Teorem 1 (Dəlamber əlaməti).** Tutaq ki, müsbət hədlı sıranın hədləri üçün

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q \quad (3)$$

şerti ödənilir. Bu halda  $q < 1$  olduqda sıra yığılır,  $q > 1$  olduqda isə sıra dağılır.

**İsbatı** :Limitin tərifinə görə istənilən müsbət  $\varepsilon$  ədədi verildikdə  $\left\{\frac{a_{n+1}}{a_n}\right\}$  ardıcılığının müəyyən  $N$  nömrəsindən sonra gələn bütün hədləri üçün

$$q - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \varepsilon$$

bərabərsizlikləri doğrudur.  $q < 1$  olduqda müsbət  $\varepsilon$  ədədini elə seçək ki,  $q + \varepsilon < 1$  olsun. Onda lemma 1-ə görə

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

sırası yığılır. Bu sıranın yığılmasından öz növbəsində

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırasının yığılması çıxır.

$q > 1$  olduqda həmin ikiqat bərabərsizlikdə  $\varepsilon - u$  elə seçək ki,  $q - \varepsilon > 1$  olsun. Onda

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1, \quad n > N$$

bərabərsizlikləri doğru olur. Bu halda lemma 1-ə görə

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

sırası dağılır. Bu sıranın dağılmasından alarıq ki,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası da dağılır.

**Qeyd.** Əgər

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

Limiti yoxdursa və ya vahidə bərabədirsə, bu halda Dalamber əlaməti

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

müsbət həddli sırasının yığılan və ya dağılan olması sualına cavab vermir.

**Misal 3.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

sırasının yığılan və ya dağılan olmasını araşdırın.

**Həlli.**

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2 3^n}{3^{n+1} n^2} \\ &= \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \right) = \frac{1}{3} < 1. \end{aligned}$$

Dalamber əlamətinə görə

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$$

sırası yığılır.

**Misal 4.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$$

sırasının yığılan və ya dağılan olmasını araşdırın.

**Həlli.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{2^n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2}} = 2 > 1.$$

Dalamber əlamətinə görə

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$$

sırası dağılır.

**Lemma 2.** Müsbət həddli sıranın müəyyən bir  $N$  nömrəsindən başlayaraq bütün hədləri üçün

$$\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1 \quad (5)$$

bərabərsizliklərini ödəyən  $q$  ədədi varsa, həmin sıra dağılır.

Əgər

$$\sqrt[n]{a} \geq 1, \quad n \geq N$$

bərabərsizlikləri ödənirsə, onda (1) sırası dağılır.

**İsbat:** Əgər bütün  $n \geq N$  qiymətləri üçün  $\sqrt[n]{a} \leq q < 1$  bərabərsizlikləri ödənirsə, onda

$$a_n \leq q^n, \quad n \geq N.$$

$0 \leq q < 1$  olduğu üçün

$$\sum_{n=1}^{\infty} q^n$$

sırası yığılır.

Onda

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası da dağılır.

İndi fərz edək ki, bütün  $n \geq N$  qiymətləri üçün  $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ . Onda bütün  $n \geq N$  qiymətləri üçün  $a_n \geq$

1 bərabərsizlikləri doğrudur. Bu halda sıranın yığılması üçün zəruri şərt ödənmədiyindən

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası dağılır.

**Teorem 2 (Koşi əlaməti).** Tutaq ki, müsbət hədlili (1) sırasının hədləri üçün

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = q$$

şərti ödənilir. Bu halda  $q < 1$  olduqda sıra yığılır,  $q > 1$  olduqda isə sıra dağılır.

**İsbatı:** Limitin tərifinə görə istənilən müsbət  $\varepsilon$  ədədi verildikdə  $\{\sqrt[n]{a_n}\}$  ardıcılığının müəyyən bir  $N = N(\varepsilon)$  nömrəsindən sonra gələn bütün hədləri üçün

$$q - \varepsilon < \sqrt[n]{a_n} < q + \varepsilon \quad (7)$$

şərti ödənilir.

$q < 1$  olduqda müsbət  $\varepsilon$  ədədini elə seçək ki,  $q + \varepsilon < 1$  olsun. Onda lemma 2-yə görə

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası yığılır.

$q > 1$  olduqda (1) ikiqat bərabərsizliyində müsbət  $\varepsilon$  ədədini elə seçək ki,  $q - \varepsilon > 1$  olsun. Bu halda lemma 2-yə görə

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası dağılır.

**Misal 5.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$

sirasının yığılan və ya dağılan olmasını araşdırın.

**Həlli.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Koşi əlamətinə görə

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$$

sırası dağılır.

**Misal 6.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

sirasının yığılan və ya dağılan olmasını araşdırın.

**Həlli.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e > 1.$$

Koşi əlamətinə görə

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$$

sırası dağılır.

**Qeyd.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$$

limitinin olmadığı və ya vahidə bərabər olduğu halda Koşi əlaməti (1) sırasının yığılan və ya dağılan olması haqqında suala cavab vermir.

### 23.3.1. İşarəsini növbə ilə dəyişən sıralar

Müsbəthədli sıraların yığılması haqqında isbat etdiyimiz təkliflər və yığılma əlamətləri bütün hədləri müsbət olmayan ədədlər olan

$$U_1 + U_2 + \dots + U_n + \dots \quad (1)$$

sırasının ( $U_n \leq 0, n=1,2,\dots$ ) yığılmasını tədqiq etmək üçün də tətbiq olunur. Hədləri müxtəlif işarəli həqiqi ədədlər olan sıraların yığılmasına isə həmin yığılma əlamətlərini bilavasitə tətbiq etmək olmaz. Belə sıraların yığılması müxtəlif üsullarla tədqiq olunur.

Hədləri müxtəlif işarəli ədədlər olan sıraların ən sadə növü işarəsini növbə ilə dəyişən sıralardır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} U_n \quad (u_n > 0 \quad n=1,2,\dots) \quad (2)$$

şəklində olan sıraya işarəsini növbə ilə dəyişən sıra deyilir. İşarəsini növbə ilə dəyişən sıranın hədləri növbə ilə müsbət və mənfi ədədlərdir. Belə sıralar haqqında aşağıdakı teoremi isbat etmək olar.

**Teorem (Leybnis). İşarəsini növbə ilə dəyişən (2) sırası üçün**

$$U_n \geq U_{n+1} > 0 \quad (n=1,2,\dots) \quad (3)$$

və

$$\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = 0 \quad (4)$$



**şərtləri ödənildikdə həmin sıra yığılandır.**

**İsbatı.** (2) sırasının cüt indeksli xüsusi cəmlərini

$$S_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} (-1)^{k-1} U_k = (U_1 - U_2) + (U_3 - U_4) + \dots + (U_{2n-1} - U_{2n})$$

kim yazaq.  $U_k - U_{k+1}$  ( $k=1,2,\dots$ ) fərqləri (3) şərtinə görə mənfi olmayan ədədlərdir. Buna görə də

$$S_{2(n+1)} = S_{2n} + (U_{2n+1} - U_{2n+2}) \geq S_{2n}$$

olar, yəni (2) sırasının cüt indeksli xüsusi cəmlərinin  $\{S_{2n}\}$  ardıcılığı monoton artandır. Bundan başqa

$$S_{2n} = U_1 - (U_2 - U_3) - \dots - (U_{2n-2} - U_{2n-1}) - U_{2n}$$

bərabərliyi ( $U_k - U_{k+1} \geq 0$ ,  $U_{2n} > 0$ ) göstərir ki,  $S_{2n} < U_1$  ( $n=1,2,\dots$ ) bərabərsizliyi doğrudur.

Deməli,  $\{S_{2n}\}$  monoton artan (azalmayan) və yuxarıdan məhdud ardıcılıqdır. Belə ardıcılığın isə sonlu limiti var :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S \quad (5)$$

$S_{2n+1} = S_{2n} + U_{2n+1}$  bərabərliyindən və (4) şərtinə görə  $\lim_{n \rightarrow \infty} U_{2n+1} = 0$  olmasından aydındır ki, (2) sırasının tək indeksli xüsusi cəmləri ardıcılığı da həmin  $S$  ədədinə yığılır:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = S \quad (6)$$

(5) və (6) bərabərlikləri (2) sırasının xüsusi cəmlərinin  $\{S_n\}$  ardıcılığının yığılan olduğunu göstərir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

Teoremin isbatından aydındır ki, (2) sırasının cüt indeksli xüsusi cəmləri ardıcılığı azalmayan, tək indeksli

$S_{2n+1}=U_1-(U_2-U_3)-\dots-(U_{2n}-U_{2n+1})=S_{2n-1}-(U_{2n}-U_{2n+1})$   
 xüsusi cəmləri ardıcılığı isə artmayandır. Onda (5) və (6)  
 bərabərliklərinə əsasən istənilən  $n$  üçün

$$S_{2n} \leq S \leq S_{2n-1} \quad (7)$$

olar. Buradan

$$0 \leq S_{2n-1} - S \leq S_{2n-1} - S_{2n} = U_{2n}$$

və

$$0 \leq S - S_{2n} \leq S_{2n+1} - S_{2n} = U_{2n+1}$$

bərabərsizlikləri alınır. Deməli, istənilən  $n$  üçün

$$|S_n - S| \leq U_{n+1} \quad (8)$$

bərabərsizliyi doğrudur.

**Nəticə.** İşarəsini növbə ilə dəyişən (2) sırasının qa-  
 lığı üçün

$$|R_n| = |S - S_n| \leq U_{n+1} \quad (9)$$

bərabərsizliyi doğrudur.

**Misal.** İşarəsini növbə ilə dəyişən

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots + (-1)^{m-1} \frac{1}{n} + \dots, \quad (10)$$

sırası üçün teoremin şərtləri, yəni

$$\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

münasibətləri ödənildiyindən həmin sıra yığılandır.

### 23.3.2. Mütləq və şərti yığılan sıralar. Leybnis əlaməti

**Tərif 1.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

sırası yığılırsa,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası **mütləq yığılan sıra** adlanır.

**Teorem 1.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

sırası yığılırsa,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası da yığılır.

**İsbatı :** Hədləri

$$p_n = \frac{|a_n| + a_n}{2} \quad v\theta \quad q_n = \frac{|a_n| - a_n}{2}$$

şəklində olan

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n \quad v\theta \quad \sum_{n=1}^{\infty} q_n$$

sıralarına baxaq. Bu sıraların bütün hədləri üçün

$$0 \leq p_n \leq |a_n| \quad v\theta \quad 0 \leq q_n \leq |a_n|$$

bərabərsizlikləri doğrudur

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

Sırasının yığılmasından və bərabərsizliklərdən

$$\sum_{n=1}^{\infty} p_n \quad v\theta \quad \sum_{n=1}^{\infty} q_n$$

sıralarının yığılması alınır. Digər tərəfdən,  $a_n = p_n - q_n$  olduğu üçün

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

sırası yığılır.

Bu teorem göstərir ki, sıranın mütləq yığılmasından onun adi yığılması alınır.

**Teorem 2 (Leybnis əlaməti).** Hədləri müsbət ədədlər olan və monoton azalan  $\{a_n\}$  ardıcılığının limiti sıfıra bərabədirsə,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n \quad (1)$$

sırası yığılır.

**İsbatı:**

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

sırasının cüt nömrəli xüsusi cəmləri üçün

$$\begin{aligned} S_{2k} &= a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + a_{2k-1} - a_{2k} = \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n}) \end{aligned}$$

bərabərliyi doğrudur.  $a_{2n-1} - a_{2n} \geq 0, n = 1, 2, \dots$  olduğu üçün buradan alırıq ki,  $S_{2k}, k \in \mathbf{N}$  ardıcılığı monoton azalmayan ardıcılıqdır. Digər tərəfdən istənilən  $k \in \mathbf{N}$  üçün

$$S_{2k} = a_1 - (a_2 - a_3) - (a_4 - a_5) - \dots - (a_{2k-2} - a_{2k-1}) - a_{2k} \leq a_1 \quad (2)$$

olduğuna görə  $S_{2k}, k \in \mathbf{N}$  ardıcılığı məhdud ardıcılıqdır. Odur ki, bu ardıcılığın limiti var. Tutaq ki,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} = S. \quad (3)$$

Bundan başqa, sıranın tək nömrəli xüsusi cəmləri ardıcılığının da limiti  $S$ -ə bərabərdir. Doğrudan da

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k-1} &= \lim_{k \rightarrow \infty} (S_{2k} - a_{2k}) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} S_{2k} - \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = S - 0 = S \end{aligned}$$

Deməli,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$$

sırasının xüsusi cəmləriardıcılığının sonlu limiti var, başqa sözlə, bu sıra yığılır.

**Tərif 2.** Yığılan sıra mütləq yığılmırsa, belə sıra **şərti yığılan sıra** adlanır.

**Misal.**

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^a}$$

sırasının yığılan və ya dağılan olmasını araşdırın.

**Həlli.**  $\alpha > 0$  olduqda  $\left\{ \frac{1}{n^a} \right\}$  ardıcılığı monoton azalır və

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^a} = 0.$$

Onda Leybnis əlamətinə görə verilən sıra yığılır.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n^a} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$$

sırası isə  $\alpha > 1$  olduqda yığılır,  $\alpha \leq 1$  olduqda isə dağılır. Beləliklə,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\alpha}}$$

sırası  $\alpha > 1$  olduqda mütləq yığılır,  $0 < \alpha < 1$  olduqda isə şərti yığılır.

### 23.4.1. Qüvvət sıraları

Tutaq ki,  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  ədədləri verilmişdir. Aşağıdakı sərəya baxaq

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots \quad (1)$$

Bu sıra  $x$  dəyişəninin hər bir qeyd olunmuş qiymətində müəyyən bir ədədi sərədır. (1) şəklində olan sıra **qüvvət sırası** adlanır.  $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  ədədləri qüvvət sırasının əmsalları adlanır.

Əgər (1) sırası  $x$  dəyişəninin müəyyən bir  $x_0$  qiymətində yığılırsa, onda deyirlər ki, verilən qüvvət sırası  $x=x_0$  nöqtəsində yığılır. Qüvvət sırasının yığıldığı bütün nöqtələr çoxluğu onun **yığılma əblası** adlanır.

Biz əsasən

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots \quad (2)$$

şəklində olan qüvvət sıralarına baxacağıq, çünki (1) sırası  $x-a=x'$  əvəzləməsi ilə (2) şəklinə gətirilir.

Hər bir qüvvət sırası ən azı bir nöqtədə yığılır. Doğrudan da (2) sırası  $x=0$  nöqtəsində yığılır.

**Teorem 1 (Abel teoremi).** Əgər (2) qüvvət sırası  $x=x_0(x_0 \neq 0)$  nöqtəsində yığılırsa, onda həmin sıra  $x$ -in

$$|x| < |x_0|$$

şərtini ödəyən bütün qiymətlərində mütləq yığılır. Həmçinin əgər (2) sırası  $x_0$  nöqtəsində dağılırsa, onda həmin sıra  $x$ -in

$$|x| > |x_0|$$

şərtini ödəyən bütün qiymətlərində dağılır.

**İsbatı :** Tutaq ki,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$$

ədədi sırası yığılır. Bu halda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0$$

olduğuna görə  $\{a_n x_0^n\}$  ardıcılığı məhduddur. Tutaq ki,  $|a_n x_0^n| \leq M, n \in \mathbb{N}$ . Onda  $x$ -in bütün

$$|x| < |x_0|$$

qiymətlərində

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left( \frac{|x|}{|x_0|} \right)^n \leq M q^n,$$

(burada  $q = \frac{|x|}{|x_0|} < 1$ ).

$$\sum_{n=0}^{\infty} M q^n$$

sırası yığılır. Onda, müsbət hədlili sızaların yığılması haqqındakı teoremə görə

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n|$$

sırası da yığılır.

İndi tutaq ki,

$$\sum a_n x_0^n$$

sırası dağılır. Bu halda

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

qüvvət sırası  $x$ -in

$$|x| > |x_0|$$

şərtini ödəyən hər bir qiymətində dağılır. Doğrudan da, əgər

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$$

sırası dağılırsa, onda  $x$ -in

$$|x| > |x_0|$$

şərtini ödəyən heç bir qiymətində

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

sırası yığıla bilməz, çünki əks halda onun yığılmasından yuxarıda isbat etdiyimizə görə

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$$

sırasının yığılması alınardı.

Teorem 1-ə görə

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

qüvvət sırası üçün aşağıdakı üç hal mümkündür:

1) sıra ancaq  $x=0$  nöqtəsində yığılır;



- 2) sıra bütün həqiqi oxda yığılır;  
 3) elə bir  $R > 0$  ədədi var ki, sıra  $x$ -in  $(-R;R)$  intervalına daxil olan hər bir nöqtəsində yığılır,  $x$ -in  $|x| > R$  şərtini ödəyən hər bir qiymətində dağılır.

**Tərif 1.**

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

qüvvət sırası  $x$ -in  $|x| < R$  ( $R > 0$ ) şərtini ödəyən istənilən qiymətində yığılır və  $x$ -in  $|x| > R$  şərtini ödəyən istənilən qiymətində dağılırsa,  $R$  ədədi həmin sıranın **yığılma radiusu** adlanır.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

qüvvət sırası ancaq  $x=0$  nöqtəsində yığılırsa, yığılma radiusunu  $R=0$ , bütün həqiqi oxda yığılırsa, yığılma radiusunu  $R = +\infty$  hesab edəcəyik.

**Teorem 2.**

$$\left\{ \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} \right\}$$

ardıcılığının sonlu və ya sonsuz limiti varsa,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

qüvvət sırasının yığılma radiusu üçün

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$$

düsturu doğrudur.

**İsbatı :** Tutaq ki,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = A.$$

Əvvəlcə A-nın sonlu ədəd olduğu hala baxaq:

$$0 \leq A < +\infty. \quad A = 0 \text{ olduqda}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{a_n} = +\infty.$$

Bu halda x-in hər bir  $x \neq 0$  qiymətində

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_nx^n|} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = +\infty$$

bərabərliyi doğrudur. Onda Dalamber əlamətinə görə

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

sırası dağılır. Deməli,  $A=0$  olduqda  $R=0$

$0 < A < +\infty$  olduqda

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_nx^n|} = |x| \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{|x|}{A}.$$

Dalamber əlamətinə görə

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

sırası  $|x| < A$  və ya  $\frac{|x|}{A} < 1$  olduqda mütləq yığılır,

$|x| > A$  olduqda isə dağılır. Deməli,  $R=A$ .

$A = +\infty$  olduqda x-in sıfırdan fərqli hər bir qiymətində

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}x^{n+1}|}{|a_nx^n|} = 0$$

düsturu doğrudur. Buradan alırıq ki, sıra x-in bütün qiymətlərində mütləq yığılır, başqa sözlə,  $R = +\infty$ .

**Teorem 3.**  $\{\sqrt[n]{|a_n|}\}$  ardıcılığının sonlu və ya sonsuz limiti varsa,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

qüvvət sırasının yığılma radiusu üçün

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

düsturu doğrudur.

**Misal 1.**

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(n+1)^2}$$

sırasının yığılma radiusunu tapın.

**Həlli.** Bu misalda

$$a_n = \frac{1}{(n+1)^2}$$

olduğundan

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^2}{(n+1)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ 1 + \frac{2}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} \right] = 1.$$

**Misal 2.**

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)x^n$$

sırasının yığılma radiusunu tapın.

**Həlli.**  $a_n = (n+1)(n+2)$  olduğundan

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)}{(n+2)(n+3)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+3} = 1.$$

**Misal 3.**

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$$

sirasının yığılma radiusunu tapın.

**Həlli.**  $a_n = (n+1)^n$  olduğundan

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n+1)^n}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} (n+1)} = 0.$$

Qüvvət sıralarının diferensiallanması və inteqrallanması.

Tutaq ki,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

qüvvət sırasının yığılma radiusu  $R > 0$ . Onda bu sıranın cəmi aşağıdakı (1) düsturu ilə ifadə olunan

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad (1)$$

və təyin oblastı  $(-R; R)$  intervalı olan funksiyadır. İsbat etmək olar ki,  $f(x)$  funksiyasının  $(-R; R)$  intervalında istənilən tərtibdən kəsilməz törəməsi var və

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2},$$

$$f''''(x) = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2)a_n x^{n-3}$$

.....

Başqa sözlə, bu o deməkdir ki, qüvvət sırasının istənilən tərtibdən hədbəhəd diferensiallamaq olar.

Həmçinin isbat etmək olar ki, qüvvət sırasını hədbəhəd inteqrallamaq olar:

$$\int_a^b \left( \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n dx,$$

burada  $-R < a < b < R$ .

### 23.4.2. Funksiyaların qüvvət sırasına ayrılması. Teylor sıraları anlayışı.

**Tərif 1.** Tutaq ki,

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - a)^n \tag{1}$$

qüvvət sırası  $(a-R, a+R)$  intervalında yığılır və onun cəmi  $f(x)$  funksiyasına bərabərdir, yəni  $x$ -in  $(a-R, a+R)$  intervalındakı bütün qiymətlərində

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - a)^n \tag{2}$$

bərabərliyi doğrudur. Onda, deyirlər ki,  $f(x)$  funksiyası  $(a-R, a+R)$  intervalında (1) qüvvət sırasına ayrılır.

**Teorem 1.**  $f(x)$  funksiyası  $(a-R, a+R)$  intervalında qüvvət sırasına ayrılırsa, onda onun həmin interval daxilində istənilən tərtibli kəsilməz törəməsi var.

Doğrudan da,  $f(x)$  funksiyası  $(a-R, a+R)$  intervalında (1) qüvvət sırasına ayrılırsa, onda  $(a-R, a+R)$  intervalı (1) qüvvət sırasının yığılma intervalı daxilində yerləşər. Qüvvət sırasının cəmini özünün yığılma intervalı daxilində istənilən tərtibdən hədbəhəd diferensiallamaq mümkündür. Bu halda (1) sırasının istənilən tərtibdən hədbəhəd diferensiallanmasından alınan sıraların  $f^{(k)}(x)$  cəmləri yığılma intervalı daxilində və buna görə də, xüsusi halda,  $(a-R, a+R)$  intervalında kəsilməyən funksiyalar olar.

Deməli,  $f(x)$  funksiyası  $(a-R, a+R)$  intervalında qüvvət sırasına ayrılırsa, yəni  $x$ -in  $(a-R, a+R)$  intervalındakı bütün qiymətlərində

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (x - a)^n$$

bərabərliyi doğrudursa, onda bu sıranı istənilən tərtibdən hədbəhəd diferensiallamaq olar və  $x$ -in həmin intervaldakı bütün qiymətlərində

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1) \dots (n-k+1) C_n (x-a)^{n-k} \quad (k = 1, 2, \dots) \quad (3)$$

bərabərlikləri doğrudur. Bu bərabərliklərdə  $x=a$  hesab etsək

$$f(a) = C_0, f^{(k)}(a) = k! C_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

olar. Buradan

$$C_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \quad (k = 0, 1, 2, \dots; 0! = 1) \quad (4)$$

alırıq. Bu qiymətləri (2) bərabərliyində yerinə yazdıqda

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (5)$$

və ya

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \frac{f''(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots \\ + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \dots$$

**Tərif 2.** Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası  $a$  nöqtəsinin müəyyən ətrafında təyin olunmuşdur və həmin nöqtədə istənilən tərtibdən törəməsi var. Onda

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (6)$$

qüvvət sırasına  $f(x)$  funksiyasının  $a$  nöqtəsində **Teylor sırası**, (4) ədədlərinə isə **Teylor əmsalları** deyilir.

Xüsusi halda,  $a=0$  olduqda Teylor sırası

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n \quad (7)$$

şəklində yazılır. Buna  $f(x)$  funksiyasının **Makloren sırası** deyilir.

Beləliklə, yuxarıda aparılan mühakiməyə və isbat edilən (5) bərabərliyinə əsasən aşağıdakı təklif alınır:

**Teorem 2.**  $f(x)$  funksiyası  $a$  nöqtəsində müəyyən ətrafında (2) qüvvət sırasına ayrılırsa, onda bu sıra həmin funksiyanın Teylor sırasıdır.

Deməli,  $x=a$  nöqtəsinin müəyyən ətrafında təyin olunmuş  $f(x)$  funksiyasının  $(x-a)$  fərqlinin qüvvətlərinə görə qüvvət sırasına ayrılma məsələsi, elə həmin

**funksiyanın (6) Teylor sırasına ayrılması məsələsinin eynidir.**

**Nəticə 1.**  $x=a$  nöqtəsinin müəyyən ətrafında yığılan

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n \quad (8)$$

qüvvət sırasının cəmi eyniliklə sıfıra bərabədirsə, onda onun bütün əmsalları sıfıra bərabərdir:

$$C_n = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

Doğrudan da,  $a$  nöqtəsinin müəyyən ətrafında (8) sırasının cəmi  $f(x) = 0$  olduğundan (4) düsturuna əsasən

$$C_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} = 0 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

olar.

**Nəticə 2. (Qüvvət sırasına ayrılışın yeganəliyi).**

$x=a$  nöqtəsinin müəyyən ətrafında eyni bir  $f(x)$  funksiyasına yığılan

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n \quad \text{və} \quad \sum_{n=0}^{\infty} d_n(x-a)^n$$

qüvvət sıraları bir-birinin eynidir, yəni onların uyğun əmsalları bərabərdir:

$$C_n = d_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (9)$$

Başqa sözlə,  $f(x)$  funksiyası  $x-a$  fərqlinin qüvvətlərinə görə yeganə qüvvət sırasına ayrıla bilər.

Doğrudan da, (4) düsturuna görə

$$C_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \quad \text{və} \quad d_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

olduğundan (9) bərabərlikləri doğrudur.



**Tərif 3.**  $x=a$  nöqtəsinin müəyyən ətrafında qüvvət və ya Teylar sırasına ayrılan bilən  $f(x)$  funksiyasına həmin nöqtədə **analitik funksiya** deyilir.

Buradan və yuxarıda isbat etdiyimiz 1-ci teoremdən aydındır ki,  $x=a$  nöqtəsində analitik olan funksiyanın həmin nöqtənin müəyyən ətrafında istənilən tərtibli törəməsi var. Bu təklifin tərsi doğru olmaya da bilər: verilmiş  $x=a$  nöqtəsinin müəyyən ətrafında istənilən tərtibli törəməsi olan funksiyalar vardır ki, onlar  $x=a$  nöqtəsində analitik deyildir, yəni həmin nöqtənin ətrafında Teylor (qüvvət) sırasına ayrılmır. Məsələn,

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \text{ olduqda} \\ 0, & x = 0 \text{ olduqda} \end{cases} \quad (10)$$

funksiyasının bütün ədəd oxunda, xüsusi halda  $x=0$  nöqtəsinin hər bir ətrafında istənilən tərtibli törəməsi var. Doğrudan da,  $x \neq 0$  nöqtələrində

$$f'(x) = \frac{2}{x^3} e^{-\frac{1}{x^2}}, \quad f''(x) = -\frac{6}{x^4} e^{-\frac{1}{x^2}} + \frac{4}{x^6} e^{-\frac{1}{x^2}}, \dots,$$

$x=0$  nöqtəsində isə

$$f'(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{(\Delta x)^2}}}{\Delta x} = 0,$$

$$f''(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(\Delta x) - f'(0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\frac{2}{(\Delta x)^3} e^{-\frac{1}{(\Delta x)^2}}}{\Delta x} = 0, \dots$$

alınır, yəni funksiyanın  $x=0$  nöqtəsində bütün törəmələri sıfıra bərabərdir:

$$f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(n)}(0) = f^{(n+1)}(0) = \dots = 0$$

Həmin funksiya üçün  $x=0=x$  qüvvətlərinə görə yazılmış (6) Teylor sırasını düzəldək:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{0}{n!} x^n = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n + \dots \quad (11)$$

Bu sıra bütün ədəd oxunda yığılır və onun cəmi eyniliklə sıfıra bərabərdir:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{0}{n!} x^n \equiv 0.$$

Deməli, (10) funksiyanın (11) Teylor sırasının eyniliklə sıfıra bərabər olan cəmi həmin funksiyanın özünə bərabər deyildir (ancaq  $x=0$  nöqtəsində bərabərdir). Bu göstərir ki, (10) funksiyası  $x=0$  nöqtəsinin heç bir ətrafında qüvvət sırasına (Teylor sırasına) ayrılmır, yəni analitik deyildir.

### **Funksiyaların Teylor sırasına ayrılı bilməsi şərtləri.**

Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyası  $x=a$  nöqtəsinin müəyyən ətrafında təyin olunmuşdur və həmin nöqtədə istənilən tərtibdən törəməsi var. Onda  $f(x)$  funksiyası üçün  $x=a$  nöqtəsində

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (1)$$

Teylor sırasını yazmaq olar. (1) sırasının yığılan və ya dağılan olması, yığılan olduqda isə onun cəminin  $f(x)$  funksiyasına bərabər olması haqqında əvvəlcədən heç nə demək olmaz. Buna görə də (1) sırasının  $f(x)$  funksiyasının Teylor sırası olmasını

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (2)$$

kimi yazırlar ( $\sim$  uyğunluq işarəsidir).

Xüsusi halda, (1) sırası  $f(x)$  funksiyasına yığılan olduqda (2) münasibətində (uyğunluq) işarəsi əvəzinə  $=$ (bərabərlik) işarəsi yazılır. Bu halda, deyirlər ki,  $f(x)$  funksiyası Teylor (və ya qüvvət) sırasına ayrılır.

Belə bir sual qarşıya çıxır:  $f(x)$  funksiyasının Teylor sırası nə zaman onun özünə yığılır? Bu məsələni tədqiq etmək üçün  $f(x)$  funksiyasının  $(x-a)$  fərqi qüvvətlərinə görə yazılmış Teylor düsturuna baxaq:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x). \quad (3)$$

Burada

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k \quad (4)$$

çoxhədli  $f(x)$  funksiyasının **n-dərəcəli Teylor çoxhədli-si**,  $R_n(x)$  isə Teylor düsturunun **qalıq həddi** adlanır. (4) cəmi eyni zamanda (1) Teylor sırasının n-ci xüsusi cəmidir. (3) düsturunu

$$f(x) = S_n(x) + R_n(x) \quad (5)$$

və ya

$$f(x) - S_n(x) = R_n(x)$$

kimi yazdıqda aşağıdakı teorem alınır:

**Teorem 1.**  $f(x)$  funksiyasının  $(a-R, a+R)$  intervalında (1) Teylor sırasına ayrılması üçün həmin intervalda onun istənilən tərtibli törəməsinin olması və (3) Teylor düsturu qalıq həddinin  $x$ -in  $(a-R, a+R)$  intervaldakı bütün qiymətlərində

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad (6)$$

bərabərliyini ödəməsi zəruri və kafi şərtidir.

Bu teoremin şərtlərini yoxlamaq bəzən çətin olur. Belə hallarda funksiyanın qüvvət sırasına ayrılmasını aşağıdakı kafi şərtə əsasən müəyyən etmək olar.

**Teorem 2.** Tutaq ki,  $f(x)$  funksiyanının  $(a-R, a+R)$  intervalında istənilən tərtibli törəməsi var və bu törəmələrin hamısı həmin intervalda müntəzəm məhduddur, yəni  $x$ -in  $(a-R, a+R)$  intervalındakı bütün qiymətlərində

$$|f^{(k)}(x)| \leq M \quad (k = 0, 1, 2, \dots, \quad (7)$$

bərabərsizliyi ödənilir. Onda  $f(x)$  funksiyası həmin intervalda Teylor sırasına ayrılır:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n \quad (8)$$

**İsbatı.** (8) bərabərliyinin doğruluğuna inanmaq üçün  $x$ -in  $(a-R, a+R)$  intervalında yerləşən bütün qiymətlərində (6) münasibətinin ödənildiyini göstərmək kifayətdir.

(3) Teylor düsturunun qalıq həddini Laqranj şəklində götürək:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}, \quad \xi \in (a, x),$$

(7) bərabərsizliyinə görə

$$\begin{aligned} |R_n(x)| &= \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!} |x-a|^{n+1} \leq \\ &\leq M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} \end{aligned} \quad (9)$$

olar. Hər bir qeyd olunmuş  $x$  üçün

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!} = 0$$

bərabərliyinin doğruluğu isbat olunmuşdur. Onda (9) bərabərsizliyinə əsasən hər bir  $x \in (a-R, a+R)$  üçün

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \text{ olar.}$$

Teorem isbat olundu.

### 23.4.3. Elementar funksiyaların Teylor sırasına ayrılması

Əvvəlki paraqrafda isbat edilmiş teoremləri tətbiq edərək bir sıra elementar funksiyaları Teylor sırasına ayırmaq olar.

**I.  $f(x) = e^x$ .** Bu funksiya üçün

$f(x) = f'(x) = f''(x) = \dots = f^{(n)}(x) = \dots = e^x$  olduğundan  $x$ -in  $(-R, R)$  intervalında yerləşən bütün qiymətlərində

$$|f^{(k)}(x)| = |e^x| < e^R \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

bərabərsizliyi ödənilir. Deməli,  $e^x$  funksiyası üçün 2-ci teoremin şərtləri ödənilir, yəni həmin funksiya istənilən sonlu intervalda (buna görə də ədəd oxunda) Teylor sırasına ( $a=0$ ) ayrılır.  $f^{(n)}(0) = e^0 = 1$  olduğundan  $e^x$  funksiyasının Teylor ayrılışı

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \quad (1)$$

şəklində olar.

**II.  $f(x) = \sin x$ .** Bu funksiya üçün

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_n(x).$$

Teylor düsturunun və  $x$ -in bütün qiymətlərində

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

bərabərliyinin doğruluğu aydındır. Deməli,  $\sin x$  funksiyası bütün ədəd oxunda

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (2)$$

Taylor sırasına ayrılır.

**III.  $f(x) = \cos x$  funksiyası üçün**

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_n(x)$$

kimi Taylor düsturu və  $x$ -in bütün qiymətlərində

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

bərabərliyin doğruluğu əvvəldən məlumdur. Buradan həmin funksiya üçün

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (3)$$

ayrılışı alınır.

### 24.4.1. Kompleks sıra

Tutaq ki,  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  kompleks ədədlərdir, yəni

$$a_k = b_k + ic_k, k = 1, 2, 3, \dots,$$

burada  $b_1, b_2, \dots$  və  $c_1, c_2, \dots$  ədədləri həqiqi ədədlərdir.

Aşağıdakı kompleks ədədi sərəya baxaq:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n. \quad (1)$$

Fərz edək ki,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  və  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  ədədi sıraları yığılır və

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B, \sum_{n=1}^{\infty} c_n = C.$$

$B + iC$  kompleks ədədinə (1) sırasının *cəmi* deyilir.

**Teorem.**  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  sırası yığılırsa,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  sırası da yığılır.

**İsbatı.**  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{b_n^2 + c_n^2}$  ədədi sırasının yığılmasından və

$$|b_n| \leq \sqrt{b_n^2 + c_n^2}, \quad |c_n| \leq \sqrt{b_n^2 + c_n^2}$$

bərabərsizliklərindən  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  və  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  sıralarının yığılması çıxır. Bu halda aydındır ki,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  və  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$  sıraları da yığılır. Bu isə tərifə görə o deməkdir ki,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  sırası yığılır.

İndi də kompleks qüvvət sırasına baxaq:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n, \quad (2)$$

$a_n = b_n + ic_n, (n = 0, 1, 2, \dots), z = x + iy$  . İsbat etdiyimiz teoremə görə  $\sum |a_n| |z^n|$  sırasının yığılmasından (2) sırasının yığılması çıxır.

### 24.4.2. Eyler düsturu

Bilirik ki,  $e^x$  funksiyası üçün

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

ayrılışı doğrudur. Onda təbii olaraq  $e^x$  kompleks dəyişənli funksiyası

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

düsturu ilə təyin edilməlidir.  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$  qüvvət sırası  $z$ -in hər bir qiymətində yığıldığından bundan əvvəlki paragrafda isbat etdiyimiz teoremə görə  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$  sırası da  $z$ -in hər bir qiymətində yığılır.

Xüsusi halda  $z = ix$  olduqda



$$e^{ix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Digər tərəfdən

$$i^{2k} = (-1)^k, i^{2k+1} = i(-1)^k$$

olduğunu nəzərə alsaq (1) düsturu

$$e^{ix} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} \quad (1)$$

şəklini alar. Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki sıraların cəmi uyğun olaraq  $\cos x$ -ə və  $\sin x$ -ə bərabərdir. Odur ki,

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x. \quad (2)$$

Burada  $x$  əvəzinə  $-x$  götürsək

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x \quad (3)$$

düsturunu alarıq. (2) və (3) düsturları Eyler düsturları adlanır. Bu düsturlardan öz növbəsində

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \quad (4)$$

düsturları alınır.

$z = x + iy$  olduqda

$$e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy}$$

düsturunun doğru olduğunu göstərmək olar. Ona görə də

$$e^{x+iy} = e^x (\cos x + i \sin y). \quad (5)$$

$z = x + iy$  kompleks ədədi

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

triqonometrik şəkildə göstərilmişsə, (2) düsturuna görə onu

$$z = re^{i\varphi} \quad (6)$$

kimi göstərmək olar. Burada

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{və} \quad \varphi = \text{Arg}z. \quad (7).$$

### 24.4.3. Furiye sırası

Tutaq ki,  $2\pi$  periodlu  $f(x)$  funksiyası

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (1)$$

şəkildə triqonometrik sərəya ayrılır. Burada  $a_0, a_1, b_1, \dots, a_n, b_n, \dots$  müəyyən ədədlər olub, **triqonometrik sərəyanın əmsalları** adlanır.

Fərz edək ki,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

sırasının  $[-\pi; \pi]$  parçasında hədbəhəd inteqrallamaq olar.  $a_0, a_1, b_1, \dots, a_n, b_n, \dots$  əmsalları ilə  $f(x)$  funksiyası arasında əlaqə düsturlarını tapaq. (1) bərabərliyinin hər tərəfini  $-\pi$ -dən  $\pi$ -yə kimi inteqrallayaq:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \pi a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nxdx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nxdx \right).$$

Burada

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nxdx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin nxdx = 0, \quad n = 1, 2, \dots$$

olduğunu nəzərə alsaq,  $a_0$  əmsalı üçün

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \quad (2)$$

düsturunu alırıq.

İndi (1) bərabərliyinin hər tərəfini  $\cos kx$ -ə ( $k \in N$ ) vurub  $-\pi$ -dən  $\pi$ -yə kimi inteqrallayaq:

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = \frac{a_0}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos kx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos kx dx \right) \quad (3)$$

Bu bərabərliyin sağ tərəfindəki inteqralları

$$\cos nx \cos kx = \frac{1}{2} [\cos(n-k)x + \cos(n+k)x],$$

$$\sin nx \cos kx = \frac{1}{2} [\sin(n+k)x + \sin(n-k)x]$$

düsturlarının köməyi ilə hesablayaq.  $n \neq k$  olduqda

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos kx dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(n-k)x + \cos(n+k)x] dx = \\ &= \frac{1}{2} \left[ \frac{\sin(n-k)x}{n-k} + \frac{\sin(n+k)x}{n+k} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos kx dx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(n+k)x + \sin(n-k)x] dx = \\ &= -\frac{1}{2} \left[ \frac{\cos(n+k)x}{n+k} - \frac{\cos(n-k)x}{n-k} \right] \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0. \end{aligned}$$

Bunları (3) bərabərliyində nəzərə alsaq

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx f(x) dx = a_k \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 kx dx + b_k \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos kx dx$$

düsturunu alarıq. Digər tərəfdən

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos kx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin 2kx dx = 0,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 kx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2kx) dx = \pi$$

olduğundan

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx = a_k \pi$$

və ya

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx, k = 1, 2, \dots \quad (4)$$

Analoji qayda ilə göstərmək olar ki,  $b_1, b_2, \dots$ , əmsalları üçün

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx, k = 1, 2, \dots \quad (5)$$

düsturları doğrudur.

**Tərif 1.** Əmsalları (2), (4) və (5) düsturları ilə hesablanan

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (6)$$

trigonometrik sırası  $f(x)$  funksiyasının **Furye sırası** adlanır.

**Tərif 2.**  $(a; b)$  aralığında  $f(x)$  funksiyasının törəməsinin yalnız sonlu sayda birinci növ kəsilmə nöqtəsi varsa,  $f(x)$  funksiyası həmin aralıqda **hissə-hissə diferensial (hissə-hissə hamar)** funksiya adlanır.

**Teorem.** Bütün həqiqi oxda təyin edilmiş,  $[-\pi; \pi]$  aralığında **hissə-hissə diferensiaslanan  $2\pi$  periodlu  $f(x)$  funksiyasının Furye sırası həmin funksiyanın kəsilməz olduğu hər bir  $x$  nöqtəsində  $f(x)$  -ə, funksiyanın kəsilmə olduğu hər bir  $x$  nöqtəsində isə  $\frac{f(x-0) + f(x+0)}{2}$  -ə yığılır.**


Bu teoremin isbatını vermirik.

Misal 1.  $[-\pi; \pi]$  aralığında

$f(x) = x^2$  düsturu ilə verilən

$2\pi$  periodlu  $f(x)$  funksiyasının

Furye sırasını tapın (şəkil 1).



**Şəkil 1**

Həlli. (2), (4) və (5) düsturları ilə verilən funksiyanın Furye əmsallarını tapaq:

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{1}{\pi} \left. \frac{x^3}{3} \right|_{-\pi}^{\pi} = \frac{2\pi^2}{3},$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nxdx = \frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 d \sin nx = \\ &= \frac{1}{\pi n} \left[ x^2 \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} 2x \sin nxdx \right] = \frac{2}{\pi n^2} \int_{-\pi}^{\pi} xd \cos nx = \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \left[ x \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \cos nxdx \right] = \frac{4 \cos n\pi}{n^2} = (-1)^n \frac{4}{n^2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin nxdx = -\frac{1}{\pi n} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 d \cos nx = \\ &= -\frac{1}{\pi n} \left[ x^2 \cos nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} 2x \cos nxdx \right] = \\ &= \frac{2}{\pi n^2} \int_{-\pi}^{\pi} xd \sin nx = \frac{2}{\pi n^2} \left[ x \sin nx \Big|_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \sin nxdx \right] = 0. \end{aligned}$$

Verilən funksiya hissə-hissə diferensiallanan və hər bir nöqtədə kəsilməz olduğundan

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx.$$

(6) sırasının  $f(x)$  funksiyasının Furye sırası olması

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

kimi yazılır.

#### 24.4.4. Tək və cüt funksiyların Furye sırası.

**Lemma 1.**  $[-l; l]$  parçasında inteqrallanan  $f(x)$  funksiyası cütdürs, onun inteqralı üçün

$$\int_{-l}^l f(x) dx = 2 \int_0^l f(x) dx \quad (1)$$

təkdürsə

$$\int_{-l}^l f(x) dx = 0 \quad (2)$$

doğrudur.

**İsbatı.**  $\int_{-l}^l f(x) dx$  inteqralını aşağıdakı kimi göstərək:

$$\int_{-l}^l f(x) dx = \int_0^l f(x) dx + \int_{-l}^0 f(x) dx. \quad (3)$$



$\int_{-l}^0 f(x)dx$  inteqralında  $x=-t$  əvəzləməsi aparaq. Onda

$$\int_{-l}^0 f(x)dx = -\int_l^0 f(-t)dt = \int_0^l f(-t)dt.$$

Ona görə də

$$\int_{-l}^l f(x)dx = \int_0^l f(x)dx + \int_0^l f(-x)dx. \quad (4)$$

Bu bərabərlikdən alırıq ki, əgər  $f(x)$  funksiyası  $[-l;l]$  parçasında cütdürsə (1) düsturu, təkdirsə (2) düsturu doğrudur.

$2\pi$  periodlu  $f(x)$  funksiyası cütdürsə,  $f(x)$   $\cos nx$  cüt,  $f(x)$   $\sin nx$  isə təkdir. Onda yuxarıda isbat edilən lemmaya görə

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nxdx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nxdx, n = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nxdx = 0, n = 1, 2, 3, \dots \quad (6)$$

Odur ki, cüt funksiyanın Furye sırası ancaq kosinuslar olan hədlərin cəmindən ibatətdir:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx. \quad (7)$$

$a_n$  ( $n=0,1,2,\dots$ ) əmsalları (5) düsturu ilə hesablanır.  $2\pi$  periodlu  $f(x)$  funksiyası təkdirsə  $f(x)\cos nx$  tək,  $f(x)\sin nx$  isə cütdür. Ona görə də

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0, n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin nx dx, n \in N.$$

Deməli, tək funksiyanın Furiye sırası ancaq sinuslar olan hədlərin cəmindən ibarətdir.

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx. \quad (8)$$

$b_n$  ( $n \in N$ ) əmsalları (6) düsturu ilə hesablanır.

## ƏDƏBİYYAT

1. А.Кудрявцев, Б.П. Даминович- Краткий курс высшей математики.Москва «Наука»1989г.
2. П.Ф.Фильчаков.Справочник по высшей математики «Наукова Думка»Киев 1974г.
3. У.В.Мантуров, Ю.К. Солнцев, Ю.И.Соркин, Н.Г.Федин. Математика в понятиях, определениях и терминах. I часть Москва «Просвещение» 1978г.
4. M. Nəsibov. Mütləq qiymət və onun tədbiqi. “Maarif” Nəşriyyatı-1981 il.
5. Q.M.Namazov.Funksiyalar və Qrafiklər.“Bakı Biznes Universiteti Nəşriyyatı” Bakı- 2011 il
6. C. Nurəddinoğlu. Ali riyaziyyat kursu üzrə məsələ və misallar. I hissə. Çarşıoğlu. Bakı -2000
7. R. Məmmədov. Ali riyaziyyat kursu I hissə “Maarif”- 1978 il
8. R.Məmmədov. Ali riyaziyyat kursu II hissə.“Maarif”-1981 il
9. R.Məmmədov.Ali riyaziyyat kursu III hissə.“Maarif”-1984 il
10. Y.Ş.Səlimov, M.M.Səbzəliyev. Ali riyaziyyatdan məsələlər. III hissə. Bakı-1998
11. Y.Ş.Səlimov, M.M.Səbzəliyev. Ali riyaziyyatdan məsələlər I hissə.Bakı-2004
12. Y.Ş.Səlimov, M.M.Səbzəliyev. Ali riyaziyyatdan məsələlər II hissə.Bakı-2005
13. U.U.O. Qaydukov. Mütləq qiymət . “Maarif”-1970
14. Ə.Şahbazov. Ehtimal nəzəriyyəsi və Riyazi statistika.“Maarif”-1973
15. O.C.Ивашев-Мусатов. Начало математического анализа.Москва «Наука» 1988 г.
16. Ə.S. Səfərov, C. N. Suleymanov. Birdəyişənli funksiyaların diferensial hesabı.Bakı -1986

17. С.В. Фрохов. Курс высшей математики. Москва «Высшая школа»-1973
18. N.S.Piskunov.Differensial və integral hesabı I hissə.“Maarif”-1966
19. Бахвалов, Л. И. Бабушкин, В.П. Иваницкая. Аналитическая ГеометрияПросвещения -1970
20. N.S. Əfəndiyev. Ədəbi və funksional sıraların əsasları. Bakı- Azərənəşir1959
21. M.Ə.Əzimov, F.N.Səlimov, Ş.F.Məmmədov Diferensial Tənliklər.
22. Н.М.Гюнтер и Р.О.Кузмин. Сборник задач повышенной математики II часть.Москва- 1959
23. Г. И. Кручкович, Г.М.Мордасова, В.А.Подольский, Б.С. Римский-Корсоков, Х.Р. Сулейманова, М. А. Чегис. Сборник задач и упражнений по специальным главам высшей математики. Издательство « Высшая школа» Москва- 1970
24. V.P. Demidoviç. Riyazi Analizdən Məsələ və Misallar. Tərcümə edənlər.Əliyev A.R. Bakı-2004
25. Г.М.Фихтенгольц. Курс дифференциального и интегрального исчисления I том. Физматгиз. Москва1962
26. Г.М. Фихтенгольц. Курс дифференциального иинтегрального исчисления. II том.Физматгиз. Москва1962
27. У.В.Мантуров, Ю.К. Солнцев, Ю.И.Соркин, Н.Г. Федин. Математика в понятиях, определениях и терминах.II часть Москва «Просвещение» 1982г.

## MÜNDƏRİCAT

<b>Giriş</b> .....	3
<b>I FƏSİL. Çoxluqlar nəzəriyyəsi</b> .....	4
1.1. Çoxluq anlayışı. Sonlu və sonsuz çoxluq. Çoxluqlar haqqında teoremlər.....	4
1.2. Çoxluqlar üzərində əməllər.....	8
1.3. Həqiqi ədədlər çoxluğu.....	14
1.4. Nizamlı çoxluğun xassələri.....	16
1.5. Çoxluqların Dekart hasili.....	19
1.6. İnikas. Siniflərə bölmə.Çoxluqların gücü.....	20
<b>II FƏSİL. Qeyri-hesabi çoxluq. Həqiqi ədədlərin həndəsi təsviri</b> .....	24
2.1. Qeyri-hesabi çoxluq.....	24
2.2. Düz xətt üzərində koordinat sistemi.Həqiqi ədədlərin həndəsi təsviri.....	24
2.3. Düz xətt üzərində ədəd oxu və Loqarifmik şkala.....	26
2.4. Müntəzəm şkala.Ölçü vahidi.Müntəzəm olmayan şkala.....	27
2.5. Ədədi çoxluğun xüsusi növləri.Kantor teoremi.....	27
<b>FƏSİL III. Mütləq qiymət haqqında teoremlər</b> .....	31
3.1. Həqiqi ədədin mütləq qiyməti. Tərif.....	31
3.2. Mütləq qiymət haqqında teoremlər.....	31

3.3.	Cəmin, fərqi, hasilin, nisbətin mütləq qiyməti haqqında teoremlər.....	32
3.4.	Ətraf anlayışı. Ətrafin daxili və sərhəd nöqtələri. Limit nöqtəsi.....	35
3.5.	Qapalı çoxluq. İzolə edilmiş nöqtə.....	37
<b>IV FƏSİL</b>	<b>Funksiyonal asılılıq.....</b>	<b>38</b>
4.1.	Dəyişən kəmiyyətlər. Funksiya. Həqiqi dəyişənli funksiya. Funksiyanın təyin oblastı və qiymətlər çoxluğu.....	38
4.2.	Sərbəst və asılı dəyişənlər. Funksiyanın qrafiki və nöqtələrin həndəsi yeri.....	43
4.3.	Polyar koordinat sistemi. Polyar koordinat sistemində funksiya qrafikinə qurulması.....	49
4.4.	Qrafiklərin deformasiyası. Funksiyanın verilmə üsulları.....	53
4.5.	Qeyri-aşkar funksiya.....	61
<b>V FƏSİL</b>	<b>Məhdud funksiya. Monoton funksiya.....</b>	<b>63</b>
5.1.	Funksiyanın parametrik şəkildə verilməsi.....	63
5.2.	Məhdud və qeyri-məhdud funksiya. Çoxdəyişənli funksiyalar. Artan və azalan funksiyalar.....	64
5.3.	Monoton funksiyalar. Cüt və tək funksiyalar. Dövrü funksiya.....	67
5.4.1.	Mürəkkəb funksiya.....	75
5.4.2.	Tərs funksiya.....	76

5.4.3.	Tərs funksiyanın varlığı üçün vacib şərtlər.....	79
5.5.	Düz funksiya ilə tərs funksiya arasında əlaqə.....	79
<b>VI FƏSİL.</b>	<b>Xətti funksiya. Elementar funksiya.....</b>	<b>82</b>
6.1.1.	Xətti funksiya.Xətti funksiyanın tərfi və qrafiki.....	82
6.1.2.	Qüvvət funksiyası.Qüvvət funksiyasının tərfi və qrafiki.....	83
6.1.3.	Üstlü funksiya, onun xassələri və qrafiki.Üstlü funksiyanın tərfi.....	84
6.1.4.	Loqarifmik funksiya.....	85
6.2.1.	Triqonometrik funksiyalar.....	86
6.2.1.1.	Triqonometrik funksiyaların qrafikinin sürüşmə vədeformasiya üsulu ilə qurulması.....	92
6.2.1.2.	Tərs triqonometrik funksiyaların xassələri və qrafikləri.....	95
6.2.2.	Elementar funksiyalar.....	98
6.3.	Cəbri və transendent funksiyalar.Hiperbolik funksiyalar.....	99
6.3.1.	Cəbri funksiyalar.....	99
6.3.2.	Transendent funksiyalar.....	100
6.3.3.	Hiperbolik funksiyalar.....	101
<b>VII FƏSİL.</b>	<b>Funksiyanın limiti.....</b>	<b>103</b>
7.1.1.	Ardıcılığın limiti.....	103
7.1.2.	Yığılan ardıcılığın sadə xassələri.....	109

7.2.1.	Limit nöqtəsinin varlığı.....	113
7.2.2.	e ədədi, natural loqarifm.....	116
7.2.3.	Funksiyanın limiti.....	119
7.3.1.	Limiti olan funksiyanın xassələri.....	125
7.3.2.	Funksiyanın sağ və sol limiti.....	127
7.3.3.	Limitlər haqqında əsas teoremlər.....	130
<b>VIII FƏSİL.</b>	<b>Funksiyaların kəsilməzliyi.....</b>	<b>136</b>
8.1.1.	Funksiyanın nöqtədə kəsilməzliyi.....	136
8.1.2.	Sağdan (soldan) kəsilməz funksiyalar.....	137
8.1.3.	Artım vasitəsilə kəsilməzliyin tərif.....	137
8.2.	Nöqtədə kəsilməz funksiyanın əsas xassələri.....	138
8.3.	Parçada kəsilməyən funksiyanın xassələri.....	139
8.4.	Tərs funksiyanın kəsilməzliyi.....	142
<b>IX FƏSİL.</b>	<b>Elementar funksiyların kəsilməzliyi.....</b>	<b>145</b>
9.1.1.	Kəsilmə nöqtələri.....	145
9.1.2.	Birinci və ikinci növ kəsilmə nöqtələri....	146
9.1.3.	Monoton funksiyanın kəsilmə nöqtələri.....	148
9.2.	Sadə elementar funksiyların kəsilməzliyi.....	150
9.3.1.	Funksiyaların müntəzəm kəsilməzliyi.....	152
9.3.2.	Kantor teoremi.....	154



<b>X FƏSİL.</b>	<b>Törəmə. Diferensial. Törəmənin tətbiqləri.....</b>	<b>155</b>
10.1.	Funksiyanın törəməsi.....	155
10.2.	Törəmənin fiziki və həndəsi mənası. Bucaq əmsalı.....	157
10.3.	Funksiyanın kəsilməzliyi ilə diferensiallanan olmasının əlaqəsi.....	159
10.4.1.	Cəmin, hasilin və nisbətənin törəməsi.....	160
10.4.2.	Mürəkkəb funksiyanın törəməsi.....	162
10.4.3.	Tərs funksiyanın törəməsi.....	164
10.5.	Parametrik şəkildə verilmiş funksiyanın törəməsi.....	165
<b>XI FƏSİL.</b>	<b>Funksiyaların törəmələri.....</b>	<b>168</b>
11.1.	Əsas elementar funksiyanın törəmələri..	168
11.1.1.	Loqarifmik funksiyanın törəməsi.....	168
11.1.2.	Qüvvət funksiyanının törəməsi.....	169
11.1.3.	Trigonometrik funksiyanın törəməsi.....	170
11.1.4.	Tərs trigonometrik funksiyanın törəməsi.....	172
11.1.5.	Qeyri-aşkar funksiyanın törəməsi.....	174
11.2.	Loqarifmik törəmə.....	175
11.3.	Yüksək tərtibli törəmələr.....	176
<b>XII FƏSİL.</b>	<b>Diferensialın tərifli.Roll teoremi.....</b>	<b>178</b>
12.1.1.	Diferensialın tərifli.....	178
12.1.2.	Diferensialın həndəsi və mexaniki mənası.Diferensialın invariantlığı.....	179

12.2.	Diferensialların hesablama düsturları.....	181
12.3.	Yüksək tərtibli diferensial.....	183
12.4.	Diferensial hesabının əsas teoremləri....	183
<b>XIII FƏSİL.</b>	<b>Qabarıq və çökük əyrilər. Lopital qaydası.....</b>	<b>188</b>
13.1.	Qeyri müəyyənliklərin açılışı.Lopital qaydası.....	188
13.2.	Funksiyaların törəmə vasitəsilə tədqiqi və qrafiklərinin qurulması.....	195
13.2.1.	Funksiyaların sabitlik intervalları.....	195
13.2.2.	Funksiyanın monotonluq intervalları.....	195
13.2.3.	Funksiyanın ekstremumu.....	199
13.2.4.	Ekstremumun varlığı üçün kafi şərtlər....	203
13.3.	Lokal ekstremumun yüksək tərtibli törəmə vasitəsilə araşdırılması.....	208
13.4.	Qabarıq və çökük əyrilər.....	210
13.5.	Funksiya qrafikinin qurulması.....	218
<b>XIV FƏSİL.</b>	<b>İbtidai funksiya və qeyri-müəyyən inteqral.....</b>	<b>220</b>
14.1.1.	İbtidai funksiya və qeyri müəyyən inteqralın tərif.....	220
14.1.2.	Qeyri-müəyyən inteqralın əsas xassələri.....	221
14.2.1.	Əsas inteqrallar cədvəli.....	223
14.2.2.	İnteqralın doğruluğunun yoxlanılması.....	224
<b>XV FƏSİL.</b>	<b>İnteqrallama üsulları. Rasional kəsrlərin inteqrallanması.....</b>	<b>225</b>

15.1.	Əsas inteqrallama üsulları haqqında.....	225
15.2.	Sadə rəşional kəsrlərin inteqrallanması. Rasional kəsrlərin sadə kəsrlərə ayrılması.....	229
15.3.	İrrasional kəsrlərin inteqralı.....	233
15.4.	Triqonometrik funksiyalar daxil olan ifadələrin inteqrallanması.....	235
<b>XVIFƏSİL</b>	<b>Müəyyən inteqralın tərifi. Müəyyən inteqralın əsas xassələri. Orta qiymət teoremi.....</b>	<b>241</b>
16.1.1.	İnteqral cəmi.....	241
16.1.2.	Müəyyən inteqralın tərifi və varlıq müəyyən inteqralların varlıq məsələsi...	243
16.2.1.	Kəsilməyən və monoton funksiyaların inteqrallanan olması.....	244
16.2.2.	Müəyyən inteqralın əsas xassələri.....	245
16.2.3.	Orta qiymət haqqında teorem.....	248
16.3.1.	Yuxarısərhədli dəyişən olan inteqral- lar.....	249
16.3.2.	Nyuton-Leybnis düsturu.....	251
16.4.	Müəyyən inteqralların hesablanma üsulları.....	253
<b>XVII FƏSİL</b>	<b>Qeyri-məxsusi inteqrallar.....</b>	<b>259</b>
17.1.1.	Müəyyən inteqralın ümumiləşməsi.....	259
17.1.2.	Sonsuz sərhədli qeyri-məxsusi inteqrallar.....	260
17.2.1.	Sonsuz sərhədli qeyri-məxsusi inteqralların xassələri.....	265

17.2.2.	Sonsuz sərhədli qeyri-məxsusi inteqralların yığılma əlamətləri.....	269
17.3.	Koşi kriterisi və Abel əlaməti.....	273
17.3.1.	İkiqat inteqralın tərifini.....	279
17.3.2.	İkiqat inteqralın həndəsi mənası.....	281
17.3.3.	İkiqat inteqralın hesablanması.....	283
17.4.	Qeyri-məhdud funksiyaların qeyri-məxsusi inteqralının xassələri və yığılma əla- mətləri.....	290
17.5.	Koşi kriterisi və inteqralın mütləq yığılma əlaməti.....	297
<b>XVIII FƏSİL.</b>	<b>Çoxdəyişənli funksiyanın diferensial və inteqral hesabı.....</b>	<b>301</b>
18.1.	Əsas anlayışlar .Çoxdəyişənli funksiyanın tərifini.....	301
18.2.1.	Çoxdəyişənli funksiyanın limiti.....	306
18.2.2.	Təkrar limit.....	307
18.2.3.	Çoxdəyişənli funksiyanın kəsilməz- liyi.....	308
18.3.	Çoxdəyişənli funksiyanın xüsusi törə- məsi.....	312
18.4.1.	Funksiyanın nöqtədə diferensiallanan olması.....	314
18.4.2.	Çoxdəyişənli funksiyanın diferensialla- nan olması üçün zəruri şərtlər.....	315
18.4.3.	Çoxdəyişənli funksiyanın yüksək tərtibli xüsusi törəmələri.....	317
<b>XIX FƏSİL.</b>	<b>Çoxdəyişənli funksiyanın lokal ekstre- mumu.İkidəyişənli funksiyanın lokal</b>	<b>321</b>

	<b>ekstremumunun tapılması.....</b>	
19.1.	Çoxdəyişənli funksiyanın lokal ekstremum nöqtələri.....	321
19.2.	Lokal ekstremumun varlığı üçün zəruri və kafi şərt.....	322
<b>XX FƏSİL.</b>	<b>Çoxdəyişənli funksiyanın qlobal ekstremumu. Şərti ekstremum.....</b>	<b>325</b>
20.1.	Çoxdəyişənli funksiyanın qlobal ekstremumu.....	325
20.2.	Şərti ekstremum. Laqranjin qeyri-müəyyən vuruqlar üsulu.....	327
20.3.	Ən kiçik kvadratlar üsulu.....	331
<b>XXI FƏSİL.</b>	<b>Diferensial tənliklər.Tərif və anlayışlar. Koşi məsələsi.....</b>	<b>342</b>
21.1.1.	Tərif və ümumi anlayışlar.....	342
21.1.2.	Birtərtibli diferensial tənliklər və onların həndəsi mənası.....	345
21.2.	İnteqral əyrisi. İzoklin əyriləri.....	347
21.3.1.	Koşi məsələsi və birtərtibli diferensial tənliklərin ümumi həlli.....	352
21.3.2.	Birtərtibli diferensial tənliyin həllinin varlığı və yeganəliyi haqqında teorem...	353
<b>XXII FƏSİL</b>	<b>Diferensial tənliklər və həll üsulları....</b>	<b>360</b>
22.1.1.	Dəyişənlərinə ayrılan diferensial tənliklər.....	360
22.1.2.	Bircinsli diferensial tənliklər.....	363
22.2.	Birtərtibli xətti diferensial tənliklər.....	367

22.3.1.	Bernulli tənliyi.....	370
22.3.2.	Tam diferensiallı tənliklər.....	371
22.3.3.	İkitərtibli diferensial tənliklər.....	378
22.3.4.	İkitərtibli diferensial tənliklərin inteqrallanan bəzi növləri.....	380
22.4.1.	Riyazi fizikanın əsas tənlikləri(Dalğa, Furye, Laplas). İlk anlayışlar.....	386
22.4.2.	Simin rəqs tənliyinin çıxarılışı.Sərhəd və başlangıç şərtləri.Məftildə elektrik rəqsi tənliyinin çıxarılışı.....	388
22.4.3.	Çubuqda istiliyin yayılma tənliyi. I sərhəd məsələsi.....	395
<b>XXIII FƏSİL</b>	<b>Ədədi sıralar.....</b>	<b>399</b>
23.1.1.	Ədədi sıra haqqında anlayış.....	399
23.1.2.	Yığılan ədədi sıralar və onların sadə xassələri.....	401
23.2.1.	Müsbət həddli sıraların yığılma əlamət- ləri.....	404
23.2.2.	Dalamber və Koşi əlamətləri .Müqayisə əlaməti.....	409
23.3.1.	İşarəsini növbə ilə dəyişən sıralar.....	416
23.3.2.	Mütləq və şərti yığılan sıralar. Leybnis əlaməti.....	418
23.4.1.	Qüvvət sıraları.....	422
23.4.2.	Funksiyaların qüvvət sırasına ayrılması. Teylor sıraları anlayışı.....	429
23.4.3.	Elementar funksiyaların Teylor sırasına ayrılması.....	437

24.4.1.	Kompleks sıra.....	438
24.4.2.	Eyler düsturu.....	440
24.4.3.	Furye sırası.....	442
24.4.4	Tək və cüt funksiyların Furye sırası.....	448
<b>Ədəbiyyat.....</b>		<b>451</b>

**NAMAZOV QABİL MƏHƏMMƏD OĞLU**

**ALİ RİYAZİYYAT**

Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2012, səh.464

**Redaktor: f.r.e.d., prof. H.İ.Aslanov**  
**Texniki redaktor: T.B.Məmmədov**  
**Kompüter tərtibatçısı: Ş.N.Abdullayeva**  
**Kompüter operatorları: M.Ə.Sadiqov,**  
**A.Y.Babayeva**

**Yığılmaga verilmişdir: 11.10.2012**

**Çapa imzalanıb:14.12.2012**

**Kağız formatı: 60x80**

**Həcmi: 29 ç.v.**

**Tiraj:500**

**«Bakı Biznes Universiteti nəşriyyatı»**

**Bakı, H.Zərdabi küç. 88<sup>a</sup>**